




1562

Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.  
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.  
2590/A







Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.  
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.  
2590/A





Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.  
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.  
2590/A



Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.  
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.  
2590/A



2590/A


2539 (1)

A XVIII 0.51



157







425096

CLAVDII  
GALENI DE  
LOCORVM AFFE-  
CTORVM NOTI-  
TIA LIBRI

S E X,

Gulielmo Copo Basilicnfi  
interprete,

*Singulari diligentia recogniti, breuiq; atque ea-  
dem dilucida expositione marginali  
non vulgariter illustrati.*

IN VIRTUTE,



ET FORTUNA.

LVGDVN I,  
Apud Gulielmum Rouillium,  
Sub scuto Veneto.

1562.



GALENI DE  
LOCORVM ATQUE  
COTORVM NOTITIA



APUD GEBELMANN MONTAGNI  
SUB ANNO MDCCC  
LXXXII

AD CH  
guile  
Cope  
G  
bortan  
opiam  
Primit  
veritas  
fidei  
dign  
con  
viam  
probit  
um aff  
verum  
cuius  
fidei



AD CHRISTIANISSI-

M V M F R A N C O R V M R E -  
gem Lodoicum XII. Gulielmi  
Copi Basileiensis in librum  
Galen de Affectorum  
locorum notione,  
Præfatio.



Consideranti mihi, Christianissi-  
me Rex, varia mortalium stu-  
dia, quibus optimū finem, sum-  
mūque bonum assequi pro vi-  
ribus quisque nititur: rectissime  
hortari videtur Satyricus, id præcipue & solum  
optandum esse, ut sit mens sana in corpore sano.  
Verū tanta est prohdolor hodie hominum per-  
uersitas, ut neglecto animo posthabitaque corpo-  
ris salute, omne studium ad diuitias conuertant,  
eoque deuentum sit, ut quo quisque maiorem pe-  
cuniarum cumulum ostentare potest, eo videatur  
maiore honore dignus: cum interim viri & morū  
probitate, & bonis literis præditi, quod diuitijs  
non affluant, non solum debito priuentur honore,  
verū etiam pro stultis reputentur. Id nimirum  
causæ esse videtur, cur tam pauci nostra tempe-  
state recte philosophentur. Cum primum enim



# EPISTOLA.

tres, quatuorve literulas scioli quidam delibera-  
uerint, non veritatem inquirere, sed diuites illos  
adulando captare studet, quo aliquid ab ipsis pe-  
cuniarum detrabere, & instar illorum, primas  
sedes in conuenticulis occupare possint. Sanè sunt  
nonnulli, qui vix delibatis sacrarum literarum  
primis rudimentis, protinus ad aucupanda (vt  
aiunt) beneficia nihil reliqui faciunt. Alij per-  
lectis tribus quatuorve Bartoli argumentis, nun-  
quam inspecto Pandectarum, Codicisve cortice  
ad agendas causas properant, nò vt tueantur pu-  
pillum, sed vt pecunias, quibus plurimas sibi la-  
tifundia cõparent, ab eo astute extorqueant. Sic  
etiam inueniuntur non pauci (vt interim pro-  
fessionis meæ nò obliuiscar) qui cū primū aut pti-  
sanam nominare, aut vino agris interdicare, aut  
clysterem inijcere nouerunt, protinus medicam  
artem professi, populatim miseris mortalibus gra-  
ui cum periculo imponere non erubescunt, ac po-  
tentes illos adulationibus captare aggrediuntur,  
neglectis spretisq; doctissimorū medicorū Hippo-  
crati Galeniq; monumentis. Quippe nemo iam  
indè tam longo auo inuentus est ad eò verita-  
tis stimulos, vt illorum libros ex Græca lingua  
in Latinam vertere curauerit. Quanquam in-  
ueniuntur aliqui, qui Galeni opera vt Latina  
circunferant, credantque sese ei tanquam à secre-  
tis esse, atque iactent, nullum sese Galeni locum  
non intelligere. Ego verò haudquaquam credi-  
derim



## EPISTOLA.

derim. Galeni mentem ex illis libris à quoquam deprehendi posse, quos ne ipse quidem autor, si viveret, esset intellecturus, adeò deprauata est illorum librorum series, ut ex mille versibus vix vnus Galeni mentem referre videatur. Quod nonnulli intelligentes, reiectis Galeni libris, Auicennam potius imitari voluerunt, quòd scilicet còcinnò (ut aiunt) ordine, vastum illum Canonem suum texuerit. Qui si diligenter multa quæ de curandi ratione conscripsit capita, adamussim examinassent, non ordinem & lucem, sed tenebras potius & confusum chaos offendisse se faterètur. Contrà vero si Galeni tres doctrinas, ordine contentas, olsecissent, summo tum ordine tum artificio ipsum commentarios suos scripsisse haudquaquam negarent. Equidè fateri audeo, multò plus solidae doctrinæ, biennio ex Galeni lectione discipulum reportaturum, quàm si decem perpetuis annis Auicenna Canonem reuoluat. Id verò facile videre est, vel in eo libro quem de locorum affectionum notione conscripsit. Quem si quis diligenter sepe numeroq; perlegerit, omnes internorum morborum notas, & multò facilius deprehendet, & tenaciori memoria seruabit, quàm si assidue inexhaustam illam signorum Auicennæ congeriem legendo repetat. Hūc ergo Galeni librum, ne nihil agerè, cum in strenua ista tua contra Anglos expeditione, vnà cū doctissimis Medicis tuis castra tua sequerer, ex Græco Latinū feci, spe-



# EPISTOLA.

rans hoc opus non solum medicis, sed vniuersis quoque mortalibus profuturum. Nam latentes morbos quam facillime dignoscere docet, sine qua notitia nullum affectum recte curari posse apud omnes medicos in confesso est. Ceterum qui maximum medicum, maximi quoque principis nomine illustratum, in publicum prodire decebat, tu mihi Rex inuictissime hoc ipso nomine pulcherrime succurristi, cui opus hoc dedicarem. Quippe qui iustitia administratione Traianum, victoriarum numero Alexandrum Macedonem, clementia Iulium Caesarem facile superas, & quod ad religionem pertinet, sanctissimi regis Lodoici vestigia intentis nervis imitari conaris. Suscipe igitur Christianissime Rex benigno vultu, has nostras, quas in medio armorum strepitu exanimus lucubrationes. Sic enim ad reliqua Galeni volumina interpretanda animum mihi eriges, & vniuersum mortale genus hoc non mediocri beneficio perpetuis amoris vinculis tibi obligabis. Vale Christianissime

Rex, ex Parisiorum Lute-

tia, Anno millesimo

quingentesimo de-

cimotertio.



# INDEX COPIOSISSIMVS

eorum omnium quæ in Libris de Locis affe-  
ctis continentur: cuius prior nume-  
rus, paginam: posterior  
lineam indicat.

\*



- |  |   |
|--|---|
| Abcessus co-<br>li. 4.24                               | Accidētium suffusio-<br>nis ab ore ventricu-<br>li procedentium no-<br>tæ. 188.13 |
| Abcessus in<br>gula. 287.8                             | Acerbum. 95.29  |
| Abcessus in musculis<br>epistastrij. 304.17            | A crasso humore, mor-<br>bus comitialis. 147.4                                    |
| Abcessus renum indi-<br>cia. 335.22                    | Acris humor singultū<br>& cōuulsionem effi-<br>cit. 179.17                        |
| *Accidentia hysterica<br>ad vterum pertinet.<br>364.15 | *Actio. 14.3. & 26.27   |
| Accidentia inflamma-<br>tionis. 81.1                   | Actio læsa. 37.14. & 28.<br>13. & 121.29. & 104.26                                |
| Accidentia melancho-<br>liæ. 162.27                    | Actionis læsio. 121.29.<br>& 124.14   |
| Accidētia ob astricta<br>menstrua. 372.8               | Actio musc. ani. 347.13   |
| Accidentia venæ ero-<br>sæ aut ruptæ. 288.8            | Actio propria. 107.24   |
| Accidentia pleuriti-<br>dis. 277.27                    | Actio respiratiōis ad<br>thoracem pertinet.<br>276.19                             |
| Accidētia ppria. 39.27                                 | Actio musculorū tho-<br>racis p somnū serua-                                      |



# INDEX.

tur.	256.6	excremētis per aluū	
Actiones morales.	137	deiectis.	310.23
Actiones principales.	Affecti iecinoris no-		
137.17	ta.		297.8
*Aduers <sup>9</sup> Erasistratios	Affecti musculi circa		
de trāssumptiōe san	spinam.		54.9
guinis ex magna ar	Affecti nerui faciei.		
teria in pulmonem.	178.27		
269.6	Affecti stomachi sin-		
*Aegrotare.	28.5	gultus.	168.27
Aegrotus interrogād <sup>9</sup>	Affectus.		26.28
de suo affectu.	286.1	Affectiōes hypochō	
Aenea fistula, Cathe-	driacæ.		151.13
ter.	9.27	Affectio instrumēto-	
Aequalis & inæqualis	rum seminis gonor-		
pulmonis intēperies	rhæa.		379.7
244.13	Affectiōes similariū		
Aestus signa.	214.3	& instrumentalium	
*Affectæ partes digno	partium.		198.10
scendē, priusquā ad-	Affectōrū locorū ge-		
hibeantur remedia.	nerales notæ.		104.1
219.8	Affectōrum locorum		
Affecta pars quando	quintuplex deprehē		
dica <sup>t</sup> .	20.17. & 118.4	sio.	37.6. & 123.23
Affecti colis virilis in	Affectōrū pulmōis brō		
dicia.	376.21	chiorū notæ.	242.18
Affecti digiti.	116.27	Affectōrum spinę ner	
Affecti iecinoris indi	uorum notitia.		51.25
ciū euidentissimū ab	Affectū colicum quo-		
	modo		



# I N D E X.

- modo discernas à dis. 260.23  
 nephritide. 329.24 Affect<sup>9</sup> per cōsensum.  
 Affectum pulmonis 25. & 40.26. & 109.  
 cordis pulsatio se- 17. & 113.19. & 40.22  
 quitur. 252.17 Affect<sup>9</sup> priapismi vn-  
 Affectum capitis cu- de. 385.16  
 ratio. 110.5 Affectus primitiuus.  
 Affectus cerebri phre 109.10  
 nitidem indicantes. Affectus primogeni<sup>9</sup>.  
 281.4 140.19  
 Affect<sup>9</sup> cognitio ex p Affectus proprii cor-  
 priis accidentib.39.2 dis. 257.11  
 Affectus colici experi Affectus proprius. 25.  
 mentum. 34.20 28.& 40.23.& 11.6  
 Affectus hydropicorū. Affectus pulmo.241.13  
 302.13. Affectus quatuor mo-  
 Affectus ceruicis alius dis deprehēdit. 37.12  
 anginae non similis. Affectus renū p prius  
 212.16 diabetes. 344.24  
 Affectus inflammato- Affectus scotomatici  
 rius. 63.14 notæ. 171.15  
 Affectus lien, melan- Affect<sup>9</sup> stomachi. 289  
 cholicam mœstitiā Affectus vertiginosi  
 gignit. 326.3 origo. 172.22  
 Affectus lienis qb<sup>9</sup> no Affectus vētriculi spa-  
 tis discernant.323.13 tij. 293.25  
 Affectus œsophagi. Affectus vesicæ ob im-  
 184.12 becillitatem. 327.21  
 Affectus pāniculi cor- \*Affici per cōsensum.



# I N D E X.

- 25.26.& 41.10.& 109. Angulosa spinæ luxa-  
 17.& 113.19 tio.208.3  
 \*Aloë. 189.25 Angustia plenus do-  
 ex Aloë medicamen- lor. 832.6  
 tum. 290.24 Angustia in spiritalib.  
 Alteratrix facul.314.18 instrumentis. 214.17  
 Alui excrementa indicat Anhelitus nocumen-  
 affectū iecur. 310.23 tum, periculum in  
 Aluus adstricta. 55.6 apoplexia. 170.17  
 \*Amatores Phœnices Anima. 153.12  
 à cibo abstinēt. 368.1 Animalis facultas. 45.5  
 Amissa memoria. 139. Animæ essentia dissol-  
 \*Analogia. 118.2 lutio. 257.10  
 Anasarca. 302.5 Animæ pars quomo-  
 Anatomie nervorū ad do lædatur. 108.5  
 tempora & nares ac Animæ princeps fa-  
 labra pertinentium. cultas. 16.8.& 107.11  
 200.4 Animæ sedes præci-  
 ἀνατροπή. 324.12 pua. 134.18  
 Angina. 40.3.& 202.8. Animæ sedes. 147.28  
 & 229.2 Animalia cur ad coi-  
 Angine definitio. 210 tū excitetur. 360.22  
 Anginam indicantes Animalia instrumen-  
 notæ. 202.25 ta. 56.10  
 Anginæ quatuor ge- Animalia latentia. 112.  
 nera. 212.5 7.& 136.4  
 Angina in dispnoeæ Animalis spiritus. 147.  
 speciem trāsit. 236.4 22.& 197.15  
 Anginosi. 210.22 Ani musculi act. 347.13  
 Ante



# INDEX.

- Anterior cerebri pars affecta. 195. 21  
Antidotum Philonis. 70. 1  
Antipatri medici morbus quo extinctus est. 250. 12  
Antipatri morb<sup>9</sup>. 252. 2  
\*Apncea nulla, aut abolita spiratio. 240. 1  
Apncea omnibus partibus cōmunis. 240. 17  
Apnus Heraclidis. 356. 20  
Apophlegmatif. 136. 11  
Apophlegmatism<sup>9</sup> Archigenis. 129. 17  
Apoplexia. 177. 4. 195. 1  
Apoplexiæ ex anhelitus nocumento periculum. 170. 17  
Apoplexiæ succedit paralyfis. 196. 8  
Apople. vehemēs. 255. 6  
Appetentia. 344. 9  
Appetētia canina. 292. 24. & 340. 2  
Apoplexiæ magnitudo. 179. 5  
\*Aquæ frigida potio. 302. 29  
Aquæ gutta lapidem excavans. 23. 4  
Aquæ vitiosæ frigida potio. 325. 19  
Aqua inter cutē. 153. 25  
Aqua intercus ex indurato liene. 324. 15  
Aqua inter cutem vitio splenis. 325. 26  
\*Archigenes. 75. 16. & 116. 18  
Archigenis apophlegmatif. 129. 17  
Archigenis epistolæ. 126. 27  
Archigenis error. 11. 15  
Ardētes febres. 297. 23  
Ariditas. 146. 1  
Arteria aspera. 103. 12  
Arteriæ magnæ vasa, per quæ sanguis in pulmonem transfertur. 267. 22  
Arteriæ pudendis innatæ. 384. 29  
Arteriæ pulsant sine dolore. 62. 10  
Arte



# INDEX.

- Arteriarum sectio ver  
tiginosis indicta a-  
pud antiquos. 172. 7  
Artificiosa cōiectura.  
12. 12. & 122. 18  
\*Ascites. 302. 8  
Asclepiadis error. 16. 5  
ἀσκληπιάδης. 29. 10  
Ascensus humoris ad  
caput in epilepsia.  
164. 15  
Aspera arteria. 103. 12  
Astringens. 89. 4  
Astringēs sapor. 95. 24  
\*Athleta Secundus, cō  
presso spiritu labo-  
rans. 216. 14  
Atra bilis. 148. 20  
Atræ bilis differentiæ.  
149. 16  
Atrox dolor. 95. 9  
Attractrix facultas.  
314. 15  
\*Auditus. 198. 26  
Auiculæ seleucides.  
340. 29  
Austerum. 95. 29  
Austerus dolor. 93. 1  
Austerus sapor. 95. 23  
\*Axioma. 19. 23  
Albi. 231. 22  
Balneæ. 136. 22  
\*Biliosus succus in ce-  
rebro abundans, vi-  
forum causæ. 193. 1  
Biliosus vomitus con-  
uulsionem soluens.  
291. 10  
Bilis atra. 148. 20  
Bilis atræ differentiæ.  
149. 16  
\*Blæsi. 231. 23  
\*Bronchia quid vocē-  
tur. 242. 20  
Bronchion. 2. 15  
Bronchiorum pulmo-  
nis affectorum notæ  
242. 18  
\*Bubo ab ulcere. 26. 13  
Cachexia. 153. 26  
Calidæ intempe-  
ries iecinoris. 308. 28  
Calculi notæ. 9. 10  
Caloris fons cor. 254. 4  
Caluariæ fractura.  
108. 19  
Canina appetentia.  
292. 24. & 340. 22  
Canis



# I N D E X.

- |                           |                        |         |
|---------------------------|------------------------|---------|
| Canis rabiosi sputū ra    | Catalepsis.            | 132. 14 |
| biem excitat. 364. 2      | Catheter, ænea fist.   | 9       |
| Cantoribus & athletis     | Catoche.               | 132. 13 |
| rugosa pudenda. 388       | Caulis virilis corpus  |         |
| Capitis dolorū diffe-     | fistulosum & neruo-    |         |
| rentiæ. 174. II           | sum.                   | 384. 2  |
| Capitis fractura. 151. 17 | Causa & dispositio.    |         |
| Capitis fungi. 5. 19      | 58. 3                  |         |
| Capitis grauitas. 136. 9  | Causa morbi Antipa-    |         |
| Capitis vstio. 108. 25    | tri.                   | 252. 2  |
| Caput nō tentat vinū      | Causa morbi comitia    |         |
| albū modicē abstrin-      | lis ex Pelopis senten- |         |
| gens. 290. 16             | tia.                   | 166. 10 |
| Caput propria ratio-      | Causa stuporis. 58. 29 |         |
| nis sedes. 135. 12        | Causæ præcedētes va-   |         |
| Cardiaca syncopa.         | sis ruptionem in tho-  |         |
| 257. 18                   | race aut pulmone ef-   |         |
| Carni medicæ subten-      | ficientes. 245. 2      |         |
| sa membrana. 86. 28       | Causæ procatacticæ.    |         |
| Caro.                     | 349. 13                |         |
| Κάρϕ.                     | Causæ flatuosæ melan-  |         |
| 196. 4                    | choliæ. 158. 9         |         |
| Καρδιωγμός.               | Causæ ruptionis vasis  |         |
| 17. 23                    | in pulmone. 245. 25    |         |
| Καρδιώτης.                | Cenchrus. 112. 17      |         |
| 18. 1                     | *Cephalalgia. 174. 6   |         |
| Cartilagines sigmoi-      | Cephalææ definitio, &  |         |
| des. 229. 10              | eius notæ. 173. 18     |         |
| Caruncula in vesica.      | Cerebri affectus phre- |         |
| 10. 24                    | nitidem                |         |
| Carunculæ in vrina.       |                        |         |
| 336. 24. & 353. 21        |                        |         |



# INDEX.

- nitidem indicantes. 39. 2  
 281. 4  
 Cervicis affectus angi  
 nae nō similis. 212. 16  
 Cervicis vertebra, dēs  
 vocata. 202. 18  
 \*Chœras. 26. 17  
 Chondrus. 31. 23  
 Chordapson. 332. 25  
 \*Cibi cupiditas & cō-  
 coctio vitiata ex re-  
 tento semine. 359. 15  
 Cibi melācholici. 15. 13  
 Ciborum dissipatio.  
 343. 18  
 Cibus trifariam cor-  
 rumpitur. 28. 15  
 Circumscribere. 78. 6  
 Cittæ. 292. 22  
 \*Clausa vteri cervix  
 citra duritiem, præ-  
 gnantem indicat.  
 372. 22  
 \*Cogitatio. 107. 10  
 Cogitatio libidinis  
 priapismum excitat.  
 387. 13  
 Cognitio affectus ex  
 propriis accidenti-  
 bus. 39. 2  
 Coli abscessus. 4. 24  
 Colica Galeni. 67. 25  
 Colicæ signa. 70. 7  
 Colici dolores. 68. 26  
 Colici dolores dysen-  
 teriā præcedunt. 71. 9  
 Colicorum sanatio.  
 34. 10  
 Colicum affectū quo-  
 modo discernas à ne-  
 phritide. 329. 24  
 Colicum affectum à  
 nephritide distinguit  
 nausæ magnitudo.  
 334. 24  
 Colis accidēs priapif-  
 mus. 379. 9  
 Colis compositio. 379.  
 24  
 Colis virilis affecti in-  
 dicia. 376. 21  
 Color corporis. 40. 10  
 Color declarat ieco-  
 ris splenisq; vitia. 305  
 Coloris vitium. 153. 28  
 Comitialis convulsio  
 ob vitium oris sto-  
 machi. 291. 3  
 Comi



# INDEX.

- Comitialismorbi cau  
sa ex Pelopis senten  
tia. 166. 10  
Comitialis differētiæ  
& species. 163. 25  
Comitialis morbi me  
dicamen. 168. 2  
Comitialis morbus.  
146. 13  
Comitialis morbus à  
crasso humore. 147. 4  
Comitialis morb<sup>9</sup> ab  
atra bile. 150. 10  
Comitialis morb<sup>9</sup> ex  
vehemēti in docen  
do labore. 290. 3  
Comitialis morb<sup>9</sup> in  
ter soporē & apople  
xiam medius. 196. 15  
Comunes facul. 306  
Comunicatio linguæ  
cum cerebro per ner  
uos. 197. 23  
Cōparatio neruorum  
ad fides lyricas & lo  
ra. 145. 25  
Compositio colis. 379  
24  
Compositio musculo-  
rū. 55. 25. 61. 27. & 88  
Cōpresso spiritu labo  
rans athleta. 216. 14  
Confusio & productio  
neruorum à ceruice  
ortorum. 48. 11  
Cōcoctio vitiata ex re  
tento semine. 359. 15  
Coniectura artificio  
sa. 12. 12. & 122. 18  
Cōsideratio excreme  
torum in dysenteria  
327. 20  
Cōsideratio excreme  
torum in morbo re  
gio. 319. 23  
Consideratio sputi in  
pleuritide aut pul  
monum dolor. 243. 4  
Cōtenta in spacio. 6. 7  
Contractio, vesicæ of  
ficiū. 347. 5  
Conuulsio. 143. 4  
Cōuulsio comitialis,  
ob vitium oris vētri  
culi. 291. 3  
Cōuulsiones epilepti  
cæ cur fiāt in morbo  
comitali. 168. 17  
Con



# INDEX.

- Conuulsionem & singultū efficit humor acris. 169. 17  
 Conuulsionem nō inferunt nerui ad os ventriculi pertinentes. 291. 22  
 Conuulsionē soluit biliosus vomit⁹. 291. 10  
 Copula. 142. 20  
 Cor ab antiquis vocatum os vētriculi. 288  
 Cor fons caloris. 254  
 Cordis dolor. 292. 29  
 Cordis inflammatio. 259. 7  
 Cordis palpitatio. 258. 11  
 Cordis panniculi affectus. 260. 23  
 Cordis proprii affectus. 27. 11  
 Cordis pulsatio pulmonis affectū sequitur. 252. 17  
 Cordis vulnus. 259. 10  
 Corporis color. 40. 10  
 Corporum particulae loci vocitantur. 1. 19  
 Corpus caulis virilis fistulosum neruo sumque. 384. 2  
 Costae à quibus venis nutriuntur. 273. 1  
 Costas succingens membrana. 271. 1. & 274. 8  
 \*Crassi humores in cerebro. 142. 14  
 Crassi humores urinā supprimentes. 10. 20  
 Crassus humor comitialē morbum generat. 147. 4  
 Crysiippus. 116. 6  
 Cruda tubera. 210. 14  
 Cruditas. 28. 26  
 Cruenta dysenteria. 71. 15  
 Cruenta vrina. 70. 6  
 Cruris motus difficultas ex suppuratione orta in altera nate. 218. 3  
 Cruris resoluti sanatio. 217. 27  
 Crustula ephelcis. 5. 23  
 \*Cucurbitula. 128. 18. & 130. 20  
 Cui



# INDEX.

- Cuidam ex casu sup. 86. 28  
 pressa vrina. 350. 16 Cynanche. 211. 25  
 Cupiditas serosa hu- **D** Eceptus Galenus.  
 miditatis nimia in 68. 15  
 renibus. 341. 8 Defensio empiricorū.  
 Cur animalia ad coi- 119. 15  
 tū excitentur. 360. 22 Definitio cephalæ &  
 Cur febris vehemens notæ. 173. 18  
 pleuritidem sequa- Delatio à ventriculo  
 tur. 263. 2 ad intestina, à natu-  
 Cur fiat conuulsio. rali facultate fit. 348  
 144. 19 Delirium. III. 3. & II. 2.  
 Cur melancholici ti- 27. & 280. 10  
 meant. 162. 1 Delirium à septo trās-  
 Cur tāgentibus obste uerso. 282. 12  
 tricibus vterus sur- Delirium Galeni ad-  
 sum & in latus retra huc pueri. 192. 3  
 hi videatur. 368. 17 Dens vertebra cerui-  
 Curatio. 54. 24 cis vocata. 202. 18  
 Curatio affectuum ca Dētiiformis vertebra,  
 pitis. 110. 5 205. 7  
 Curatio vniuersi cor- Dentium stupor. 72. 8  
 poris præmittenda. Destillatio. 139. 16  
 125. 1 Desiderium renū na-  
 Curat Galenus suffu- turale. 340. 20  
 fionis accidētia per \* Diabete ad ventricu-  
 epistolas. 190. 4 lum non pertinet.  
 Cuti subtenfa mem- 342. 29  
 na, & in media carne Diabetes. 338. 22

b



# I N D E X.

- |                        |                         |                        |
|------------------------|-------------------------|------------------------|
| Diabetes proprius re-  | causa.                  | 232.19                 |
| num affectus.          | 344.24                  | Digitus affecti.       |
| Diadofis à ventre ad   | Digitus resoluti.       | 47.16                  |
| hepar.                 | 339.21                  | Dilatatio thoracis in  |
| Dialectica problema-   | angustia spiritus.      | 215                    |
| ta.                    | 47.8                    | Dilatatio thoracis quā |
| Dialectica quæstio.    | do vehementior aut      |                        |
| 6.14                   | periculosior.           | 237.10                 |
| Diaphragma.            | 279.6                   | Diogenes Cynicus li-   |
| Diaphragmatis vsus     | bidini indulgit, vt no- |                        |
| ex Platonis senten-    | xam retenti seminis     |                        |
| tia.                   | 279.8                   | euitaret.              |
| *Differentiæ atræ bi-  | Διοτρομὸς.              | 118.25                 |
| lis.                   | 149.16                  | Dissectio musculorū    |
| Differentiæ dyspnœa    | epigastrij.             | 296.2                  |
| rum.                   | 238.14                  | Dissectio recurrentiū  |
| Differentiæ dolorum    | neruorum.               | 228.10                 |
| capitis.               | 174.11                  | Dispositio cataſche-   |
| Differentiæ melanco-   | fin.                    | 118.20                 |
| licorum.               | 161.5                   | Dispo cœliaca.         |
| Differentiæ pituitæ.   | Dispositio & causa.     | 58                     |
| 148.27                 | Dispo hæctica.          | 118.19                 |
| Difficultas motus cru  | Dispositio propria.     | 14                     |
| ris ex suppuratone     | Dispositio renū quid    |                        |
| orta in altera nate.   | differat ab intestino   |                        |
| 218.3                  | rum & ventriculi di     |                        |
| Difficultas spirādi ab | spositione.             | 342.17                 |
| affecto corde.         | 261.2                   | Dispo nes mixtæ.       |
| Difficilis spirationis | Dispositiões variæ do   |                        |
|                        | lorem                   |                        |



# I N D E X.

- lorē excitātes. 238. 27    Dolor ex læso cere-  
Dipsacos. 338. 23    bro. 109. 20  
Dissipatio ciborū. 343    Dolor grauis. 95. 12. &  
Dissolutio animæ ef- 175. 19  
fentia. 257. 10    Dolor hepatis. 94. 22  
Distentio neruorum. Dolor infixus. 91. 11  
82. 21    Dolor inhærēs. 94. 17.  
Distentio neruorū ob Dolor intestinorum  
semē retentū. 179. 17    19. 13  
Diuisiones vasorū cir Dolor lacerās. 92. 12  
ca pulmonem. 276. 1    Dolor lateralis simi-  
\*Dodecadactylos. 340    lis pleuritidi. 278. 6  
Dogmatici. 120. 12    Dolor laxus. 88. 6  
Dolor. 59. 7    Dolor leuiter acutus.  
Dolor ab inflāmatio- 90. 5  
ne. 62. 13    Dolor mordax. 175. 17  
Dolor atrox. 95. 9    Dolor nephriticus.  
Dolor angustiaē ple- 334. 20  
nus. 83. 26    Dolor nō infestat eos  
Dolor austerus. 93. 1    qbus à pulmone san-  
Dolor circa membra- guis erumpit. 223. 20  
nas. 84. 10    Dolor pertendens.  
Dolor cordis. 292. 29    78. 19  
Dolor dorsi gulę affe- Dolor profundus. 83. 2  
ctum indicat. 287. 28    Dolor prurigin. 90. 28  
Dolor dulcis. 90. 19    Dolor pūctorius. 72. 5  
Dolor extēsiuus. 65. 27    Dolor pulsatorius. 64.  
Dolorē excitantes va 27. & 77. 6. & 78. 15  
rię dispositiones. 238    Dolor stringens. 93. 3  
b 2    Dolor



# I N D E X.

Dolor stimulanſ. 92.1	poſſunt. 96. 16
Dolor tenuiũ inteſti- norum. 332. 6	Dorſalis medul. 279. 15
Dolor tenſiuſ. 175. 15	Dorſi dolor gulæ affe- ctum indicat. 287. 28
Dolor torpiduſ. 95. 4	Dracunculuſ à barba- ris, vena medem no- minatur. 337. 8
Dolor vteri in coxam tranſienſ. 373. 5	Duo genera motu. 27
Dolor ulcerofuſ. 89. 22	*Dyſenteria. 3. 16
Doloreſ colici. 68. 26	& 21. 8
Doloreſ colici dyſen- teriã præcedũt. 71. 9	Dyſenteria cruenta. 71. 15. & 317. 8
Doloreſ membrana- rum oſſibuſ adiacen- tium. 87. 13	Dyſenteria propriẽvo- cata. 327. 10
Doloreſ renum. 69. 18	Dyſenteria hepaticæ ſigna. 328. 16
Doloreſ ſublimiorum inteſtinorum. 332. 12	Dyſenteria præcedũt doloreſ colici. 71. 9
Doloreſ vteri. 93. 4	Dyſpnœarũ differen- tia. 238. 14
Doloriſ cauſæ. 20. 7	<b>E</b> lephas. 153. 24
Doloriſ modi. 66. 7	<b>E</b> miſſio ſanguiniſ pertuſſim. 244. 26
Dolorum capitiſ diffe- rentiæ. 174. 11	*Ephelciſ. 225. 2
Dolorum differentia quadriſariam ſumi- tur. 69. 6	Ephelciſ, cruſtula. 5. 23
Dolorum <i>voñores</i> . 98. 3	Epigaſtrij muſculorũ diſſectio. 296. 2
Dolorũ nomina. 73. 2	Epigaſtrij muſculorũ abſceſſuſ. 304. 27
Dolorũ qualitateſ ſim- pliceſ explicari non	Epig



# INDEX.

- Epiglottis. 3.24 307.18  
 Epilepsia. 146.17 Excrementa intestinū  
 Epilepticæ cōuulsiones affectum indicātia.  
 quare in comitali 36.16  
 morbo fiant. 168.17 Excremēta spontē de-  
 Epileptici. 152.27 iecta. 53.25  
 Epistolæ Archigenis. Excrementa thoracis  
 126.27 spuendo reiecta. 263  
 Erosæ venæ aut ruptæ Excrementa triplicia.  
 accidentia. 288.8 124.6  
 Erosio in vtero. 375.4 Excremēti reiecti ma-  
 Erosio vasis in pulmo gnitudo. 3.6  
 ne. 246.18 ab Excremētis alui in  
 Error Archigenis. 11.15 iudicium affecti ieco-  
 Error Asclepiadis. 16.5 ris. 310.23  
 Erysipelas. 244.6 Excrementorum cōsi-  
 Erysipelas pulmonis. deratio in morbo re-  
 244.8 gio. 319.23  
 Erysipelatodes phleg- Excremētorum in dy-  
 mone. 297.27 senteria cōsideratio.  
 \*Essentiæ animæ disso 327.20  
 lutio. 257.10 Excrementum. 314.25  
 Essentiæ partium pro Excretio puris per vri-  
 prietas. 2.12 nas. 338.3  
 Essentiæ magnitudo. Excretio vrinæ ppria  
 3.13 vesicæ actio. 345.29  
 \*Ethmoidea ossa. 182. Exercitatio circa si-  
 Excrementa. 14.20 gna. 104.14  
 Excrementa hepatica Exercitationis modi  
 b 3 tres



# INDEX.

- tres. 57. 24      tum. 230. 25  
 Exercitationis via ad      **F**aciei musculorū  
 affectorū locorum      offensio, à dex-  
 notitiam. 241. 3      tra in aduersam par-  
 Ex mēstruorum reten      tē, deflectitur. 200. 21  
 tione oritur plenitu      Faciei nerui. 195. 13  
 do venarum & vin-      Faciei nerui affe. 178  
 culorū vteri. 183. 11      Facies quādo sensum  
 Exprimētum in affe      aut motum amittit.  
 ctu colico. 34. 20      199. 13  
 Expiratio. 229. 25      Facul. alteratrix. 314  
 Expiratio à qbus mu-      Facultas animæ prin-  
 sculis fiat. 231. 14      ceps. 16. 8. & 107. 11  
 Expirationem & exuf      Facultas animalis. 45. 5  
 fationem efficiētes      Facul. attractrix. 314. 15  
 musculi. 231. 14      Facul expultrix. 314. 23  
 Expuitionem & vomī      Facultas neruorū ter-  
 tionē sanguinis ex-      tiæ cerebri coniuga-  
 citat epota hirudo.      tionis. 194. 14  
 225. 6      Facultas propria he-  
 Expultrix facultas.      patis. 306. 13  
 314. 23      Facul. retentrix. 314. 24  
 Exquisita pleuritis.      à Facultate naturali  
 262. 25      fit delatio à ventri-  
 Extrēsiu<sup>9</sup> dolor. 65. 27      culo ad ītestina. 348  
 Exufflatio. 229. 26      Faculta. cōes. 306. 16  
 Exufflatio strepens.      Facul. naturales. 314. 13  
 230. 12      Fauces. 212. 6  
 Exufflatio cirra strepi      \*Febres ardentes. 297  
    Febres



# INDEX.

- Febres morbi melan- rum per quæ nerui  
cholicū morbū con- exeunt. 208.14  
trahunt. 156.23  
Febris vehemens cur se Fractu. caluariae. 108  
quæ pleuritidē. 263  
Fellis folliculi imbe- Fractura capitis. 151.17  
cillitas. 321.21  
Femen. 11.24  
\*Fibra. 62.14  
Fist. enea, catheter. 9.  
Fistulosum nervosūq; Frigidæ & vitiosæ a-  
corpus caulis virilis. quæ potio. 325.19  
384.2  
Frigidæ potio. 131.14.  
\*Flatus. 42.3 & 302.29  
Flatusq; melancholicæ Frigus vehemens le-  
causæ. 158.9 thargū excitat. 170  
Flatusosus & hypochō Frustra pulmonis per  
driacus morbus. 157 sputū eiecta. 248.21  
13. & 292.3  
Fluor vrine subito eue Frustrulum tunicae ex-  
niens in renibus. 341 cretum. 38.3  
24.1  
Fluxio in pulmonib. **G** Galeni adhuc pue-  
235.22. ri deliriū. 192.3  
\*Foliata & spicata vn Galeni colica. 67.25  
guenta. 249.10  
Folliculi fellis imbe- Galeni deliberatio de  
cillitas. 321.21 empiricis & dogma-  
Foramina vertebra- ricis. 120.6  
Galeni gloria. 122.10



# INDEX.

- Galeni iactantia. 120.    Grauis dolor. 95.12.8  
 Gal. curat suffusionē 175.19  
 per epistolas. 190.4    Grauitas capitis. 136.9  
 Galenus deceptus. 68    Grumi in vesica & a-  
 Gal. p̄dicat medicū nō    liis internis partib⁹  
 affligi pleuritide. 311    notæ. 251.7  
 Galenus prænunciat    Grumus. 10.2  
 futurā in seipso phre    \*Gula. 283.28  
 nitidem. 192.15    Gulæ abscessus. 287.8  
 Gangrana. 77.21    Gulæ affectū indicat  
 \*Genera intemperan-    dorsi dolor. 287.28  
 tiæ. 126.3    Gulæ imbecillitas.  
 \*Gibbarū iecoris p̄tiū    286.18  
 inflammatio. 295.21    Gulæ inflāmatio. 285.6  
 Gibbus quando acci-    Gulæ tumor cū imbe-  
 dit. 206.21    cillitate. 286.23  
 \*Glans pudēdi. 380.2    Gulæ tumor cū inflā-  
 Gloria Galeni. 121.20    matione. 286.26  
 \*Gonorrhæa. 377.9    Gulæ vlcus. 288.19  
 Gonorrhæa vnde di-    Gulæ vlceraatē indi-  
 cta. 377.23    cia. 287.17  
 \*Grāmaticus quidam    Gustus. 194.12  
 iuuenis, ex vehemē-    Gustus p̄prietas inef-  
 tia in docendo labo    fabilis. 96.24  
 re comitali morbo    Gutta aquæ, lapidem  
 correptus. 290.3    excavans. 23.4  
 Grando ex pulmone.    **H** Aemodia. 72.7  
 249.17    **H** Hæmorrhoides.  
 Grauedo. 139.17    71.23  
 Haud



# INDEX.

- Haud secus nocet sup** Hirudine corrept<sup>o</sup> in-  
 pressum sperma, ac uenis ad nariū mea-  
 venenati animalis tum. 226.21  
 ictus. 361.18  
**Hectica dispositio.** 118  
**Hedychroum medica** rib<sup>o</sup> adhærēs, expui-  
 -mentum. 249.4 tionē & vomitionē  
**Hemicrania.** 175.2 sanguis excitat. 225.6  
**Hemicraniæ sphace-** Historia adolescentis  
 lodes. 175.27 Mytilenæi. 4.6  
**Hepatica excremen-** Historia devino. III. 25  
 ta. 307.18 \*Hædi naturalis indu-  
**Hepaticæ dysenteria** stria. 380.19  
**signa.** 328.16 **Holcimos.** 93.12  
**Hepatis dolor.** 94.22 \*Humiditas & frigi-  
**Hepatis inflāmatio.** Humor acris singultū  
 85.24. & 195.24 & conuulsionē effi-  
**Hepatis obstructio.** cit. 169.17  
 100.21. & 300.19 **Humor crassus morbi**  
**Hepatis propria facul** comitialis causa. 147  
 tas. 306.13 **Humor in ambiente**  
**Hepatis scirrhus.** 100. cor tunica contētus.  
 22. & 299.12 258.13  
**Hiera.** 33.26. & 149.16 **Humor vitreus.** 68. &  
**Hydrops ex indurato** 149.6  
 liene. 324.15 **Humores crassi in ce**  
**Hypofarca** 302.5 rebro. 152.14  
**Hippocrates in libro** **Humores crassi urinā**  
 de articulis. 270 supprimentes. 10.20



I N D E X.

Humoris ad caput	bus regius. 324.24
in epilepsia ascen-	Iecori qd conferat ve
fus. 164.15	na miseraica. 315.17
Humorū retent. 378.10	Ieco. affecti notē. 297
Humorū secretio. 378	Iecoris imbecillitas.
*Hydropicorum affe-	306.6
ctus. 302.13	Iecoris intemperan-
Hydrops matelle. 338	tia. 307.2
Hypocondriacā affe-	Iecoris obstructionū
ctiones. 151.13	signa. 295.15
Hypochondriac <sup>9</sup> mor	Iecoris positio exte-
bus. 292.3	rior. 297.3
Hypochondriac <sup>9</sup> flatuo	Iecoris simarū partiū
susq; morbus. 157.13	inflammatio. 298.7
ὑποχονδριᾱσμός. 324.12	Iecoris splenisq; vitia
Hysterica accidentia.	color declarat. 305
364.15	*Ignavia. 388.15
Hysterica accidentia	Ileos. 332.24
ad vterū p̄tinēt. 364	Illæso motu sensus a-
Hysterica mul. 355.28	missus. 49.8
I Actātia Gal. 120.28	*Imagines oculorum.
Ictus phalāgij. 166.	17.13
23	Imagines variæ me-
Iecinoris affecti indi-	lancholicorū. 161.1
cium ab excremen-	Imbecillitas folliculi
tis alui. 310.23	fellis. 321.21
Iecinoris calida intē-	Imbecilli. gulæ. 286.18
peries. 308.28	Imbecil. iecoris. 306.6
Ex iecore affecto mor	Imbecillitas renū. 338
	Imb



# INDEX.

- Imbecillit. spinę. 215.1  
 Immodicè vacuato-  
 rum menstruorū ac-  
 cidentia. 374.12  
 Impedita spiratio. 171  
 Imperatoris seruus q-  
 dam à vipera mor-  
 fus. 303.24  
 \*Incoëta pleur. 278.4  
 Indicia vlceraatę gu-  
 lę. 287.18  
 Industria hoëdi natu-  
 ralis. 380.19  
 Ineffabile. 74.2  
 Infixus dolor. 91.11  
 Inflāmatio gibbarum  
 iecoris signa. 295.21  
 Inflāmatio gulę. 285.6  
 Inflāmat. cordis. 259.7  
 Inflammatio hepatis.  
 85.24. & 105.24  
 Inflammatio iecoris  
 partiū simarū. 298.7  
 Inflāmationes inter-  
 costalium. 262.12  
 Inflammatio mesen-  
 terij. 316.3  
 Inflāmatio partiū cō-  
 iunctiū hepar. 106.17  
 Inflammatio pulmo-  
 nis. 244.4  
 Inflammationis acci-  
 dentia. 81.1  
 Inflammatorius affe-  
 ctus. 63.14  
 Inflammatu muscu-  
 lus. 62.21  
 Ingens sitis citra dia-  
 betem. 344.10  
 Inhærens dolor. 94.17  
 Initiū neruorū. 170.28  
 Instrumētales morbi  
 oris ventriculi. 293.8  
 Instrumenta natura-  
 lia & animalia. 56.7  
 Instrumēta vocis. 42.5  
 & 227.10. & 116.25  
 Instrumētaliū & si-  
 milarium partium  
 affectus. 198.10  
 Instrumentorum se-  
 minis affectio go-  
 norrhæa. 379.7  
 Instrumentorū voca-  
 lium officium quan-  
 do læditur. 117.17  
 In stultitia somnus  
 obseruandus. 139.5  
 Intemp



# I N D E X.

Intemperantiæ gene- ra. 126.3	Intestinorum tenuio- rum dolor. ibid.6
Intemperantiæ ieco- ris. 307.2	Intestinorum vulnus. 4.19
Intemperies æqualis & inæqualis pulmo nis. 244.13	Intestinum affectum excrementa indican- tia. 36.16
Intemperies calida ie- coris. 308.28	Intestinum vitiatum expurgante medica- mento. 35.5
Intensus vterus quo- modo crebram effi- ciat respirationē. 366	Inuita stercoris & vri- næ emissio, à resolu- tis nervis. 348.22
Intercostales muscoli lesi, vocē vitiāt. 43.1	* Irrationalis obliuio. 281.10
Intercostales muscoli spirationem adiu- uant. 205.25	* Ischuria. 345.10
Intercostalium inflā- mationes. 262.12	* Itria. 29.29
Interrogādus ægrot⁹ de suo affectu. 286.1	* Iuuenis, hirudine ad- narium meatum cor- reptus. 226.21
Intestina non trahunt succum à ventricu- lo. 340.2	<b>L</b> Acerans dolor. 92.12
Intestinorum dolor. 19.13	Lactuca. 136.7
Intestinorū ordo. 331	Læsa actio. 28.17. & 37.14. & 104.26. 121. 29
Intestinorū sublimio- rum dolores. 332.12	Læsa memoria. 124. 21. & 135.15
	Læsi intercostales mu- sculi



# INDEX.

- sculi vocē viciāt. 43.1  
 Lætio actionis. 121.29.  
 & 124.14  
 Lamæ. 353.20  
 Lapis ex ano per ti-  
 nesmū eiectus. 329.11  
 Lapis in vesica urinā  
 supprimit. 350.29  
 Latētia animalia. 112.  
 7. & 136. 4  
 Lateralis dolor simi-  
 lis pleuritidi. 278.6  
 Lateralis morbi, no-  
 tæ. 102.19  
 Latus muscul⁹. 209.14  
 Laxus dolor. 86.6  
 \*Lethargus. 135.24. &  
 140. 12  
 Lethargus à vehemē-  
 ti frigore. 170. 6  
 \*Libera spiratio. 215.15  
 Libidinis, cogitatio  
 priapismum exci-  
 tat. 387.13  
 Lien induratus, hydro-  
 pem gignit. 324. 15  
 Lienis affectus quib⁹  
 notis discernant. 323  
 Lienis officium. 323.24  
 Lienteria. 333. 10  
 Ligulæ vlcus. 247.6  
 Linguae comm unica-  
 tio cum cerebro per  
 nervos. 197.23  
 Linguae motio. 382. 23  
 Linguae motus à qui-  
 bus nervis. 194.26  
 \*Loci corporū parti-  
 culæ. 1.19  
 Locorū affectorū ge-  
 nerales notæ. 104.1  
 Locorum affectorum  
 quintuplex deprehē-  
 sio. 37.6. & 123. 23  
 Locus. 39.16. & 57.28  
 Locus quinque modis  
 deprehenditur. 37.6  
 Logicæ quæst. 116.3  
 Λογικῆς διαγνώσεως. 183  
 Loquela. 227.6  
 Loquendi vsus. 231.19  
 Lordosis vertebrarū lu-  
 xatio ad iterna. 206  
 Luxatæ exteri⁹ verte-  
 bræ, strāguriā quidā  
 induxerunt. 349.23  
 Luxatio spinæ angu-  
 losa. 208.3



# I N D E X.

Luxatio spinæ in obli- Medica nomina. 26.25  
 quum. ibid. 10. Medicamē cōtra mor-  
 Luxatio vertebrarum bum comitialē. 168.  
 ad interna. 206.10. Medicamētū ex aloë.  
 Luxationis vertebra- 290.24  
 rum causæ. 210.6. Medicamentum hedy-  
**M**agnæ respira- chroum. 249.4  
 tionis differen- Medicatio pulmonis  
 tiæ. 236.20. à putrefaciente hu-  
 Magnetis vis. 362.21. more affecti. 249.1  
 Magnitudo essentia. Medulla spinalis. 201.  
 3.13. 20. & 279.15  
 Māmæ turgidæ. 388.17. Medullæ spinalis ner-  
 Maior noxa ex reten- uis. 177.20  
 to semine, quàm mē Medullæ spin. sectio,  
 struis. 359.24. quā noxā adfert. 178  
 Mania. 140.14. Mel. 31.25  
 Marina torpedo vene Melancholia. 140.14.  
 nosa. 362.13. & 150.15  
 Marina turtur vene Melancholia à vētri-  
 nosa. 165.26. culo orta. 157.12  
 Matellæ hydrops. 338. Melancholiæ acciden-  
 \*Meatus vrinx, trifa- tia. 162.27  
 riam stipatur. 8.22. Melācholiā quomō  
 Meatus vrinarius à curauerit Gal. 163.7  
 crasso pure obstru- Melancholica mœsti-  
 ctus. 350.29. tia. 324.8  
 Media vena secāda in Melācholicā mœstia  
 melancholicis. 157.1. ab affecto liene. 326  
 Mel



# I N D E X.

- Melancholia flatuo- Menstrua. 71.23  
 ſæ cauſæ. 158.10 Menſtrua prægan-  
 Melancholici. 152.27 tium. 375.10  
 Melâchol.cibi. 155.13 Menſtrua retêta panû  
 Melancholici cur ti- generant. 373.13  
 meant. 162.1 Menſtruorum immo-  
 Melancholici ſangu- dicè vacuatorû acci-  
 nis notæ. 154.12 dentia. 374.12  
 Melancholicorû dif- Menſtruorû retentio  
 ferentia. 161.5 plenitudinē venarû  
 Melancholicorû va- & vinculoꝝ vteri  
 riæ imagines. 161.1 excitat. 371.9  
 Melancholicus mor- Menſtruorû ſuppreſ-  
 bus p febriles mor- ſorum notæ. 372.16  
 bos cōtractus. 156.23 Mentē quare phrenas  
 Mēbrana coſtas ſuc- appellauerint anti-  
 cingēs. 271.1. & 274.8 qui. 282.18  
 Membrana cuti ſub- Meſeraici. 315.10  
 ſtrata, & in media Meſenterij inflamma-  
 carne. 86.28 tio. 316.3  
 Membranarum do- Meſeraicæ venæ quid  
 lor. 84.10 cōferât iecori. 315.17  
 Membranarum oſſi- Method⁹ Gal.in mor-  
 bus adiacētium do- borum curat. 123.15  
 lores. 87.13 Methodus vniuerſalis  
 Memoria amiſſa. 139 inueniendi locum.  
 Memoria læſa. 124.21. 101.17  
 & 135.15 \* Miſſio ſanguinis in  
 Meningophilax. 197.8 melancholia. 154.15  
 Mity



# INDEX.

- Mitylenæi adoleſcen- cit natura. 24.4  
tis historia. 4.6 Morbus. 27.6  
Mixtæ diſpoſitiones. Morbus Antipatri Me-  
138.15 dici quo extinctus  
\*Mœſtitia melâcholi- eſt. 250.12  
ca ab affecto liene. Morbus comitialis.  
326.3 146.13  
Mœſtitia melancho- Morbus comitialis ab  
lica. 324.8 atra bile. 150.10  
Modi doloris. 66.7 Morbus comitialis à  
Modi exercitationis crasso humore. 147  
tres. 57.25 Morb' comitialis cur  
\*Morales actiões. 137 epilepticas habeat  
Morbi Antipatri cau- conuulſiones. 168.17  
ſa. 252.2 Morb' comitialis, in-  
Morbi comitialis cau- ter ſoporē & apople-  
ſa ex Pelopis ſentē- xiam mediis. 196.15  
tia. 166.10 Morbus factus. 22.19  
Morbi comitialis dif- Morbus ſiens. ibidem  
ferētē & ſpecies 163 Morb' flatuoſus & hy-  
Morbi comitialis me- pochondriac'. 292.3  
dicamen. 168.2 Morb' hypochōdria-  
Morbi regij cauſæ & cus & flatuoſus. 157  
indicia. 343.12 Morbus lateralis aut  
Morbi lateralis notæ. pleuritis vñ fiat. 277  
102.19 Morb' melâcholicus  
Morbi oris ventriculi per febriles morbos  
instrumentales. 293 contractus. 156.23  
Morbos exiguos vin- Morbus regius. 153.24  
Morb



# I N D E X.

- Morbus regius à sple Motū voluntariū non
- ne 304.22 habet vesica. 346.25
- Morbus regius citra \*Muliebri profluuiū.
- febrē quomodo cu- 374.21
- ratur. 321.8 Mulieres hystericæ.
- Morbus regius ex af- 355.28
- fecto liene & ieco- Mulieres viduæ vteri
- re. 324.24 suffocationibus la-
- Morbus regius post borantes. 358.11
- febrē acutam succe- Multarū pulsationū
- dens. 320.15 cumulus systemati-
- Mordax dolor. 175.17 cæ. 251.11
- Morsus viperæ. 303.24 Multi puris in pulmo
- Motio linguæ. 382.23 nibus collecti notæ.
- Motionis principium 242.17
- neruis à voluntate Multitudo & magnitu
- q̄ est ī cerebro. 145.7 do nausæ, colicum
- Motores nerui oculo- affectum à nephriti
- rum. 185.7 de distinguit. 334.24
- Motus difficultas or- Mun<sup>o</sup> musculorū oca-
- ta in crure, ex suppu- los mouentiū. 186.1
- ratione orta in alte Musculi ani act. 347.13
- ra nate. 218.3 Musculi circa spinam
- Motus gñā duo. 27.3 affecti. 54.9
- Motus & sensus deper Musculi expirationē
- ditī. 220.13 & exufflationē effi-
- Motus linguæ à quib<sup>o</sup> cientes. 231.14
- neruis fiat. 194.26 Musculi intercostales
- Motus volūtari<sup>o</sup>. 49.29 læsi vocē vitiāt. 43.1



# INDEX.

- Musculi intercostales    bos exiguos. 24.4  
 spirationē adiunāt. Naturale renū deside-  
 205.25 rium. 341.20  
 Musculi oculorū sex. Naturales facult. 314  
 185.13 Naturalia instrumen-  
 Musculi supernā palpe ta. 56.7  
 brā mouentes. 187.2 à Naturali facultate  
 in Musculis epigastrij fit delatio à vētricu  
 abscessus. 304.27 lo ad intestina. 348.3  
 Musculorū cōpositio. Nausea. 33.15. & 292.28  
 55.25. & 61.27. 88.26 Nauseæ multitudo &  
 Musculorū epigastrij magnitudo, colicū  
 dissectio. 296.2 affectum à nephriti  
 Musculorū faciei of- de distinguit. 334.24  
 fensio, à dextra ī ad- \*Nephriticorū signa,  
 uersam partem de- quantum à colicis  
 flectitur. 200.21 differunt. 330.15  
 Musculorū mun' ocu- Nephriticus dolor.  
 los mouentiū. 186.1 334.20  
 Musculorum thoracis à Nephritide quomo  
 actio, per somnū ser do discernas affectū  
 uatur. 256.6 colicum. 329.24  
 Musculus inflamma- Nephritidis notæ. 70.3  
 tus. 62.21 Nerui ad cutē manus  
 Musculus lar'. 209.14 perueniētes. 181.23  
**N**arium pinne cō Nerui ad faciē. 195.13  
 tractæ in dys- Nerui ad os vētriculi  
 pncea. 234.19 pertinētes cōuulsio-  
 Natura vincit mor- nem inferunt. 291.22  
 Nerui



# I N D E X.

- Nerui à spina in faciem. 201.12 Neruorum cōparatio ad fides lyricas & lo-  
 ra. 145.25  
 Neruis ex primis spinæ vertebri ad ca- Neruorum distentio.  
 put. 220.1 82.21  
 Nerui faciei affecti. Neruorum distēfione  
 178.27 laborans quædā vi-  
 Nerui habēt p̄icipiū dua, ob retentū se-  
 motionis à volūtate men. 361.3  
 in cerebro sita. 145.7 Neruorū initiū. 170.28  
 Nerui linguæ moto- Neruorū origo. 142.14  
 res. 194.26 Neruorū q̄ in primo  
 Nerui oculorum mo- & secūdo intercosta-  
 tores. 185.7 li spatio sūt pductio  
 Nerui recurrētes. 44 vsq; ad manū. 217.10  
 Nerui septi trāsuerfi. Neruorū recurrentiū  
 205.17 dissectio. 228.10  
 Nerui spinalis medul- Neruorum resolutio.  
 læ. 177.20 177.10. & 180.26  
 Nerui vocales. 44.19. Neruorū rigor. 146.17  
 228.1 Neruorum spinæ affe-  
 à Neruis resolutis, iui- ctorum notitia. 51.25  
 tavrinx emis. 348.22 Neruorū tertiæ cere-  
 Neruorū à ceruice or- bri cōiugationis fa-  
 torū productio & cō- cultas. 194.14  
 fusio. 48.11 Nervus. 142.18  
 Neruorū ad tempora, Nervus opticus offen-  
 nares, & labra p̄tinē sus. 186.21  
 tiū dissectio. 200.4 Nervus tertiæ coniū-



# I N D E X.

- |                                      |                                     |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| gationis mollis di-                  | rū affectorum. 104.1                |
| ctus. 198.2                          | Notæ grumi in vesica                |
| Nervus visific <sup>9</sup> . 184.24 | & aliis partib <sup>9</sup> . 351.7 |
| *Nicander. 112.17                    | Notæ iccoris affecti.               |
| Nidorosus ruct <sup>9</sup> . 30.24  | 297.8                               |
| Nimia refrigeratio.                  | Notæ lateralis morbi.               |
| 60.5                                 | 102.19                              |
| *Nomina dolorū. 73                   | Notæ melācholici san-               |
| Nomina medica. 26.25                 | guinis. 144.22                      |
| Notæ accidētium suf-                 | Notæ nephritidis. 70.3              |
| fusionis ab ore vētri                | Notæ peripneumonix                  |
| culi pcedētiū. 188.13                | 102.1                               |
| Notæ affectus scoto-                 | Notæ puris in pulmo-                |
| matici. 171.15                       | ne collecti. 242.27                 |
| Notæ anginā iudican-                 | Notæ quibus discer-                 |
| tes, nullo tamē exi-                 | nantur lienis affe-                 |
| stente in gutture p-                 | ctus. 323.13                        |
| prio affectu. 202.26                 | Notæ suppressorū mē-                |
| Notæ bronchiorū pul-                 | struorum. 372.16                    |
| monis affectorum.                    | Notæ veneni epoti.                  |
| 242.18                               | 363.10                              |
| Notæ calculi. 9.10                   | Notæ vlceris perseue-               |
| Notæ colis virilis affe-             | rātis in renib <sup>9</sup> . 336.9 |
| cti. 376.21                          | Notæ vocis obscuræ                  |
| Notæ cephalæ, & ei <sup>9</sup>      | & parvæ. 227.22                     |
| definitio. 173.18                    | Notæ vomicarū erū-                  |
| Notæ delirij phreniti-               | pentium. 352.12                     |
| dis. 280.23                          | Noxa maior ex retēto                |
| Notæ generales loco-                 | semine, quā men-                    |
|                                      | struis                              |



# I N D E X.

- struis. 359.24 \*Officiū lienis. 323.24  
 \*Nullus ramus venæ Officium vesicæ con-  
 à concaua in pulmo tractio. 347.5  
 nem. 272.9 Officium vocaliū in-  
 Obliqua spinæ tor strumentorū quan-  
 tio. 207.5 do læditur. 117.17  
 Oblivio irrationalis. \*Olfaciendi vis læsa.  
 281.10 182.14  
 Obscuræ & parvæ vo \*Opinio. 197.10  
 cis causæ. 227.22 Opticus nervus offen-  
 Obstructio hepatis. sus. 186.21  
 100.21. & 300.19 \*Ora venarum ad vte-  
 Obstructionē iecoris rum. 367.13  
 signa. 295.14 Ora venarum quādo  
 Obstructus meat⁹ vri aperiuntur. 246.11  
 narius à crasso pure. Ordo intestinorū. 331.15  
 350.29 Ordo vasorum. 83.8  
 Oculorum imagines. Origo neruorū. 142.14  
 17.13 Origoveriginosi affe-  
 Oculorū motores ner ctus. 172.22  
 ui. 185.7 Oris ventriculi sensus  
 Oculorū musculi sex. exquisitus. 176.2  
 185.17 Orthopnoea. 102. 3.  
 \*Oesophagus. 283.25 211.2  
 Oesophagi affectus. \*Ossibus ethmoidea.  
 284.12 182.19  
 Oesopha. tunicę. 284.8 Ossib⁹ adiacentiū mē-  
 Oesophagi vsus du- branarū dolo. 87.13  
 plex. 284.2 Ostocopi. 87.18



# INDEX.

- Os ventriculi. 100.15. Paradoxon. 48.26  
 & 288.25 Paralyfis .54.21.63.27  
 Os ventriculi cor ab 177.4.180.27. & 195.3  
 antiquis nominatū. Paralyfis apoplexiæ  
 288.26 succedit. 196.8  
 Os ventriculi, Galeni Paralytici ab angina.  
 tempestas vocabat 204.12  
 stomachum. 288.28 Parafynanche. 211.25  
 Os ventriculi stoma- Paraphrosyne. III.7. &  
 chus. 100.15. & 169.5 150.20  
 Os vteri nouem men- Pars affecta dignoscē  
 sibus, ita claudit, vt da priusquā adhi-  
 ne specilli acumen beant remedia. 219.8  
 admittat. 383.26 Pars affecta quādo di-  
 \*Oua fricta. 30.2 catur. 20.17. & 118.4  
**P**Alpebrā superio- Pars altera spinæ affe-  
 rē mouentes mu cta. 51.3  
 sculi. 187.2 Pars animæ quomo-  
 Palpitatio colis. 386.3 do lædatur. 108.5  
 Palpitatio cordis. 258 Pars anterior cerebri  
 in Palpitatione cor- affecta. 195.21  
 dis detractio sangui Partes principes cor-  
 nis utilis. 259.24 poris. 254.6  
 Panniculi cordis affe Partes ventriculi. 326  
 ctus. 260.23 Particulæ corporū lo-  
 Panis. 31.22 ci dicti. 119  
 Panus. 133.12 Partium continentiu  
 Panus ob retēta men- hepar inflammatio.  
 strua. 373.13 106.17

Partium



# I N D E X.

- Partium essentia pro- Phrenæ terminus quo  
prietas. 2.12 pars thoracis infe-  
Pausania curatio. 181 rior finitur. 275.1  
\*Pelops præceptor. 165 Phrenas quare mentē  
Penis rigidus cuidam appellauerint anti-  
ob Veneris desuetu qui. 282.18  
dinem. 387.20 Phrenitic<sup>9</sup> vitrea vasa  
Per consensum affici. & lanifici puerū ex  
41.10 fenestra delicit. 191  
Pericardij affect. 260. Phrenitica indicia, p  
23 cerebri affectū. 281.4  
Perinecos. 11.25 Phrenitidē ī seipso præ  
Peripneumonia. 64.2. nūtiat Galen<sup>9</sup>. 192.15  
& 26 3.11 Phrenitis. 140. 12. 150  
Peripneumoniæ no- Phrenitidis delirij no  
tæ. 102.1 tæ. 280.23  
Peritonei vulnus. 5.9 Phrenitidis spēs. 91.10  
Pertendēs dolor. 78.19 \*Pica. 292.23  
Peruersiōes vteri. 371.9 Pilis similia quædam  
Pessima spiratio. 179.14 in vrinis. 336.27  
\*Phalangij parui iet<sup>9</sup>. Piscator circa sedē &  
166.23 vesicam infrigida-  
Phalangium. 165.20 tus. 218.23  
Philōis antidotū. 70.1 Pituita. 148.20  
Phœnices amatores à Pituitæ differentia.  
cibo abstinēt. 368.1 148.27  
Phlebotomia. 128.10 \*Placitorum variorū  
Phlegmone erysipela philosophorum enu  
todes. 297.27 meratio. 134.1



# INDEX.

Platonis sententia de vtero.	365.12	Potio vini moderata.	136.24
Plenitudo venarū & vinculoꝝ vteri ex menstruorum retētio ne oritur.	371.9	*Præcedentes causæ vasis ruptionem in thorace aut pulmone efficientes.	245.2
Pleuritici.	85.4	Prædicat Galenus corā Glaucone medicū quendā nō pleuritide (vt putabat) sed icoris affectu laborare.	311.16
Pleuritis. 64.5. & 105.13. & 119.7		Prægnantem indicat clausa vteri ceruix citra duritiē.	372.22
Pleuritis exquisita.	262.25	Prægnantiū menstrua	375.10
Pleuritis iſcocta.	278.4	Præunntiat futurā in seipſo phrenitidem Galenus.	193.15
Pleuritis vnde fiat.	277	Priapismi affectus vnde.	385.16
24		Priapismus.	377.12
in Pleuritide aut pulmonū dolore, sputi cōsideratio.	243.4	Priapismus colis acci dens.	379.9
Pleuritidē cur sequatur febris vehemēs.	263.2	Priapismum excitat libidinis cogitatio.	387.13
Pleuritidis accidētia.	277.27	Primitiuus affectus.	109
*Positio icoris exterior.	297.3		
Positus.	37.23		
Potio aquæ vitiosæ frigida.	325.19		
Potio frigida.	131.14. & 302.19		



# INDEX.

- 109.10  
Primogenitus affectus. 140.19  
Princeps animæ facultas. 16.8.&107.11  
Principes partes corporis. 254.6  
Principales act. 137.17  
Problemata dialectica. 47.8  
Procatarctica causa. 349.13  
Productio & confusio nervorum à ceruice ortorum. 48.11  
Profluuium muliebre. 374.21  
Profluuiū vrinæ. 338  
Profundus dolor. 83.2  
Propria accid. 39.27  
Propria actio. 107.24  
Propria disposit. 14.22  
Propria hepatis facultas. 206.13  
Propria vesicæ actio, vrinæ excret. 345.25  
Proprietas gustus ineffabilis. 96.24  
Proprij cordis affectus. 257.11  
Proprius affectus. 25.28. & 40.23. & 113.6  
Pruriginosus dolor. 90.28  
Prurigo. 90.14  
\*Pudenda rugosa can toribus. 388.1  
Pudendi glans. 380.2  
Pudendis innatæ arteria. 384.29  
Pulmo. nullum venæ ramum accipit à cōcaua. 272.9  
in Pulmone, vasis erosio. 246.18  
in Pulmonem fluxio. 235.22  
in Pulmonibus collecti puris not. 242.27  
Pulmonis affect. 241.13  
Pulmonis affectū sequitur cordis pulsatio. 257.17  
Pulmonis à putrefaciete humore affecti signa. 247.24  
Pulmo. brōchiorū affectorū notæ. 242.18



# INDEX.

- |                        |                         |        |
|------------------------|-------------------------|--------|
| Pulmonis & thoracis    | tur.                    | 257.17 |
| vomicæ expurgatæ       | Pulsatorium multarū     |        |
| per vrinas & aluum.    | cumulus.                | 251.11 |
| 354.8                  | Pulsatorius dolor.      | 64.    |
| Pulmonis erysipelas.   | 27. & 72.6. & 78.15     |        |
| 244.8                  | Pulsus.                 | 62.7   |
| Pulmonis frusta p spu  | Punctorius dolor.       | 72.5   |
| tum eiecta.            | & 91.9                  |        |
| 248.21                 | Pupillæ consideratio    |        |
| Pulmonis inflamma-     | suffusionis veræ in-    |        |
| tio.                   | dicia præber.           | 189.10 |
| 244.4                  | Puris excretio per vri- |        |
| Pulmonis intēperies.   | nas.                    | 338.3  |
| æqualis & inæquali.    | Puris multi in pulmo-   |        |
| 244.13                 | nibus collecti notæ.    |        |
| Pulmonis medicatio     | 242.27                  |        |
| à putrefaciente hu-    | Puris vacuatio ī pleu-  |        |
| more affecti.          | riticis & suppuratis    |        |
| 249.1                  | aduersus Erasistra-     |        |
| Pulmonis particulæ     | tum.                    | 270.11 |
| cum sanguine ex-       | Pus ex partibus septo   |        |
| creantur.              | superioribus in ven-    |        |
| 223.10                 | trem defluens.          | 355.6  |
| Pulmonis tuberculi     | Pus in vesica.          | 10.9   |
| signa.                 | *Pylorus.               | 159.24 |
| 241.26                 | <b>Q</b> Væ difficultas |        |
| Pulmonis tuberculū.    | spirādi oriat̃ ab       |        |
| 231.28                 | affecto corde.          | 261.2  |
| Pulmonis vasa.         | Quæstio dialect.        | 6.14   |
| 275.10                 | Quæst                   |        |
| Pulmonis vlcus.        |                         |        |
| 2.19.                  |                         |        |
| & 224.18               |                         |        |
| Pulsare torpidè.       |                         |        |
| 89.20                  |                         |        |
| Pulsatio cordis pulmo- |                         |        |
| nis affectum sequi-    |                         |        |



# INDEX

- Quæstiões logicę. 116 nis. 364.2  
 \*Qualitates dolorum Radiculæ. 30.3  
 simplices explicari Ramētum excretum,  
 non possunt. 96.16 225.3. & 353.18  
 Qualitas sputi. 103.6 Recurrētes nerui. 44.  
 Quando facies sen- Recurrentiū neruorū  
 sum aut motū amit- dissectio. 228.10  
 tit. 199.13 Refrigeratio nimia 63  
 Quare in comitiali Regij morbi causæ &  
 morbo fiant epile- indicia. 303.12  
 pticę cōuulsiones. 168 Regij morbi citra fe-  
 Quare vrinæ fluor brem curatio. 321.8  
 subito eueniat in re in Regio morbo ex-  
 nibus. 341.24 crementorum consi-  
 Quatuor modis affe- deratio. 319.23  
 ctus dephēdit. 37.12 Regius morbus. 153.24  
 \*Quid bronchia vocē Regius morbus à sple-  
 tur. 242.20 ne. 304.22  
 Quinq; modis locus Regius morbus ex af-  
 deprehenditur. 37.6 fecto liene & icco-  
 \*Quō melancholiam re. 324.24  
 curauerit Gal. 163.7 Regius morbus post fe-  
 Quomodo naturali- brem acutam. 320.15  
 ter vrina reddat. 7.23 Reiecti excrementi ma-  
 Quomodo renes tam gnitudo. 3.6  
 celeriter vrinam ad Remedia topica. 124  
 se attrahant. 340.18 Remedium præsentā-  
 R Abiē excitat spu neū ex vinculis, ad-  
 tum rabiosi ca uersus venena. 167.7  
 Renes



# INDEX.

- Renes** quomodo tā ce  
 leriter vrinam ad se  
 attrahant. 340. 18  
 à Renibus non trahit  
 vesica. 340. 1  
 In renibus vrinę fluor  
 quare citò eueniat.  
 341. 24  
**Renum** abscessus indi  
 dicia. 335. 22  
 Renum desiderium na  
 turale. 341. 20  
 Renū dispositio quid  
 differat ab intestino  
 rum & ventriculi di  
 positio. 342. 17  
 Renum dolores. 69. 18  
 Renum imbecillitas.  
 338. 12  
 Renum proprius affe  
 ctus diabetes. 344. 24  
 Repletio. 146. 2  
 Res adhærentes. 5. 17  
 Res contentæ. 4. 4  
 Resoluti digiti. 47. 16  
 Resoluti cruris sana  
 tio. 217. 27  
 Resolutio nervorum.  
 177. 10. & 180. 26  
 Resoluti. paralyfi. 93.  
 27  
 Resolurio. variæ. 179.  
 Respiratio. 357. 28  
 Respiratio crebra ex  
 intenso vtero. 366. 8  
 Respiratio fit per tho  
 racem. 240. 15  
 Respiratio suppurato  
 rum. 235. 14  
 Respiratiōis actio ad  
 thoracem pertinet.  
 276. 19  
 Respirationis magnæ  
 differentia. 236. 20  
 Respirationis vsus.  
 357. 21  
 Retentio humorum.  
 378. 5  
 Retentio vrinæ, vnde  
 fiat. 346. 12  
 Retentrix facult. 314.  
 20  
 \*Rigidus penis cuidā  
 ob veneris defectu  
 dinem. 387. 20  
 Rigor nervorū. 146. 17  
 Ructus nidorosus. 30.  
 Ruct' fumosus. 29. 27  
 Rupta



# I N D E X.

- \*Ruptæ aut erosæ ve- Sanguis à ventriculo  
næ accidentia. 288. 8 reiectus. 294. 18
- Ruptionis vasis in tho Sanguis erumpens à  
race causæ. 245. 3 pulmone, dolore nō  
Ruptionis vasis in pul infestat. 223. 20
- mone causæ. 245. 25 Sāguis per tussim eie-  
Ruptū sanantia. 33. 20 ctus, vena erosa. 222.
- S** Aliua. 149. 8 28
- Sanatio cruris reso Sapor astringēs. 95. 24
- luti. 217. 27 Sapor austerus. 95. 23
- Sāguinis detractio in \*Scirrhus hepatis. 100
- palpitatione cordis 22. 299. 12
- vtilis. 259. 24 \*Scorpio. 166. 5
- Sanguinis emissio per Scotomatici affectus  
tussim. 244. 26 notæ. 171. 15
- Sanguinis missio in \*Secretio humorum.  
melancholia. 154. 15 378. 5
- Sanguinis melancho- Sectio arteriarum ver-  
lici notæ. 154. 22 tiginosis indicta a-  
Sāguinis trāssumptio pud antiquos. 172. 7
- ex magna arteria in Sectiōes in spinali me-  
pulmonem. 269. 6 dulla quam noxam  
Sanguinis vomitio ex adferant. 178. 2
- hirudinepota. 225. 6 Secundus athleta, cō-  
Sanguinis à capite ad presso spiritu labo-  
fauces irrumpens. rans. 216. 14
- 222. 10 Sedes animæ. 147. 28
- Sāguis à toto corpore. Sedes animæ præci-  
71. 21 pua. 134. 18
- Seleu



# INDEX.

Seleucides auiculæ.	nibus.	341. 8	
340. 29	Seruus quidam à vipe		
à Semine retēro, quæ	ra morsus.	303. 24	
accidentia etiā viris	*Sigmoides cartilagi		
euenire soleant. 358	nes.	229. 10	
Seminis retenti noxa	Signa colicæ.	70. 7	
359. 26	Signa nephriticorum		
Seminis instrumento	quantum à colicis		
rum affectio, gonor-	differant.	330. 15	
rhæa.	379. 6	Signa obstructionum	
Sensoria.	194. 21	iecoris.	295. 14
Sensus amissus, illæso	Signa pulmonis à pu-		
motu.	40. 8	trefaciente humore	
Sensus amissus motu	affecti.	247. 24	
incolumi.	221. 15	Signa vomicæ erum-	
Sensus & motus de-	pentis.	352. 15	
perditi.	220. 23	Simarū iecoris partiū	
Sensus oris ventriculi	inflammatio.	298. 8	
exquisitus.	176. 2	Similarium & instru-	
Sententia Platonis de	mentaliū partiū af-		
vtero.	365. 12	fectiones.	198. 10
Septi transuersi nerui.	Singultum & conuul-		
205. 17	sionem efficit acris		
à Septo transuerso de	humor.	169. 17	
lirium.	272. 12	Singultus.	292. 29
Septum transuersum.	Singultus ex affecto		
279. 26	stomacho.	168. 27	
Serosę humiditatis cu	Sinus.	91. 13	
piditas nimia in re-	Sitis ingens citra dia-		
	betem		



# INDEX.

- betem. 344. 10 mationis causa fuit.  
 Siti vehementi labo- 349. 17  
 rantes quatuor acci Spina proprio affectu  
 dentiū pericula sub- laborans. 207. 15  
 eunt. 343. 5 Spinae luxatio angulo  
 \*Somnus obseruandus sa. 208. 3  
 in stultitia. 139. 5 Spinae luxatio in obli  
 Sopor. 135. 24. & 136. 15. quum. ibid. 10  
 196. 4 Spinae imbecillitas.  
 Sopor à catalepsi quid 215. 1  
 differt. 197. 1 Spinae nerui in faciē.  
 Sopor in febrium ac- 201. 12  
 cessionibus. 113. 23 Spine neruorū affecto  
 Sopor stupidus. 111. 11 rum notitia. 51. 25  
 Sopor vigilans. 138. 7 Spinae pars altera affe  
 & 196. 28 cta. 51. 3  
 Sorites. 21. 18 Spinae refrigeratio. 54  
 \*Species vteri suffoca Spinae torsio obliqua.  
 tionum plures. 356. 13 207. 5  
 Sperma suppressū quā Spinalis medullæ se-  
 tūm noceat. 361. 18 ctionis noxæ. 178. 2  
 Sphacelos ī costa. 264 Spinal. medulla. 201  
 Sphacelos. 77. 17 Spinalis medullæ ner  
 Sphacelodes hemicra ui. 177. 20  
 niæ. 75. 27 à Splene regius mor-  
 Spicata & foliata vn- bus. 304. 22  
 guenta. 249. 10 Splenis & iecoris vi-  
 Spina ex casu cuidam tia declarat color.  
 sinuata, vesicæ inflā 30. 17

Splenis



# I N D E X.

Splenis vitio aqua in	Spiritu compresso la
tercutem. 325. 26	borans athleta. 216
Spiratio. 170. 23	Spiritus animalis. 147.
Spiratio à vita separa	22. & 197. 15
ri non potest. 357. 11	Spirit <sup>us</sup> rar <sup>us</sup> & frequēs
Spirationem adiuuāt	quid indicent. 239. 17
intercostales muscu	Spiritus visificus. 185. 4
li. 205. 25	Spuēdo reiecta thora-
Spiratio crebra ex in.	cis excrementa. 263.
tēso vtero & ventri-	Sputi in pleuritide aut
culo. 366. 20	pulmonū dolore cō
Spiratio impedita. 171	sideratio. 243. 4
Spiratio laesa, ob calci	Sputi qualitas. 103. 6
trationē eq̄ ī precor	Sputum rabiosi canis
diorū regiōe. 216. 27	rabiē excitat. 364. 2
Spiratio libera. 215	*Stercoris & vrinē in-
Spiratio nulla, aut a-	uita emissio, à reso-
bolita. 240. 1	lutis nervis. 348. 22
Spiratio ob viriū im-	Stefianus abscessu in
becillitatem. 237. 20	musculis epigastrij
Spiratio pessima. 179	laborans. 304. 27
Spirationis difficilis	Stillicidum vrinae vn-
causa. 232. 19	de eueniat. 345. 16
Spirationis vitiū. 213	Stimulans dolor. 92. 1
Spirandi quæ difficul-	Stomachi affecti fin-
tas oriatur ab affe-	gustus. 168. 17
cto corde. 261. 2	Stomachi affect <sup>us</sup> . 289
Spiritaliū instrumēto	Stomachi cōpres. 100
rum angustia. 214. 17	Stomachi vitio, syn-
	copa.



# INDEX.

- copa. 256.28. & 292  
 Stomachū vocabat Ga  
 leni tēpestas os ven  
 triculi. 169. & 289.18  
 Stomachus. 100.18. &  
 257.21. & 283.27  
 Strāgur. 333.20.340.11  
 Stranguria ex luxatis  
 vertebri. 349.23  
 Strepens exuffla. 230  
 Stringens dolor. 93.3  
 Struma. 26.17  
 Stultitia. 135.23. & 139.1  
 Stupor. 59.17  
 Stupor dentium. 72.8  
 Stuporis causa. 58.29  
 Stupidus sopor. 111.11  
 \*Sublimiorū intesti  
 norū dolores. 332.12  
 Sublimis spiratio. 237  
 Succinctura. 279.28  
 Succingens membra  
 na. 271.1  
 Succus biliosus in ce  
 rebro abūdās, viso  
 rum causæ. 193.1  
 Suffocationibus vteri  
 laborātes mulieres  
 viduæ. 358.11  
 Suffocationum vteri  
 plures species. 356.13  
 Suffusio. 44.11. & 17.3.  
 & 151.9. & 187.28  
 Suffusio curata p epi  
 stolas Galeni. 190.4  
 Suffusiones. 17.13. 115.25  
 Suffusionis accidētū  
 ab ore vētriculi p  
 cedentiū notæ. 188.13  
 Suffusionis indicia ex  
 pupillæ considera  
 tione. 189.10  
 Suppressa vrina. 6.25  
 Suppressa vrina ex ca  
 su. 350.16  
 Suppressæ vrinæ cau  
 sa. 11.20  
 Suppressio vrinæ. 55.5  
 Suppressorū mēstruo  
 rum notæ. 372.16  
 Suppuratio in altera  
 nate, difficultatē mo  
 tus crurisefficiēs. 218  
 Suppuratio in vesica,  
 ex pure excreto per  
 vrinas. 353.2  
 Suppuratorum respi  
 ratio. 235.14

d



# I N D E X.

- Surditas. 18.17  
 \*Sympathia ventricu-  
 li cū cerebro. 151.10  
 Synanche. 211.25  
 Syncopa cardiaca. 257  
 18  
 Syncerissima visio.  
 56.23  
 Syncopa stomachi vi-  
 sio. 256.28. & 292.16  
 Syndesmus. 142.18  
 Systematice, multa-  
 rum pulsationū cu-  
 mulus. 251.11  
**T** Endones. 50.12.  
 & 62.7  
 Tētio commune sym-  
 ptoma eorū quę ex-  
 tumescunt. 80.20  
 Tensiuus dolor. 175.15  
 Theriaca aduersus ve-  
 nena. 167.25  
 Tenuiorum intestino-  
 rum dolor. 332.6  
 \*Ex hepate in aspe-  
 ram arteriam trās-  
 sumptio. 264.20  
 Thoracis dilatatio in  
 angustia spirit⁹. 215  
 Thoracis dilatatio  
 qñ vehemētior aur  
 periculosior. 237.10  
 Thoracis excrementa  
 spuendo reiecta, hu-  
 morem colore qua-  
 lis sit indicāt. 263.22  
 Thoracis musculorū  
 actio per somnum  
 seruatur. 256.6  
 Thoracis vlcera. 224  
 Thoracis vulnus. 4.  
 26. & 274.9  
 \*Tinesmus. 329.1  
 Tityus. 135.6  
 \*Toni. 50.16  
 Topica remedia. 124  
 Torpedo. 60.19  
 Torpedo marina ve-  
 nenosa. 362.13  
 Torpidè pulsare. 89  
 Torpidus dolor. 95.4  
 \*Transpiratio. 357.27  
 Transpiratio per vni-  
 uersum corpus ab  
 arteriis. 240.13  
 Transsumptio sangui-  
 nis ex thorace ī aspe-  
 ram arteriā. 264.20  
 Trās



# INDEX.

- Transsumptio sanguinis ex magna arteria in pulmonē. 269  
 Triplicia excrementa. 124.6  
 \*Tubera cruda. 210.  
 14  
 Tuberculis pulmonis signa. 241.26  
 Tuberculū in pulmone. 235.28  
 Tumor gulę cum imbecillitate. 286.23  
 Tumor gulę cū inflā-matione. 286.26  
 Tunicę œsophagi. 284.8  
 Turgidę mammę. 388.17  
 Turtur marina venenosa. 165.26  
 Tussis valida. 243.29  
 Tympania. 302.8  
**V**Alida tussis. 243.  
 29  
 Vapor. 152.1  
 Varię dispositiones dolorem excitantes. 238.27  
 Variorū philosophorum placitorū enumeratio. 134.1  
 Vasa ad pulmonem pertinentia. 275.10  
 Vasa ex magna arteria per quę sanguis in pulmonem transfertur. 267.22  
 Vasis erosio in pulmone. 246.18  
 Vasis ruptionis causę in pulmone. 245.2  
 Vasorū diuisiones circa pulmonem. 276.1  
 \*Vehemens apoplexia. 255.6  
 Vehemens febris cur pleuritidem sequatur. 263.2  
 Vehementi siti laborantes quatuor accidentiū pericula subeunt. 343.5  
 \*Vena à dextra cordis auricula ad costas nutriendas. 273.1  
 Vena ad costas delata. 271.24



# INDEX.

- à Vena cōcaua nullus cum cerebro. 151. 10  
 ramus in pulmonē. Vētriculi vulnus. 4. 21  
 272. 9 à Vētriculo nō trahūt  
 Vena erosa sanguinis succū intestina. 340  
 per tussim eiecti cau à Vētriculo reiectus  
 sa. 222. 20 sanguis. 394. 18  
 Vena medem barba- ad Vētriculum nō per  
 ris. 337. 8 tinet diabete. 342. 29  
 Vena media in melan Vētriculus intumescēs  
 cholicis secanda. 157 cibo, crebriorē facit  
 Venæ erosæ aut ruptę spirationem. 366. 20  
 accidentia. 288. 8 Veræ suffusionis indi-  
 Venæ meseraicæ qđ cia ex pupillæ confi-  
 conferant iecori. 315 deratione. 189. 10  
 Venarū ora ad vterū. Vertebra cervicis dēs  
 367. 13 vocata. 202. 18  
 Venarum ora quando Vertebra dētiiformis.  
 aperiuntur. 246. 11 205. 7  
 Veneni epoti notæ. Vertebrae exteriūs lu-  
 363. 10 xatæ, stranguriam  
 Venenis remediū præ cuidam induxerunt.  
 sentaneum ex vin- 349. 23  
 culis. 167. 7 Vertebrae forami-  
 Vētriculi os. 100. 15. & na per quæ nervi  
 169. 6. 288. 24 exeunt. 208. 14  
 Vētriculi partes. 326 Vertebrae luxatio.  
 Vētriculi spacij affe ibidem.  
 ctus. 293. 25 Vertebrae luxatio  
 Vētriculi sympathia nis causæ. 210. 6  
 Verti



# I N D E X.

- Vertiginosi affectus & 196. 28  
 origo. 172. 22  
 Vertiginosis indicta 62. 7  
 arteriarū sectio. 172  
 Vesica nō habet motū  
 voluntarium. 346. 25  
 Vesica non trahit à re  
 nibus. 340. 1  
 Vesicæ affectus ob om  
 becillitatem. 327. 21  
 Vesicæ carūcula. 10. 24  
 Vesicæ grumi notæ. 351. 7  
 Vesicæ inflammatio,  
 ex spina cuidā sinua  
 ta. 349. 17  
 Vesicæ officium con-  
 tractio. 347. 5  
 Vesicæ propria actio,  
 vrinæ excretio. 345  
 Vesicæ pus. 10. 9  
 Vidua quēdā neruorū  
 distētiōe laborās ob  
 retentum semē. 361. 3  
 Viduæ mulieres, vteri  
 suffocationib⁹ labo  
 rātes, per corpus re-  
 frigerantur. 358. 11  
 Vigilans sopor. 138. 7  
 Vigiliæ. 112. 27. 137. 14  
 Vincula. 62. 7  
 Vincula superioribus  
 partibus iniecta, ve-  
 nenis remediū præ-  
 sentaneum adferūt.  
 165. 7  
 Vinculū barbaricum,  
 75. 26  
 Vini historia. 111. 25  
 Vini moderata potio-  
 136. 24  
 Vinum albū modicē  
 astringens, caput nō  
 tentat. 290. 16  
 Viperæ. 112. 10  
 Vires infirmæ in dy-  
 spnœa. 233. 15  
 Vis magnetis. 362. 21  
 Vis olfaciendi læsa.  
 182. 14  
 Viscera interiora quo  
 modo per aluū & vri-  
 nas expurgentur. 353.  
 Viscidum. 93. 16  
 Visificus neru⁹. 184. 24  
 Visificus spiritus. 185. 4  
 Visio syncerissima. 56



# I N D E X.

- Visorum causæ, à suc- ria. 246. 25  
 co bilioso in cerebro Vlcus in gula. 288. 19  
 abundante. 193. 1 Vlc<sup>9</sup> in pulmone. 2. 19.  
 Vitia splenis & iecoris 224. 18. & 247. 3  
 declarat color. 305. 17 Vlcus ligulæ. 247. 6  
 Vitiata vox. 3. 26. & Vlcera thoracis. 224  
 42. 16 \* Vnde dicta gono-  
 Vitiata vox, à muscu- rhæa. 377. 23  
 lis, à membrana gut Vnde fiat pleuritis aut  
 turis, & destillationi lateralis morbus.  
 bus, & vehemēti ex- 277. 24  
 clamatione. 228. 17 Vnde priapismi affe-  
 Vitiatū intestinum ex ctus. 385. 16  
 purgante medica- Vnguenta spicata &  
 mento. 35. 5 foliata. 249. 10  
 Vitium coloris. 153. 28 Vniuersi corporis cu-  
 Vitiū spirationis. 213 ratio præmittēda. 125  
 Vitreus humor. 68. 2. Vniuersalis method<sup>9</sup>  
 & 149. 6 inueniendi locum.  
 \* Vlcera gulæ indi- 101. 17  
 cia. 287. 18 \* Vocabulorum vsus.  
 ab Vlcere bubo nascēs 27. 14  
 26. 13 Vocales nerui. 44. 19.  
 Vlcis perseverantis & 228. 1  
 in renibus notæ. 336 Vocalia instrumēta. 116  
 Vlcerosus dolor. 89. 22 Vocaliū instrumento-  
 Vlcerū notæ, per vom- rum officium quan-  
 tū apparentes. 38. 14 do læditur. 117. 17  
 Vlcus in aspera alte- Vocē vitiant interco-  
 stales



# I N D E X.

- stales musculi lesi. 43  
 Vocis instrumēta. 42.5  
 & 127.10  
 Vocis obscuræ & par-  
 uæ indicia. 227.22  
 Voluulus. 333.24  
 Volūtas ī cerebro, mo-  
 tionis principiū ner-  
 uis præbet. 145.7  
 Volūtari<sup>9</sup> mot<sup>9</sup>. 49.29  
 Voluptas. 59.8  
 Vomica in vesica, se-  
 pto, aut aliis partib<sup>9</sup>  
 erūpētis signa. 352  
 Vomitus. 32.21  
 Vomitionem sangui-  
 nis excitat hīrudo  
 epota. 225.6  
 Vomitus biliosus con-  
 uulsionē soluēs. 291  
 Vomitus, vlcerū no-  
 tas indicans. 38.14  
 Vox. 41.29. & 227.7  
 Vox quibus affectib<sup>9</sup>  
 perit. 45.22  
 Vox quibus partibus  
 affectis vitiet<sup>9</sup>. 228.17  
 Vox vitata. 3.26  
 \*Vreteres. 15. 26  
 Vrina cruenta. 70.6  
 Vrina cuidam ex casu  
 suppressa. 350.16  
 in Vrina carunculæ.  
 336.24  
 Vrina quomodo natu-  
 raliter reddatur. 7.23  
 Vrina suppressa. 6.25  
 Vrinæ. 39.13  
 Vrinæ iuita emissio à  
 resolutis neruis. 348  
 Vrinæ meatus trifur-  
 catus stipatur. 8.22  
 Vrinæ pfluuiū. 338.22  
 Vrinæ excretio, ppria  
 vesicæ actio. 345.25  
 Vrinæ fluor quare  
 subito eueniat in re-  
 nibus. 341.24  
 Vrinæ retentio, vnde  
 fiat. 346.12  
 Vrinæ suppressæ eua-  
 cuatio. 8.9  
 Vrinæ suppressæ cau-  
 sa. 11.20  
 Vrinæ suppressio. 55.5  
 Vrinæ stillicidiū vnde  
 eueniat. 345.16  
 in Vrinis pili. 336.27  
 Vrin



# I N D E X.

Vrinam quomodo re-	transiens.	373.5	
nes tam celeriter at-	Vteri erosio.	375.4	
trahant.	340.18	Vteri os, nouē mensi-	
Vrinam supprimētes	bus ita clauditur, vt		
crassi humores.	10	ne specilli acumen	
Vrinam supprimit la-	admittat.	383.26	
pis in vesica.	350.29	Vteri puerfiones.	371.9
Vrinarius meatus à	Vteri suffocatio.	355.25	
crasso pure obstru-	Vteri suffocationum		
ctus.	350.29	plures species.	356.13
per Vrinas excretio	Vteri venarū ora.	367	
puris.	338.3	Vterus.	355.15
*Vstio capitis.	108.25	Vterus cur sursum &	
Vsus.	14.4	deorsum trahatur,	
Vsus diaphragmatis	obstetricibus tangē		
ex Platonis senten-	tibus.	368.17	
tia.	279.8	Vter <sup>9</sup> intēsus quomo-	
Vsus loquendi.	231.19	do crebram efficiat	
Vsus œsophagi du-	respirationem.	366.6	
plex.	284.2	*Vulnerati in thora-	
Vsus respirationis.	cc.	274.9	
357.21	Vulnus cordis.	259.10	
Vsus vocabulorum.	Vuln <sup>9</sup> intestinorū.	4.19	
27.14	Vulnus peritonæi.	5.9	
*Vteri ceruix clausa	Vulnus thoracis.	4.26	
citra duritiē, prægnā	Vulnus ventriculi.	4.21	
tem indicat.	372.22	Vulua.	355.15
Vteri dolores.	93.4		
Vteri dolor in coxam			

FINIS.

F I N I S.



**C L. G A L E N I**

**DE AFFECTORVM LO.  
CORVM NOTITIA,  
LIBER PRIMVS.**

Gulielmo Copo Basiliensi interprete.

*Designat in genere notarum sedes, è quibus  
10 affectum locum intelligas, idq; particularibus  
exēplis latius explicat. Ac ferè sedes sunt in es-  
sentia, proprietate, in contentis, in actione pro-  
pria adnatis, & accidentibus variis, quorum  
natura exactè distinguēda, quemadmodum af-  
fectus primarij & secundarij, proprij & è con-  
sensu, leuiter inhaerentes & firmitus impressi.*



*20* **N**ON solum recētiore Medici, sed veterum quoq; non pauci, corporis particulas, locos nominare consueuerunt: ac quàm diligentissimè affectus ipsis euenire solitos, dignoscere studuerunt: propterea quod pro locorū differētia, curationē quoq; variari cōtingit. Sed quàm utilis ad curationē sit huiusmodi notitia, in eo libro, quē de curādi via & ratione cōscripsim⁹, videre est. Nūc verò, quomodo affectæ particule possint

*Loci, cor-  
porū par-  
ticula.*

A



discerni, explicare dūtaxat proposuimus.  
 Igitur partes in superficie constitutæ, vnā  
 † *id est*, cum affectuum † specie facile sensibus de-  
 qua ex pprehenduntur. Quæ verò in imo corpore  
 prius acci- latent, exercitatum ratione virum deside-  
 detibus cō rant, cum in partium & actionibus & vti-  
 titutibus, tum vel maximè in præcedenti-  
 ut phleg- bus eas corporum dissectionibus. Quippe  
 monis è ru hæ nos docuerunt, cum alia permulta, tū  
 bore, calo- cuiuslibet partis essentia proprietatem. 10  
 re, dolore Corpus igitur quoddam cartilagineum  
 renitente, est, secundum asperas pulmonis arterias  
 &c. alias (quod bronchion appellant) cuius proprie-  
 quod sta- tatem hi duntaxat qui ipsum viderūt, co-  
 tim oculis gnoscere possunt. Id si aliquando tussien-  
 obicitur do expuatur, maximum vlcus, vel ab ero-  
 vulgari sione, vel putredine in pulmone esse exi-  
 sensu. stimamus. Est enim & per totum collum  
 inter pharyngem & pulmonem media,  
 talis corporis natura: tam grandis tamen 20  
 vlceratio, in ipso haudquaquam fieri po-  
 test, quin prius mors animal præoccupet.  
 In pulmone verò talis fieri potest, vtpote  
 qui ob humiditatem, & facile putrescere,  
 & à vitiosis humoribus promptè erodi  
 consuevit. Adde quòd brōchia in ipso exi-  
 gua admodum sint. Quocirca pars ipso-  
 rum putrescere non potest, quin potius to-  
 tum bronchium reiici necesse est, mēbra-  
 nosis



nobis vinculis quæ ipsum cū aliis coniun-  
 gunt, à sua cōtinuitate absolutis, quæ suis  
 bronchiis multò celerius afficiuntur. hæc  
 enim & cartilaginea, & dura, & crassa sunt  
 mēbranae verò quæ ipsa cōiungūt, tenues  
 & infirmæ. Quinetiā frustum quoddā va-  
 sis, haud ita paruum, tussiendo reiici vidi-  
 mus, quod ex pulmone fuisse eductū pla-  
 nē intelligebant dissectoriæ artis haud  
 imperiti professores. Quotquot enim ad  
 asperam arteriam in collo perueniūt va-  
 sa, omnia capillorū ferè speciem referunt.  
 Proinde non solūm essentiæ proprietas,  
 sed magnitudo quoq;, sæpenumero affe-  
 ctū locū haud obscurè indicare potest. Sic  
 enim cū intestini tunicā per dysenteriam  
 deiectam cōspexeris, sitq; & latitudine &  
 crassitudine iis quæ tenuia cōstituūt mul-  
 tò maior, nō ab re cōiicies vlcationē in  
 crassis intestinis cōsistere. Ita cū adule-  
 scentulū tussiendo, tunicā viscosam cras-  
 samq; reiicere videremus, coniecimus eā  
 internā esse gutturis partem, quæ ligulam  
 (græci *ἐπιλωτῖς* vocāt) cōstituit, ac sana-  
 rius est adulescētulus, quāuis id nō admo-  
 dū speraremus, māsit tñ vox vitata. Præ-  
 terea p̄ essētiæ pprietatē, à vesicæ vlcērib⁹  
 ea quæ in renib⁹ cōsistūt, distingui possūt. 4. aph.  
 Scripsit enim in aphorismis Hippocrates: 76. 81

*Magnitudo essētiæ.*

*Vox vitiata.*



*Res contē-  
ta.*

*Historia  
adoleſcen-  
tis Mity-  
lenai.*

*Intestino-  
rum vul-  
nus.*

*Ventricu-  
li vulnus.*

*Coli ab-  
ſceſſus.*

*Thoracis  
vulnus.*

Si ea quæ cū vrinis excernūtur, lamarum  
speciē referūt, in vesica vlcus esse, scire li-  
cet: si verò carūculis similētur, id erit ī re-  
nibus. Neq; nō à reb<sup>9</sup> in particulis qbus-  
dā cōtentis, creberrimē sedes affecta de-  
prehenditur. Nā Mitylenis adoleſcēs qui-  
dā secundū sedem vulneratus gladio vul-  
nere satis profundo, trib<sup>9</sup> primis dieb<sup>9</sup>, ne-  
que cibum neq; potū ingessit: quarta ve-  
rò die, adhibitis prius remediis, cibū sum- 10  
psit, ac bibit quoq;: deinde occidēte sole,  
iterū adhibita curatiōe, vrine circiter qua-  
tuor heminas per vuln<sup>9</sup> excreuit, quū an-  
tea ex quo vulnerat<sup>9</sup> erat, nihil vrine red-  
didisset: tū verò ab onere quo circa pubē  
grauabat<sup>9</sup>, se pfectē liberatū esse dixit. Ita  
q; pculdubio cōstabat vesicā fuisse vulne-  
ratā. Quemadmodū vbi stercus per vul-  
nus excernitur, intestinorū alicui vulnus  
esse illatū haud dubiū est. Sic etiā quum 20  
cibus egreditur, in vētriculo vuln<sup>9</sup> esse ma-  
nifestū est. Iā ortū supra inguina panum  
ac suppuratū quū medicus incideret, ster-  
cus subsecutū, in collo absceſsū esse decla-  
rauit. Atq; in hoc genere cōtinetur, spirit<sup>9</sup>  
efflatus, vulnerato thorace, & sāguis ab ar-  
teria profluēs. Nā quū interdū vulneratū  
corpus sensu deprehendi non potest, exa-  
ctam ab his cōsequimur notitiā. Igitur vt  
ex



ex thorace efflatus inter respirandū spiri-  
 tus, membranā costas succingentē, vulne-  
 ratam esse significat, ita sanguis saliendo  
 eiectus, arteriā, sed hic protinus eo q̄ ex  
 venis erūpit, & calidior, & magis tenuis,  
 & flauior esse dignoscitur. At veluti horum  
 nō incertę sunt notę, sic eodē modo si ali-  
 quādo omentū, aut intestinorum aliquod  
 excidere per vulnus videatur, peritonæū  
 10 discissum esse nemo ambigere debet. Si  
 verò pulmonis aliqua fibra, extremā sui  
 partē à vulnere exerere videatur, thoracē  
 cōfossū esse ostēdit. Atqui nihil refert si-  
 ue succingentē membranā vulneratā siue  
 thoracē cōfossū esse dixeris. Iā verò ex  
 his etiā quę adnascūtur rebus affectis se-  
 dis notę petūtur. q̄ppe res adherētes essen-  
 tię proprietatē obtinēt. Quemadmodum  
 20 fungi, si fracto capite, meninx (id est mem-  
 brana cerebrū custodiens) fuerit affecta.  
 Atq; rursus alia proprietas cōspicitur, osse  
 particulę cuiuspiā vitiato. Huius præterea  
 generis est crustula quædā (ephelcis Græ-  
 cè vocatur) q̄ eius particulæ, à qua excer-  
 ni videtur, vlcerationē protendit: vt vrinę  
 in partib⁹  
 excreſcūt

Peritonæi  
vulnus.

† ἐπιφύ-  
 μυνα, alio  
 loco vocat  
 ἐπιγρηφό-  
 μυνα, quæ  
 ex reliqui  
 is alimēti  
 in partib⁹  
 excreſcūt

qualis in ossibus callus, in carnis vulneribus ὕπερσάρκωσις  
 & hic fungus: Sunt autem fungi πλάσσαι ἐπιφύσεις, mol-  
 les, laxi, flacidiq; tumores.



meatuū, si cum vrina: spiritaliū instrumē-  
 torum, si tussiendo reiiciatur: gulæ, ac ven-  
 triculi, si vomitione, excernatur: quemad-  
 modū si cū alui excrementis deiicitur, inte-  
 stinorū aliquod vlceratū esse significat.  
 Est præterea ex indiciis quibusdā alius no-  
 titiæ modus, quū videlicet in aliēno spa-  
 tio aliquid præter naturā continetur, vt in  
 renibus, aut vesica, lapis, aut pus in thora-  
 ce: ex eodē genere censeretur & sanguinis  
 grumus (græcè thrōbos) seorsum cōtinea-  
 tur, aut alius quidam humor molestus in  
 animalis corpore, genit<sup>9</sup>, vel extrinsecus  
 ei adueniēs. Vnde iuniorū medicorū cō-  
 plures, quæstionē ad medicæ artis opera  
 nihil conferentē, sed dialecticā potius ha-  
 bentē cōtemplationē, mouere solēt: Vtrū  
 huiusmodi res in nobis præter naturā ge-  
 nitæ, ex affectis sint sedibus, aut loco nul-  
 lo affecto, animal à causa præter naturā  
 malè afficiatur? Sed q̄ inutilis (vt dixi) sit  
 huiusmodi quæstio, cognitu facilè est, si  
 cōsideraueris quātū dignotiones ad artē  
 cōferāt. Subiiciamus ergo aliquē tribus  
 dieb<sup>9</sup> nihil vrinæ reddidisse, nōne proti-  
 nus in qua corporis parte sit huiusmodi  
 accidētis causa inuestigabimus, an in re-  
 nibus aut vreteris, aut vesica, aut vrinæ fi-  
 stula? Neq; enim in hepate, pulmone, lie-

ne

*Quæstio  
 dialecti-  
 ca.*

*Vrina sup  
 pressa.*



ne, vētriculo, corde, aut alia quauis particula ipsam q̄remus: q̄ nulla ipsarū sit vrinę instrumētū. Vnde nisi nouerim⁹ primā vrinæ secretionē in renib⁹ fieri, deinde eā per vretēras ad vesicā peruenire, ac demū inde excerni, quemadmodū iam antea in libris Naturaliū actionū ostēdimus, nihil huiusmodi inuenire poterimus. Verū huc usq; p̄cessisse haud satis esse videtur, quin potius perpēdere oportet, quānam sit dictorū causā, propter quā vrina supprimitur. Est autē via contēplationis hęc: intueri oportet omnia tū prāterita tum prēsētia accidētia. Prāsēntia q̄dē ipsemet Medicus inspicere debet: Prāterita verō non solum à laborāte, sed etiā ab ipsius familiaribus interrogādo perdiscere. Sit igitur (exēpli gratia) tumor aliquis in pube, satis euidentē in circūscriptione vesicā impletā esse ostēdēs, nihiq; excernat. Nunq̄d planē cōstat aut excretoriā vrinę actionē necessariō resolutā, aut vrinæ fistulā esse constipatā? In primis igitur considerandū *Quomodo* est, num fieri potuerit, vt resolutæ facultatis nomine id acciderit, si prius meminēti *naturaliter vrina* ruius quomodo p̄ bonā valetudinē volēti *reddatur.* bus nobis vrina excernat. Musculus enim cervicē vesicę circūdās, ab actione q̄escit, fungēte tū vesica suo munere, musculi autē



actio, voluntatis nostræ, imperiū imitatur.  
 at vesicæ actio & inuoluntaria est & natu-  
 ralis. Nanque in commentariis de natura-  
 libus facultatibus iam declaratū est, in o-  
 mnibus ferè corporis particulis esse vim  
 qua excrementa secernantur. Hæc quāuis  
 semper ipsis assit, nō tamē vtuntur ea, nisi  
 cū vrgētur ab excrementis. Quæ si aliquan-  
 do fuerit affecta, fieri potest, vt vrina sup-  
 primatur: proinde si hominē ita figuraue-  
 ris, vt decliuus sit ceruicis vesicæ positus,  
 ac manibus tumorē præter naturā cōpres-  
 seris, expelletur vrina. Quod si ita facien-  
 do nihil profeceris, à causā qua resoluta  
 vis esse putabat̃ desistere, atq; vrinę fistulā  
 cōstipatam esse suspicari oportet. quippe  
 musculus ei circūdatus, si resoluat̃, ipse nō  
 cohibite, sed præter volūtātē emissę vrinę  
 causa est. Itaq; quot modis cōtingat vrinę  
 meatū (quē ὀφθαλμῶν id est vrinę fistulā vo-  
 cat) stipari deinceps cōsiderandū est. Equi-  
 dē tres in vniuersum esse cēseo. Aut enim  
 corpus ipsius in tantū tumorē præter na-  
 turā attollitur, vt meatus inde occupetur:  
 aut aliquid ei præter naturā, vt vel carun-  
 cula, vel callus innascitur: aut à re quapiā  
 obstruit̃ meatus. Corpus ipsius ad insignē  
 tumorē attollitur, si vel inflāmatione, vel  
 scirrho, vel abscessu, vel alio quouis tumo-

*Vrina me-  
 atus trifa-  
 riam sti-  
 patur.*

re



re fuerit affectū. In meatu caro quidē ori-  
 tur, si præcesserit vlcus alia verò res lōgo  
 tēporis spatio ex crasso lētoq; humore pau-  
 larim nasci potest. Obstruit meatus, vel à  
 lapide, vel grumo, vel pure, vel crasso len-  
 tōq; humore. Igitur hæc oīa distinguere  
 oportet, nō solū ex præsentib<sup>9</sup> accidētib<sup>9</sup>,  
 sed etiā ex iis quæ præterierūt. Age igitur  
 subiiciamus vt puer laboret. apparuerint  
 10 verò antea calculi indicia, vrina quidē a-  
 quæ similis, in qua subsidēt sabulosa quæ-  
 dā, ipse insup assiduè pudēdū scalpat, idq;  
 vel laxū, vel intētū præter rationē, postea  
 vrina de repēte supprimatur, nūqd opti-  
 ma ratione cōieceris, huic calculū in ve-  
 sicæ ceruicē incidisse? Itaq; supino figura-  
 to puero, vt crura reliquo corpore multo  
 sint sublimiora, mult ifariam ipsum cōcu-  
 ties, hoc satagēs, vt lapis ex meatu rece-  
 20 dat. Quib<sup>9</sup> pactis, iube vt puer vrinā red-  
 dere tētet, id si bene successerit, pfluatq;  
 vrina, præter exactā causæ notitiā, cura-  
 tionis quoq; modū inuenisse te, haud du-  
 bia erit cōiectura. Quòd si nihilomin<sup>9</sup> vri-  
 na supprimitur, rursus cōcute, sed vehemē-  
 tius, atq; si sic quoq; pmāserit, tū demissa  
 ænea fistula (Græci catheterē vocāt) simul  
 & lapidē à vesicæ ceruice repelles, & vri-  
 nā euocabis. At nulla calculi nota retentā

*Aliquādo  
 naturali  
 vitio vt in  
 virgine  
 quadam  
 cui vrina  
 per sedem  
 reddeba-  
 tur.*

*Calculi no-  
 ta, vt 4.  
 Apher.  
 79.*

*Catheter,  
 ænea fistu-  
 la.*

A 5



*Grumus.* urinā præcedēte, si sanguis effluxerit, par est, ut grumus urinæ fistulā obturet. At fieri potest ubi ulcerata est vesica, ut paulatim in ipsa grumus cōcrescat, vel nō præcedente sanguinis fluore. Accidit autē ut sanguis ex renib⁹ per vřeteras in vesicam defluēs, grumū efficiat. Atq; in huiusmodi cōiecturis, magn⁹ est æneq; fistulæ vsus: *Pus in vesica.* haud secus ac cū vel pus, vel crassum lentumq; humorē meatū obstruxisse suspicamur. In huiusmodi verò cōiecturā, ex præcedentium notitia hoc pacto inducemur. Etenim siue vesica, siue renes, antea affectu aliquo laborauerint, per quē tale tantūq; pus colligi potuerit, ut par sit ab ipso meatū fuisse obstructū: p̄babiliter coniicies, hāc ob causam urinā suppressi, aut si etiā in parte aliqua renib⁹ superiore fuerit abscessus: quo erupto: haud absurdē pus in renes trāsumptū esse putaueris. *Humores crassi urinā suppressi.* Quod si nihil huiusmodi præcesserit vict⁹ rationē ingredi oportet, an ī ocio educat⁹, multis cibis crassos viscososq; humores generare potētib⁹, fuerit vsus. Sic etiā ubi ob carūcula runculā aliquā ab ulcere innatā vesicę ceruicē obstructā esse putamus, & ex præcedētib⁹ ulceris notis, & ex eo qđ demissa ēnea fistula, urina vacuatur, intelligere possumus. nā & hūc affectū aliquādo vidimus: quippe



quippe demissa fistula dolorē mouit, in ea  
videlicet meatus parte, vbi antea vlcase  
coniiciebamus: fractaq; sub fistula carne,  
secuta sunt vrinae excretionē, & cruor ali-  
q; & carnis fragmēta. Atq; hæc dixim⁹ vt  
quæ ad institutū opus propriè pertineant.  
Constat autē, vt paulò antè citata à nobis  
quæstio, dialectica dūtaxat sit, quodq; ni-  
hil ad artis opera conducat. Id enim vtile  
fuerit, vt cognoscām⁹ meatū esse obstructū  
à grumo, si ita cōtigerit, aut lapide. At quæ  
rere utrū affectū esse meatum, an causam  
suppressæ vrinae in meatu contineri, dicen-  
dū sit, nihil ad artem vtilitatis cōferre po-  
test. Itaque Archigenē satis mirari nō pos-  
sum: qui non solū in huiusmodi quæstioni-  
bus multus sit, verū etiam de iisdem ad cō-  
obscure scribebat, vt intelligat⁹ à nemine. *Archige-  
nis error.*  
Igitur rursus propositū sermonē resumen-  
tes, consequentia tractemus: quomodo sci-  
licet, tū ex præcedētibus tum præsentibus  
accidētibus, causa cur vrina reddi non pos-  
sit, deprehendatur. *Vrina sup-  
pressa cau-  
sa.*  
Percussus ergo validè  
quidam in ea parte, quæ femen appellatur *Femen.*  
(Græci perincon dicūt) inflāmatione sub- *Perineos.*  
orta in vulnere, vrinam reddere nō potuit,  
ac vesica ipsa, vtpote plena, manifestè secū-  
dum circūscriptionem intenta videbatur.  
Huic, ne irritaretur inflammatio, æneam  
fistulam



fistulam adhibere nolimus, sed aqua calida adfusa, oleo perungere satius esse putauimus, quumque tribus horis sic eum tractassemus, tumore non parum relaxato, ac dolore, ut ipsemet fatebatur, non ita graui-  
ter infestante iussimus ut urinam reddere tentaret: interim quum nos vesicæ tumorem, ad inferiores partes impellendo, sensim premeremus, iuuenis urinam reddidit. Atque in his quæ sic afficiuntur, causa suppressæ urinæ facile deprehenditur. quauis in aliis quibusdā non adeo manifestè dignoscatur. In quibus artificiosa coniectura ab omnibus vocata, nobis perquam utilis est, utpote quæ inter exactam notitiā, & omnifariam ignorantiam, media quodāmodo putatur. Proinde fieri non potest, ut in omnibus morbis colligatur notæ, quæ concursus affectuum indices ab empiricis nominantur. Sed verissimum est: id quod Erasistratus dicere solebat: Oportet  
*Coniectura artificiosa est si- gnis probabiliter colligitur. Vide Celsum lib. 2. capitu. 5. Erasistra- tus.* (inquit) hominem exercitatissimum ratione esse, qui voluerit non solum affectus ipsius qualitatē, sed affectum quoque locum probe dignoscere. Verum ut ad huiusmodi exercitationē decenter perueniamus, haudquamquam querendum est, an dicere oporteat, vesicæ ceruicē, si vel à lapide: vel grumo obstruatur, affectam esse, aut ipsa non affecta, actionē ipsi⁹ lēdi. Igitur in huiusmodi  
quæ



quæstionibus ad artem omnino superuacaneis Archigenes versari cōsuevit. Alij verò ultra hæc procedētes, ne lædi quidē actionem dicūt, fieri enim [ipsa] videtur, musculo qui vesicæ ceruicē cōstringit laxato: vesica autē, vrina in se contēta circundata, ac circa eam cōtracta: musculis verò abdominis simul exprimētibus. Quū itaq; & vesica citra noxā munere suo fungitur, & musculi volūtatis imperio sic obediūt, vt superiores intēdātur, is verò qui ceruicem circundat laxetur, quomodo (inquiūt) rectē poterit aliquis suspicari, noxam esse actioni illatā? Quapropter supprimi vrinā dicere coguntur, nō læsa, sed impedita meiēdi actione, tanquā arti medicinæ opē ferāt, si vocabulū lædi trāsmutantes, impediri dixerint. Sed huiusmodi quæstiones (vt diximus) ad dialecticā pertinet, ac ad mētis exercitacionem magis, quā vel ad affectus ipsius dignotionē, vel sedis affectæ inuētionē accomodantur. Verū ea, quā nuper proposuimus, ad institutū opus propriē pertinet. Intelligitur autē ex ipsa, quòd in primis per artē secandi corpora accuratē cognoscere *†θεοις* oportet, qualis sit cuiuslibet partis essētia. *νοινωvix* deinde verò & actionē, & *†*societate quam *Gale. lib.* cum proximis habet, quæ etiam in positio. 13. *Therap.* nis vocabulo comprehenditur, intelligere. *pen.*

Quin



*Actio.  
Vfus.*

Quinetiā ipse quoq; partiū vsus, ad affecto-  
rum locorū inuentionem magnificè cōdu-  
cit. Actio enim motus est partiū, factius.  
Vfus verò omnibus insunt, vel nihil agēti-  
bus. Ergo, quod ad vrinæ redditionē perti-  
net, excretionis actio fit à vesicæ cōtractio-  
ne concurrente interdum muscutorū abdo-  
minis auxilio, quū videlicet admodū exi-  
guam continet vrinā, aut vesica ipsa infir-  
ma est: reliquæ verò partes oēs vtilēs sunt  
ad actionē: nisi enim vesica ipsa, cum toto  
spatio sic figurata fuisset, ac ceruix ipsi⁹ to-  
ta fuisset perforata, & vtereres obliquè im-  
plātati in ipsam fuissent, frustra habuisset  
cōprimēdi motū. Ex horū itaq; notitia, &  
affectæ partes, & affect⁹ ipsarū deprehēdi  
possunt, nō ex ea quæstione, qua inuestiga-  
tur, utrū dicere oporteat, obstructū instru-  
mentū esse affectū, an omninò noxa care-  
re. Haud absimilis huic est alia quæstio, &  
quidē de affectis iā partibus, sed qbus nō-  
dum inest propria dispositio. Vocāt autem  
propriam dispositionē, quæ separata causa  
quæ ipsam fecit, permanere potest. Hac igi-  
tur cōsideratione rursus dicunt nōnulli, ne  
quaquam affici caput, per eos capitis dolo-  
res, qui à bilioso humore in vētriculo con-  
tento proueniunt, quòd per vomitum eie-  
cta bile, protinus capitis dolor quiescat.  
quem

*Propria  
dispositio.*



quemadmodum si post vomitum nihilominus permanferit, tum affici caput: Idq; multo magis, quā similia fuffufioni accidētia, oculos infeftāt, cumulat in ore ventriculi excremētis. hęc enim veluti vmbraſ quas dā eſſe affectuū. In omnibus hiſ quæſtionibus plurimū occupati maiores noſtri, perquam pauca de affectorum locorum notitia ſcripferunt. Noſ verò diuerſa incedētes via exercebimus, aut (vt dixerit quiſpiā) inſtruem⁹ ſtudioſos, quomodo ſed eſ affectas dignoſcere poſſint. Igitur quēadmodū paulò ante propoſitū eſt, q̃ intēta veſica homo vrinā reddere nō poſſet, ita impræſentiarum ſubiiciatur, citra veſicæ tumorē vrinā ſupprimi, ergo neceſſe eſt, quū ſic retenta eſt vrina, vel vreteras, vel renes eſſe obſtruētos. Quapropter ruruſ hic intueri oportet, nū antequam ſupprimeretur vrina, aut lapidis, aut inflāmationis, aut alterius cuiuſpiam mali præceſſerint accidētia, neque negligēda eſt vniuerſi corporis diſpoſitio, vt poſſimus (quoad artiſicioſa coniectura permiferit) diſtinguere utrū in ipſis renibus à lapide, vel craſſis humorib⁹, fuerit obſtructio, an in vocatis vreteribus (id eſt meatibus) qui à renibus ad veſicā protēduntur. Atq; ſunt quædam quæ ad exquisitam perducūt notitiam, veluti paulò ante diceba

*Vreteres.*



*Asclepiadis error.*

*Princeps animæ facultas.*

dicebam', de his quæ affectæ essentia proprietatē declarāt. Alia verò artificiosa cōiecturæ inseruiunt. Vnde prolixiorē esse disputationem accidit, nisi Sophistas valere finas: quemadmodū hoc loco Asclepiadem negleximus, qui de vrinae in vesica collectione (vt alibi deteximus) absurda scripserit. Porro ea quæ de principe animæ vi scripta sunt ab iis, qui eā in corde cōsistere existimant, omnes dissectores iā dānarunt: cū tamē Archigenes ab hac opinione haudquaquā dimoueri potuerit, quāuis ea reprehēdatur, cū per alia multa, tū maxime per ea, quæ in phreniticorum, lethargicorūq; curatione vidētur: verū tū sursum, tū deorsum sermones suos cōuertit, vt modò hoc dicat, modò illud, nihil omnino declarās. Atq; huius generis est tertius Archigenis liber quē de locis affectis conscripsit. Nos verò principē animæ vim, in libris de Hippocratis, Platonisq; placitis, magna ex parte absoluius. Nūc verò hac veluti demonstrata, affectarū partiū cōtemplationē perficiemus, quodq; omnibus affectis partib' & locis cōmune est, nō dialectica quæstione, sed ad artem necessaria persequar. Quæ libet in animæ corpore actio, peculiarē habet perticulā, per quā perficit eoq; actionē lædi necesse est, instrumēto ipsam efficien



efficiēte quomodolibet affecto. Atq; interdum facile affectus soluitur, adeò vt simul atq; opifex causa fuerit separata, ipse quiescat, interdum tanta est soluēdi difficultas, vt diutius permanere possit, causa etiā ablata. Accidit autē nōnunquā vt efficiēs causa pertransiens, nō firmum in particula faciat affectū, quē Archigenes cū vmbra affectus cōparat. Similiter iis qui suffunduntur, collecto in ore ventriculi tenui excremento, vnde vapores quidem subleuati, deinde circunuenti à visifica facultate, similes imagines mouēt, quales per suffusiones apparere cōsueuerunt. Idq; maximē euenire *Oculorū* solet iis, quibus oculorū humor exquisitè *imagines.* pur⁹ est, aut visifica facultas quā facillimē *suffusio-* sentit. Eandē ob causā, vbi sanguinis fluor *nes.* aut vomitus per morbos expectatur huius *Hippocr.* modi accidētia interdum apparēt, de qui- *li. præ sag.* bus Hippocrates in præsagiis hunc in mo- *3. aphorif.* dum scripsit: Si cuipiā, inquit, in non letali *32.* febre, caput dolet, aut ante oculos obscura *Ibidem a* quædā obuersantur, aut cordis dolor acci- *pho. 35.* dit, is bilē euomet. Ac paulò pōst, Quibus verò in huiusmodi febre, caput dolet, oculi verò obscuras illas imagines nō vidēt sed caligatione hebetantur, aut splēdentia quædā ipsis obiiciuntur, ac pro cordis dolore, in alterutra parte, præcordia tēdūtur,

B



neque dolore, neq; inflāmate infestante, iis pro vomitu sanguis ē narib<sup>9</sup> effluet. Hæc est verborū Hippocratis series, qbus docuit sepe numero cōtingere, vt ab humorib<sup>9</sup> multis in vētriculo collectis, imagines quādā oculis obiiciātur. Quod si nihil omnino ab humoribus ascendat ad oculos, nullū huiusmodi accidentiū euenire solet: quēadmodū, vbi neq; vel ad auriū, vel nariū meatus, vel etiā ad linguæ corpus, quicquam trāsferitur. Vnde manifestū est, quod oportet oculos participes fieri eius dispositionis, quæ ventriculū infestat, si vidēdo debeat animal errare. Cū itaq; rursus dicat Hippocrates: Quib<sup>9</sup> deiectiones bilio-  
*Libro 4.* sæ exeūt, surditate superueniente finiūtur:  
*Aph. 28.* & quib<sup>9</sup> surditas præcesserit, desinit, si deie-  
*Surditas.* ctiones sequūtur biliosæ. Quis est autem adeo demēs interpres, vt omittat in huius sermonis enarratione aurium affectū? Aut tum dicat nasci surditatē, quum bilis, quæ antea per aluū vacuari cōsueuerat, ad oculos efferat? Igitur semper incipere oportet à laxæ actionis instrumēto, deinde querere quis sit noxæ modus, utrū videlicet dispositio iā stabilis ac firma, an adhuc fiēs, ita vt perseverare nondum nata sit. Quod si nūc quoque fiat, vtrum causa quæ affectum efficit, in ipsa parte cōtineatur, an per ipsam  
trans



trāseat, inuestigādum est. Etenim arefacto  
immodicè humore (quē crystaloidē vocāt)  
perseuerās erit noxa, & essentia ipsius pro  
prius affectus: si verò crassus humor in pu  
pilla cōstiterit, essentia q̄ de nōdū læditur,  
verūm accidētis causa in oculo ipso conti  
netur: sed tum per ipsum trāsire dicitur, cū  
euaporās humor cōsistit in vētriculo. Qui  
verò partē quampiam tunc solum arbitra  
tur esse affectam, cū in essentia ipsius per  
manēs fuerit dispositio, legislatoris mune  
re, qui patriis nominibus propria significa  
ta instituit, fungi videtur. Nā vbi vehemēs  
dolor intestinū infestat, firmato in vna qua  
piā parte dolore, vt quasi perforari videa  
tur, quo pacto, vel nequaquā affici intesti  
num, aut affectū in ipso non esse quis dixe  
rit? quāuis interdū huiusmodi dolores ex  
creto vitreo quodā humore, vel vnicō tēpo  
ris momēto finiātur. Nec verò aliud quid  
piā, dolorē cōcitasse putandum est, præter  
humorem excretū. Quo enim excreto, illi  
co dolor sistitur, hoc ex cōmuni hominum  
opinionē doloris causam cēseri par est, id  
q̄; ob naturale quoddā axioma (id est enū  
tiatū) quod ex seipso ad huiusmodi causa  
rū dinotionē, fidē habere videtur. Id enim  
quo tāgente afficimur, & quo separato ces  
sat affect⁹, causam esse, apud omnes homi-

*Sic lib. 2.  
de differ.  
pulsuum.  
Intestino  
rum do  
lor.*



*Doloris  
causa.*

*Pars quā  
do dica-  
tur affe-  
cta.*

nes in confesso est. Sic enim & ignē vftulationis, & gladiū sectionis causam esse credimus, atque de singulis aliis similiter dicendū est. Ergo vacuatū humorē, infestauit mali causam fuisse, quo tempore in particula cōtinebatur, putādum est. Sed an ob id quòd vehemēter infrigidat, aut calfacit, aut in totū per intēperaturam locū afficit, aut quia per continuas partes transit, eas ad excretionē vi quadam excitans, aut ob flatuosam spiritū ab eo exortū, qui continentem partem extēdere potest, aut quia violenter impactus est, aut quia erodit, & mordet, nondum ex euacuationis ope manifestū est. quippe id solum cōstat, q̄ cū continebatur, molestiam inferebat. Igitur non solū putare oportet huiusmodi humorem esse causam doloris, verū partē quoque in qua cōtinebatur, illo tempore affectam, quo ob humoris præsentiā dolore cruciabatur. Sic etiam affici aliquem dicimus cū aliquid extrinsec⁹ incidit, vel calfaciēs vt ignis, vel refrigerās vt nix, vel cōtūdes vt lapis, quo separato protinus finitus fuerit affectus nemine propter hoc dicēte, partē non fuisse affectā, q̄ in ipsa nulla sit relictā dispositio. Igitur hoc vno supposito quòd & nomine affect⁹, & verbo affici, ad hūc modū vtamur, ita dicēdis animū adhibe,



be, quo vtilitatem, tum in pręsagio, tum in curationis ratione cōsequaris. Quippe nō nunquā à causa quapiā oritur affect<sup>9</sup>, sed ita orit<sup>r</sup>, vt separata causa, haudquaquā per manentem habeat dispositionē. interdum autē partim iā factus est, partim etiā dum fit. Sępenumero conquiescit: ab eūte causa: iam verò perseuerās manet dispositio. Veluti in dysenteria, mordax humor causa est affectus, vtpote qui ab initio & absterget, & abradit, dein tēporis tractu vlcerat intestinū. Quod si ante aquā vlcus induxerit, in intestina influere desinat, affectus ipse nōdum dysenteria dicetur. Si verò vlcere pręoccupet intestinū, quāuis humor finiat<sup>r</sup>, nō tamē simul finitur affectus. Neq; est quod in pręsentia ratione ex minutatim coaceruatis cōtexta, quę soritē (id est acervale) vocāt, moueamur: quippe multa ad vitā haud inutilia, cōmunem ex ipso sortiuntur dubitationē: de quibus priores, tū medici, tū philosophi, locuti sunt, proinde superuacaneū esset ea nūc percurrere, mihi pręsertim, qui proposui in ipsa hac parte, artis ambiguitatē ostendere. Quod enim tempore ad affectuum generationem sit opus, inter omnes conuenit. An verò quēadmodum cū domus fit, nōdum est domus, sed totum hoc simul, fiens domus: eodē etiam

B ;



† Σωφίτης παρὰ μινδὸν ἐπολύτως. qualia interrogata  
 in granis, quæ acervum faciunt, in guttis quæ lapidem ca-  
 vant, in momentis quæ vocant instantia, & hic de momen-  
 to quoniam morbus factus dicitur & iam non fit: ita mul-  
 tis minu-

tatim &  
 gradatim  
 additis vel  
 demptis  
 similitu-  
 dine fal-  
 lit.

pacto, quilibet affectus dū fit, † siēs quidē  
 sit, nondū tamen existat, haud ab re quæ-  
 ritur: neq; enim omnium quæ fiunt eadē  
 ratio est. quippe res similes, nullā natura-  
 lē figurā requētes, protinus ab initio eadē  
 cōstāt essentia: dissimiles verò, & qui-  
 bus varia est forma, essentiā generatione  
 posteriōrē habere possunt. Neq; em̄ quum  
 domus cōstruit, simul fiūt fundamenta, pa-  
 rietes, fastigiū, tegulæ, ianux fenestræ: ex  
 quibus omnibus quodāmodo compositis,  
 atq; in vnā formam redactis, domus ipsius  
 essentia cōposita est. Morbus verò & cali-  
 dus, & frigus, & humidus, & siccus, p̄tinus  
 ab initio, cū primū corpus temperaturē,  
 quæ bonę valetudini debet, limites excē-  
 serit, eandem sibi ipsi naturā habet. Quā-  
 uis enim interdū adeò sit exiguus, vt neq;  
 à nobis cognosci, neq; laborantium sensu  
 percipi possit, nihilominus tamen propriā  
 habere speciē censetur. Haud aliter inflā-  
 matio quoq; in quacūq; animalis p̄te cō-  
 stiterit, siue maxima, siue minima fuerit,  
 vnus atq; idē erit affectus, non specie qui-  
 dem.



de, sed magnitudine varius. Cæterū quod  
possint aliquæ affectiones in corpore cōsi-  
stere, adeo exiguæ, vt nō appareant, argu-  
mento est gutta longo tēporis tractu saxū *Gutta a-*  
excavans, de qua recte carmen hoc prodi- *qua lapi-*  
tum est: *Mollior assiduis saxum cauat ictibus* *dem excava-*  
*unda.* neq; eīm vel vnus, vel duo, vel tres, *uant, hinc*  
vel quatuor aquæ ictus, saxū ferientes, ac *enim fori-*  
ne cētessimus quidem, sensibiliter videtur *tem sophi-*  
saxū excavare. Neq; etiam fieri potest, vt *ste vete-*  
primo nihil efficiēte, alter aliquid faciat. *res acer-*  
quippe qui habet eandem, quā primus ha- *uabant.*  
buit, ad saxū rationē. Ergo si secūdus ict⁹  
in saxū quippiam effecerit, ipsum à primo  
ita mutatū fuisse necesse est, vt non omni-  
no idē, quale ab initio fuerat, permāserit.  
Etenim si ipsum vndiquaq; idem perma-  
neat, atq; agens quoq; in ipsum causa, nē-  
pe aquæ stilla, necesse est, quemadmodū à  
primo ictu non affectū est, ita neque à se-  
cundo, quod si fateare, neq; tertius quoq;  
ipsum afficiet, quippe eadē ratio est: haud  
secus de quarto, & quinto, & reliquis dein-  
ceps omnibus, dicendū est. Etenim quoad  
eodem modo se habente saxo, eadē quo-  
que causa accesserit, nihil amplius efficiet.  
Quod si à millesimo ictu, sēnsibilis videat⁹  
in saxo cōcavitas, ad singulos ict⁹, affect⁹  
in saxo nunc primū sensibiliter apparētis



*Natura* millesima pars referenda est. Quū itaque  
*vicit mor* causæ agūt in corpus, species affect⁹ ab ini-  
*bos exigu* tio est eadem, tamen ob exiguitatem non  
*os.* apparet. At verò huiusmodi affectus qui  
*Magni* adeò sunt exigui, separatis causis faciēti-  
*morbi ex-* bus illicò finiunt, naturæ videlicet ipsos fa-  
*ternis egēt* nāte. Quippe illi dūtaxat externo egēt au-  
*auxilio.* xilio, quos ob magnitudinē natura vince-  
 re nō potest. Igitur eadē quoque ratione,  
 quum primū mordax humor aliquod in-  
 testinorū deraferit, quāvis id quod factū  
 est nōdū videatur, nihilominus dispositio  
 ipsa sub dysenterix specie cōprehenditur.  
 Sed vt natura parua quædā vlcera, q̄ non-  
 nunquā eueniunt, ita & intestinorū abra-  
 siones, nullo adhibito medicamēto, sanare  
 potest. Hac ergo ratione, falsum omnino  
 est q̄ à quibsdā dicitur, Nullum per hu-  
 iusmodi symptomata, in corpore relinqui  
 affectū. Quod si verū esset, tamen intesti-  
 na tum fuisse affecta haudquāquā negan-  
 dum est, quum ab acredine excrementorū  
 ipsa rodentiū dolor notatu dignus eueni-  
 re percipiebatur. Hoc igit̄ ad omnia quæ  
 posthac dicturi sumus: veluti elementum  
 quoddā, obseruare debetis, sitq; hoc initiū  
 methodi, qua inueniri debent sedes affe-  
 ctę, nullā actionē lædi, nisi pars quę ipsam  
 facit, afficiat. Si enim quum vel dolor, vel  
 tumor



tumor præter naturã aliquæ eam infestat, omnino affici dicitur, multo magis eã affici, læsa actione, fatendum est. Atque iam supradictum est, quod ab excrementorum natura, affectæ sedis coniecturã facere possumus. id verò bifariam fieri constat: vel ab excretæ essentiæ ppriate, vel ab his quæ in ipsa parte cõtinetur. Similiter diximus ab innatis interdum rebus, de locis affectis cõiecturã sumi posse. Itẽ ab accidentiũ quoque genere, quæ quidẽ non mediocrẽ habent inter se differentiã, sed hanc postea explicabimus. Nũc verò rursus ad principium sermone reducto, in singulis partibus tentemus inuenire notas, affectus earum indicantes, tum eos qui in ipsarum essentia consistunt, tum illos qui ipsis veluti instrumentis accidunt. Rursus in utroque separemus & discernamus à factis iam affectibus, eos qui etiãdum fiunt: & qui nondum pertinaciter inhærent. Item causas quæ in affecta parte cõtinentur, ab iis quæ eo tanquam transitu dũtaxat vtuntur. Quod verò ex iis alij cõponantur modi, satis constat. Præterea distinguere oportet eos qui per consensum alterius particulæ accidunt, à propriis. nam magis proprium fuerit idiopathiam, id est, proprium affectum, quàm (vt medici solent) protopathiã, id est primarium affectum, non-

*Epilogus.**Affectus**per consensum.**Affectus**proprius.*



minare, veluti ex aduerso diuiso affectu p  
cōsensum à pprio. Ergo qui propriè voca  
bulis vti voluerit, primogenito quidē affe  
ctui, secūdariū aut posteriōrē opponet: Ei  
verò qui p consensum infestat proprium.  
Quāquā sæpenumero cōtingere potest, vt  
aliquis simul & p cōsensum, & ppria affe  
ctione laboret, cū in affecta particula per  
manēs fit dispositio. Neq; enim primario,  
sed secūdario & ppriè, ipsam tum affici di  
cemus. Id verò haud obscure in ptib<sup>9</sup> ex  
ternis videri potest: quēadmodū in corpo  
re plethorico, abortu ingēti bubōe ab vlce  
re, quū inductū fuerit vlcus cicatrice, pma  
net etiā dū bubon vel in suppuratā inflam  
mationē transiens, vel scirrhosam disposi  
tionē quam choerada, id est strumā, appel  
lāt. At nemo primarios dixerit huiusmodi  
morbos, q ob aliū præcedentē euenerunt,  
quippe p cōsensum facti ad huiusmodi p<sup>20</sup>  
mutant<sup>r</sup> idiopathiā, p inde ac si p<sup>9</sup>tinus ab  
initio p<sup>9</sup>pathia (id est primaria affectio)  
ipsis accidisset. Cæterū in p<sup>9</sup>sentia nō inu  
tile fuerit, meminisse corū quę in libro de  
Medicis nominib<sup>9</sup> diximus, vbi de signifi  
catis est sermo, quæ pessimè à recētiorib<sup>9</sup>  
tū medicis, tū Philosophis cōfundunt. Ma  
ximè em pprius vocabuli, (affectus) vsus  
est cōtrarius, & è diametro pugnat cū vo  
ce

*Bubo ab  
ulcere.*

*Choerada.  
Struma.*

*Medica  
nomina.*

*Actio.*

*Affectus.*



de actionis. Quippe id agere dicitur, quod ex seipso motum obtinet. Affici verò, quod motum habet ab alio. Quum itaque duo sint motus *Motus generis* alteratiōis, & lationis: ubi ad permanentē dispositionē alteratio puenit, *Morbus.* sitque dispositio scilicet præter naturā, morbus appellatur: quāuis per abusionem interdum, eādem dispositionem nonnulli affectum nominent, quod si more Græcorum patrio nomine vterentur, partes ipsas potius affici dicerent, quum motum sustinet præter naturam: quum verò dispositiones habent præter naturā, si propriè quis loquatur, egrotare eas *Vocabulorum usus.* potius, quā affici diceret: quod si ab usu recesserit, non solum egrotare, sed affici quoque dicere poterit. Equidē quod semper dicere consueui, nunc quoque dicam: quod in ea doctrina, quae de arte quapiā agit, satis est si quis vocabulum atque significatum eius, pro doctoris voluntate proferens, præcedat deinceps ad rerum enarrationē. Admonui autem nunc significatorum, eo quod nonnulli, non solum patriorum vocabulorum significata peruertunt, verum etiā eos qui rectē ipsis uti tentant, calumnia prosequuntur: de quorum numero sunt hi quoque, qui dicunt, interdum læsa actione, partem ipsam non lædi, eo quod nondum permanentem habet dispositionem, veluti ubi propter humores in

ventri



*Aegrotare.*

*Cibus trifariā corrumpitur, ex distinctione causarum. Cruditas.*

ventriculo cōtentos, caput dolet. Quòd si cōmutata ratione, de nominibus certare desieris, magis pprie interpretādo dices, affici quidē caput qñ ventriculo cōsentit, ægrotare verò, cū pprio affectu laborat. Similiter ventriculū affici quidem, quū à vitiosis molestatur humorib⁹: egrotare verò, aut per propriā intemperiem, aut quū inflātionē, vel vlcus, vel abscessum habet præter naturā. Quòd si oīno accuratiori scrutinio volueris huiusmodi quæstiones enodare, interdū simul atq; alimenta fuerint corrupta, coctionis quoq; actionē læsam esse dices: interdū hanc quidē non lædi, illa verò esse vitiata. Quippe corruptionis ciborū tres primæ, ac veluti generalissimæ sunt differētiæ. Vna qdē fit per proprios vētriculi morbos: Altera à vitiosis humorib⁹ in ipso accumulatis: Tertiā ab alimentorū qualitate induciē. Hęc igitur quū suapte natura, vel nidorosa, vel acida, aut foetori, aut putredini, aut omnino corruptiōi fuerint obnoxia, aut ex præparationis modo, ad huiusmodi dispositionē aliquā deducta, certū est ea in ventriculo corrūpi, atq; hoc modo cruditatē fortasse fieri dixeris. Sed oritur p̄tinus discordia, nūquid afficiatur tū ob hæc cōcoquendi facultas: quippe nonnulli p̄ huiusmodi

cru



cruditates, eam haudquaquā affici cōten-  
 dunt: alij verò è cōtrario. Atq; inuenitur  
 tertiā quoq; secta eorū, qui huiusmodi ali-  
 mēta incrudari negāt, quamuis ea haud-  
 quaquā concocta esse fateantur: tanquam  
 non sit idem, per negationē aliquid enun-  
 tiare, aut per priuatoriā vocatā à dialecti-  
 cis dictionē, idem intellexisse Erasistratū  
 puto, quū acinos, & sesama, & reliqua oīa  
 10 † quæ oīno corrupta, & immutata deii-  
 ciuntur, nullā dixit indicare in animalib⁹  
 factam esse ἀπὸ ψίχων, id est cruditatē, sed  
 hoc ipsum dūtaxat, quòd nō essent cōco-  
 cta. Quare in his negligēter versari nō o-  
 portet sed mēte adhibita diiudicandū est,  
 quæ quæstiones tāquā logicæ p̄termittēdæ  
 sint: cōtrā, quæ ad affectæ sedis notitiā cō-  
 ferāt, atq; idcirco accuratius tractari de-  
 beant. Hinc eī & id quod futurū est præ-  
 20 sagire, & affectū iam factum decenter cu-  
 rare poterimus. Itaq; sine contentiosis no-  
 minibus, ex rebus ipsis vtilitatē cōsequi li-  
 cet, hoc modo: Esto vt quispiā mane exur-  
 gens dicat nidorosum se ructū emittere,  
 aut aliquid huiusmodi, vt ab ouis frictis,  
 aut alia quapiā re magis foetente, & putri.  
 Ille itaq; q̄ fumosum ructū p̄cepit, fatea-  
 tur se à cœna placentā nidore plenā come-  
 disse, quales sūt q̄ ex oleo & itriis [ & aliis  
 huius

† ἀπὸ ψίχων.  
 Nam ex  
 concocta  
 putria, vo-  
 care solet  
 Hippoc.

Ructus  
 fumosus.  
 Itria.



*Oua fri-  
cta.*

*Radicula*

*si enim  
humani  
ventriculi  
officium  
esset aci-  
nos transmutare,  
accusaremus  
ob hoc ven-  
triculi corpus,  
ipsumque  
vitiatum  
esse putare-  
mus.*

*Ructus ni-  
dorosus.*

huiusmodi] præparatur: Alter verò confi-  
teatur, fricta oua ingessisse, atq; nunc illo-  
rū nidore ructare: deinde ali<sup>9</sup> cōplures ra-  
diculas comederit, vt foetēs putrisq; exeat  
ab eo ructus. Igit<sup>r</sup> cibos in is nō bene fuis-  
se concoctos nemo negat, quāuis ex hac  
re ventriculus haudquaquā fuerit affect<sup>9</sup>,  
neq; etiā quod ad ipsius rationē pertinet,  
circa actionem errauerit: haud aliter quā  
vbi quis integros acinos p<sup>r</sup> aluū deiecerit: 10  
si em̄ humani ventriculi officium esset aci-  
nos trāsmutare, accusaremus ob hoc vētri-  
culi corpus, ipsumq; vitiatum esse putare-  
mus. Cū verò id sui muneris nō sit, sed aci-  
norū essentia accidat, vt cōcoq; nequeāt:  
haud ab re dicemus, hos quidē nō esse cō-  
coctos, vētriculi verò corp<sup>9</sup> naturaliter se-  
se habere. Quippe hoc & nosse, & definire  
ad medicū haud inutiliter p<sup>r</sup>inet. Sed que-  
rere an dicendū sit actionem ipsius per hu 20  
iuscemodi excremēta fuisse læsam, an con-  
trā, ad medicæ artis opera supuacaneum  
est. Age rursus vt quispiā nidorosum ructū  
emittat, nihilq; nidorosum comederit, ni-  
mirum huic igneum quendā calorem in  
ventriculo esse dicemus. Ac deinde rursus  
distinguendo inuestigabimus, utrū ab in-  
tēperie corporis ipsius vētriculi hoc eve-  
niat, aut à flaua bile: eaq; vel ī ipsi<sup>9</sup> spatio  
conten



cōtenta, aut in tunicas, ita vt vix abstergi  
 possit, demissa. Ac ne hic qdē cōsistemus.  
 Nā quærere oportet, an iecinore male suo  
 officio fungente huiusmodi humor accu-  
 mulet, an is ex vniuerso defluat corpore,  
 an etiā in ipsomet gignat vētriculo. Hæc  
 sunt cognitu perquā necessaria, sed quæ vi-  
 ro indigent exercitata considerationis, q-  
 res ipsas potius quā nomina quib⁹ expli-  
 cantur scire studuerit. Non em̄ quēadmo-  
 dū corruptionis forma efficiētem causam  
 apertē ostendit, sic etiā licet inuenire defi-  
 nitā demonstrationem eius generationis  
 quæ circa formā illā est. Igitur si in ventri-  
 culo cibi nō suapte naturā in nidore trās-  
 eunt, efficiētē causam calidā: si verò sapo-  
 rem acidū referūt, eā frigidā esse necesse  
 est. Sed nō protinus cōstat, utrū intempe-  
 ries aliqua, an vitiosus quispiā humor, ven-  
 triculi corpus infestet. Proinde distinguen-  
 dum est, dareq; oportet cibos q- suapte na-  
 tura modo corruptionis quā maximē ad-  
 uersentur: vt panem aut chondron (gratia  
 exēpli) illis qui in nidorem transmutare  
 cibū cōsueuerunt, mel autem his q- acidū  
 à cibo sapore percipiunt. Deinde confide-  
 rare excremēta, tum ea quæ vomūtur, tum  
 quæ per aluum deiciuntur, num humor  
 aliquis, cū illis quidē biliosus & calidus,

*Chōdrus*  
*enim ad-*  
*dito aceti*  
*tantillo*  
*maximē*  
*conuenit*  
*picrocho-*  
*lis 8. Me-*  
*tho.*

cum



*Vomitio.*

cum his verò pituitosus ac frigidus, simul excernat: an nullo vacuato humore, ipsa exiguam quandam mutationē habeant. Quippe vbi igneo calore vētriculus infestat: panē aut chōdron sine humore deiici videbis, perquā exigua in ipsis facta trāsmutatiōe. Quòd si humor quoq; [prauus] deiiciat, qui cibū corrūpere possit, videntur cibi in huiusmodi humore submersi, & ab ipsius actiōe manifestius alterati, id qđ à vomitione clarius discernitur, si laborās suapte natura facilè vomere possit. Nā cogere eum qui vomere non potest, absurdū est. Atq; hæc itaprehenduntur, si in spatio vētriculi noxius humor innatet. Si verò in tunicas ipsius refunditur, nausea quidē omnino cōsequitur: sitis verò magis à calidioribus seq̃ nata est, vt à frigidioribus ciborū cupiditas, excitari solet. Verū cōsiderare oportet, vtrū illæsum sit hepar, an affectu quopiā laboret: & qualis sit ipsi affectus, vtrum calidus, an frigidus. Haud secus de splene quoq;, quippe ex horū omnium cōsideratione, simul cū quotidiana ciborū potionūq; experientia, exquisitè poterit quis inuenire, nō solum locū affectū, sed etiā ipsius dispositionem. Hæc autem notitia eò est vtilior, quò facilius curationis species p̃ ipsam figurat. Etenim calida dispo



dispositio, vbicunq; fuerit, semper refrige-  
 rāda est. Sed quousque, aut quomodo, aut  
 qua materia refrigerare cōueniat, locus af-  
 fectus cōmōstrat. Igitur si id ipsū qđ mole *Intēperies*  
 stat, nihil aliud fuerit quā intēperatura, *alteratio.*  
 calidam refrigerādo, & frigidā calfacien-  
 do, illicò iuueris hominē. Neq; nudā dun-  
 taxat opinionem, verum etiam scientiā &  
 quidem haud obscuram, susceptæ habebis  
 coniecturæ: idq̃ue multò magis, si vtrinq;  
 ipsam examinaueris: refrigeratib<sup>9</sup> tū me-  
 dicamentis, tum victus ratione, vidēdo ho-  
 minē sanari, à calorificis verò lædi. Quod  
 si humor quispiā in ipsis vētriculi tunicis  
 contineatur, nausea quidē vexabit, sed in- *Nausea.*  
 anis, & sine vomitu, & quæ turbat ac cōuel-  
 lit duntaxat, nullum humorem euacuans,  
 quemadmodū fieri solet, vbi secundū in-  
 ternam spatij latitudinem, in vētriculo hu-  
 mor continetur. Cæterum ructus ab aliis *Ructum*  
 acidi, ab aliis nidorosi emittūtur. Auxilia- *sanantia.*  
 tur autē illis quidē medicamentū ex trib<sup>9</sup>  
 piperis generibus institutū: aut aliud, qđ  $\dagger \Delta \iota \alpha \tau \rho \iota$   
 huiusmodi habeat facultatē, ex aqua vel vi  $\omega \mu \omega \pi \epsilon$   
 no epotū: his verò, tum absynthium, tum  $\rho \acute{\epsilon} \alpha \mu . 4$  sa-  
 hiera ex aloē facta, quam nōnulli picram *nit. tuēd.*  
 quoque appellant. Igitur si per primā pro- *Hiera dia*  
 tinus experiētīā, à familiarib<sup>9</sup> medicamē *loes.*  
 tis, in vtroq; humore, manifestū videatur



*ἡπιονμο* auxilium: simul habebis & notitiā *†*artifi-  
*υινην δια* ciosam, & modū curatiōis, si enim ipsis vti  
*γυνωσιν,* p̄seueraueris, homo sanitati restituetur: q̄  
*firmā di* si à solitis auxiliari medicamentis, vtrāq;  
*gnotionen* dispositionē noxa cōsequatur, deceptū te  
*et scien-* circa notionē inuenies. Quippe certissima  
*tificam.* omniū huiusmodi dispositionum notitia,  
 ab his deprehenditur, qui intelligūt quib⁹  
 quælibet præsidiis, ad bonam valetudinē  
 reduci possit. Sic equidem quosdā colicos *1*  
*Colicorū* vocatos sanaui, dato in potu medicamēto  
*sanatio.* ex aloë: quippe cōiiciens, mordacē humo-  
*Dialogē.* rem ad affecti intestini tunicas defluxisse  
 dato medicamento, speraui omninō huius  
 modi dispositionem fore quietiorē: quod  
 vbi contigit, intelligens recta me ductum  
 coniectura, rursus plus ipsius exhibui. Sed  
 quid me ad hanc cōiecturam promouerit,  
*Experimē* operepretiū fuerit enarrare. Vidi hoīem à  
*tum in af-* calidis, tū cibis, tum medicamētis, atq; ab *2*  
*fectu coli-* omni calorifica vict⁹ ratiōe irritari, rursus  
*ce.* iuuari ab alimentis boni succi, & tēperatis  
 noīatis: insuper inediā ei noxā inferre. do-  
 loris verò speciem percōtanti mihi morda-  
 cem esse respondit, qua de re multo magis  
 sperans, ad veram me peruenisse notitiā,  
 ausus sum amarū ei medicamentū exhibe-  
 re. Postremō cōspiciens hominem mirificē  
 adiutum, quæ fuerit dispositio, efficaciter  
 me



me deprehendisse putaui. Fuit alter, quem cibi concoctu faciles irritabāt. hic de præcedentib<sup>9</sup> interrogatus, respōdit, se in hāc deductum dispositionem, sumpto purgāte medicamento. Rursus interrogans, quid ipsum ad sūmendum medicamentum promouisset, intellexi mordaces erodentēsque dolores, multo tempore ventriculum infestantes, fuisse in causa. cōiectans itaque vitiatum fuisse à purgante medicamēto intestinum, ac dispositū ad fluxiones, vt facile reciperet ex hepate redundātes humores, qui deinde corrumperebuntur, cibū exhibui haud ita facile corruptibilē, & adstringentē, vnde & mordaces dolores mitigati sūt, & nihil postea excreuit, quum antea protinus, vt mordacitatem sentiebat, corrupta quædam, & liquida, & fœtencia excernere cogeretur. Quumq; multò post mordicationem tempore ea deiceret, ad superiora intestina dispositionē ipsam pertinere cōieci. Ita in alio quoque, vbi celeriter à mordicatione sequebatur excretio, dispositionē ad inferiora retuli intestina. Hūc igitur in iecto clystere, illū verò dictis iā cibis exhibitis, sanavi. quippe certò sciebam quòd proximæ vētriculo partes, exhibitis supernè, tum cibis, tum potibus: quæ verò non ita multum à sede distant, infernè iniectis

*Vitiatum  
intestinū  
expurgante  
medicamento.*

*Ex mora  
deiectionis  
indica-  
tio.*



medicamētis, prōptius adiuuantur. Non simpliciter itaq; hoc solū cōsiderare cōuenit, ventēne affectus sit, an aliquod intesti-  
 norum: sed quānā sit passio: tum quā notā propriā sint passionū quāque locorū affectorū, distinguere oportet. Quemadmodū concoctio frustrata, ventriculi est accidēs. at ciborum ac nidorosum, vel acidū ructū cōuersio, ad causas & affectus ipsius referēda est. Sic autē de intestinis & tēpus exit<sup>9</sup>, <sup>1 C</sup> & excrementorū species atque accidentiū differentia, cū iis quā prācesserūt [ & nunc in experientiam ducūtur ], simul & affectū ipsum & partem in qua consistit, ostēdere possunt. Ergo age vt per ventrem excremē-  
*Excremē- ta intesti- num affe- Etum indi- cantia.* ta quādam deiiciantur, aliquādo quidem ramenta, aut veluti membranarū rasura, aut cruētum aliquid, ac aliquādo simul omnia: intestinum vlcere affectū nemo dubitauerit. At verò utrū in exilibus intesti- <sup>2 C</sup> nis, an crassis vlcus cōsistat, nondū manifestū est. Sed, vt nuper dicebamus, & ex rasuræ specie, & exitus tempore, & (vt tertiū addatur) ex mixtione cum stercore, vt modò magis, modò minus, interdum nequaquā misceatur, distinguere oportet. Quippe infimarū partiū vlcera, nullas omninò vlcerum habēt notas. alui excremētis admixtas. earū verò partiū, quā paulò altius collo-



collocatę sunt, vlcera, mixtas quidem cum stercore habent notas, sed id leuiter dūtaxat. Quęadmodum si multō sint altiores, vehemētior erit mixtura, præcipuē verō in supremis intestinis, vlceris notę vehementer stercorei vidētur admixtę. Porro accidit sæpenumerō, vt ex vno indicio, simul & locus, & dispositio, deprehendatur: aut locus, vnā cū causa: veluti locorum notę, & ab actione læsa, & excremētis, & positu, & doloris proprietate, & propriis accidētibus sumuntur. Affectuū verō, & ab excrementorū specie, & loci natura, & doloris proprietate, & propriis accidētibus. Sanē actio læsa, affectam partē indicare potest: & quidē hoc modo. si enim accidēs aliquod circa cernēdi officium euenerit, oculum affici cōstat: verū an proprio affectu an per cōsensum, aut vtroque modo laboret, alia consideratione inquirendum est. Excrementorū species, affectam partem indicat, veluti iā antea dictum est, & per partiam ipsius essentiam, & per cōtēta in ipsa. Ac positus quoque, affectam partem nimirū cōmōstrare sufficiēter potest, quippe durus in dextra præcordiorum parte tumor, nō lientis, sed iecinoris affecti, nota est: quemadmodū si fuerit in sinistra, nō hepatis, sed splenis affectū portendit. Ac positus interdum, vbi

*Quinque  
modis lo-  
cus depre-  
henditur.*

*Quatuor  
modis affe-  
ctus depre-  
henditur.*

*Actio læ-  
sa.*

*Excreme-  
ta.*

*Positus.*



*Tunica  
frustulū  
excretū.*

*Vlcerū no-  
ta per vo-  
mitum ap-  
parentes.  
ὑποχόρυ-  
ξιον.*

*σώμαχος.*

similiter se habent excremēta, affectā par-  
tem cōmonstrat. Si enim membranosa tu-  
nicę frustulū excernatur, id vlcus esse alicu-  
bi ostēdit: verūm in qua sit particula, ex po-  
situ discere poteris. Nā si vomendo fuerit  
reiectum, aut gulę, aut ventriculi: si tussie-  
do, gutturis, aut asperę arterię: si screādo,  
fauciū: si cum vrina, ei⁹ fistulę: si à sede, ali-  
cuius intestinorū: si per mulieris pudenda,  
vteri affectum, portendit. At verò constat, 1. o  
quòd singuli dolores, propositus varietate,  
affectum locū ostendere possunt. Hoc etiā  
pacto, ea quę supra proposuim⁹ distingue-  
re oportet. Quippe apparētibus per vomi-  
tum vlceris notis, animaduertēdū est, utrū  
anteriores partes circa p̄p̄cordia, aut po-  
steriores circa dorsū, dolor aliq̄s infestet.  
dignoscemus autē id hac ratione. Etenim  
qui in anterioribus percipitur, ventriculū:  
qui verò in posterioribus, gulā occupare 2. o  
censetur. Haud aliter os vētriculi, à spatio  
ipsius distinguendū est: si deuoratis q̄bus-  
dā acrib⁹, hoc quidē in ore ventriculi, aut  
parte inferiore mordicationē excitet, illud  
verò in trāsitu gulę quę secūdū thoracem  
est. Omnia enim hęc positu distinguūtur,  
quemadmodum alia ex doloris specie. Ve-  
rūm de doloribus latius in secūdo libro di-  
cemus. Sed nunc exemplū aliquod afferre,  
ope



operæpretiū videtur quomodo scilicet locus, ex propriis affectus accidētibus innotescat. Nam supra diximus, singula quæ vulneribus adnascuntur, propriam ostensionē habere, id verò in præsentia subiiciendum est. Ore quidem ventriculi affecto, fastidiū infestat. per hepatis verò imbecillitatē, excrementa per aluū deiecta, aquæ in qua carnes nuper mactatæ ablutę fuerūt, simulantur, itē maxillæ rubræ apparēt in peripneumoniciis. Quin etiā propriæ affectuū ipsorū notæ, in excrementis deprehendūtur: ut ramentū, vlceris: si in vrina fabulosum residet lapidis: cucurbitæ verò seminib⁹ similia excrementa, latorum vermium indicia sunt. Atq; à locis ipsis, morborū indicia sumuntur: eo quòd quibusdam solis, morbus hic accadat, quibusdam verò solis nunquā eueniat: quippe soli oculi, suffusione laborant: lapis in renibus. & vesica, dūtaxat nascitur, atq; (vt nōnullis placet) etiam in collo. Lumbrici in intestinis gignūtur. Rursus impossibile est, vt abscessum cor sustineat: quēadmodū neq; pulmo, neq; ligamēta dolo-

*Affectus  
cognitio  
ex propriis  
accidentibus.*

*Vrina.*

*Locus.*

*Rarum enim est vt  
in colo, pulmonibus,  
vesica felle, rarior  
fortasse: quod ramentum vidi-*

*mus in vtero interiore, caluaria, & toto mesenterio.*



† *καυσώδης* additur in quibusdam codicibus, sed non est ne-  
cesse addi. Rigor enim in ardenti febre criticum sudorem vi-  
ribus integris prænuntiat iisdem infirmis mortem: in alijs  
verò mor-

bis *crisis* euadūt: sine ratione inuadēs rigor, vnà cū  
trahenti- febre, † inflammationis ad suppurationem  
bus nulla transeuntis, indicium est. Lingua nigricās,  
ratione ardentem febrim portēdit. Sic etiā coloris  
manifesta in vniuerso corpore pprietas, alia quidē  
cōmotus per hepatis, alia verò p splenis affectus ap 10  
rigor vnà paret: ita vt doctū medicum haudquaquā  
cum febre possit fallere, sicut ne color quidē quē hæ-  
suppura- morrhoides induxerunt. Cæterum paucae  
tionē de- admodum sunt ipsorū affectuū notæ, quæ  
clarat. nō simul locū affectum ostendant. Etenim

vt actionis noxæ, affectam duntaxat parti-  
culam: ita earum differentiæ ipsius affectū  
declarāt. Hæc ergo sola sunt affectuū pro-  
pria signa, quæ per accidēs ipsos sequūtur,  
id verò clarius in vniuerso hui⁹ operis di- 20  
scursu patebit. Necnon videbuntur cōmu-  
nes quoque notæ, quæ simul & affectum, &  
sedem affectā, aut duos affectus, aut duas  
particulas idicare possint. Huic itaq; libro

*Proprius* in præsentia finem imponere statui, si de  
*affectus.* propriis affectibus, & iis qui per cōsensum  
*Affectus* eueniūt, aliquid addidero: admonēs in pri-  
*per con-* mis q̄ affectus, qui à reliquis medicis pri-  
*sensum.* marij vocantur, equidem cōmodius pro-  
prios



prios affectus appellauerim, quāquā nihil refert, si eos primarios nominare volueris. Quippe satius est rerū differentias intelligere, quā contendere de nominib<sup>9</sup>. Sanè quum vel vapores viriosi, vel ipsi quoq; humores à ventriculo ad cerebrū ascendunt † mens læditur: primogenio quidē affectu † Διάνοια cerebrum tum laborare, dicet nemo: quāquā omni affectu carere ipsum, haudquam defendi potest. Verū quod per verbum cōsentire de illis ipsis est in cōfesso, Percōsen- id omnino verissimū est. quippe ex verbo sum affi- (per consensum affici) partē nō penitus ab affectu esse liberā, sed ipsam cū alia affici, declaratur. Atqui melius, clariusq; enarraueris, si eā partē quæ per consensum afficitur, ob alterā affici dixeris. Igitur qđ multi medicorū veluti somniātes obscurē intellexerūt, atq; ipsū vtpote nō intelligētes haudquaquā clarē enūtiauerūt, id equidē veluti instituto operi perquā necessariū, docere aggredior, inde sumpto initio. Sūt nonnullæ actiones, † quæ idonea indigētes † ξυλυσ ε materia, ipsam ab aliis partibus preparatā πιηδ'ις accipiunt, qua de re interdū optima ratio. γινόμενα ne fit, vt nulla existēte in actionis cuiuspiā Vox. propriis instrumētis noxa, actionē ipsam perire contingat, defectu scilicet materiæ, ex qua fieri cōsuevit: veluti in voce res sese



†*ἡ φύσις*  
*ois, effla-*  
*tio.*

*Vocis in-*  
*strumenta.*

*Vox vitia-*  
*ta.*

†*καὶ ἡ*  
*τῆς ψῆς,*  
*sed facile*  
*intelligi-*  
*tur.*

habet. Nā in libro quem de ipsa cōscripsi-  
 mus, ostensum iam est, q̄ † flatus, materia  
 quidem vocis est, & efficiunt eū contracto  
 thorace, intercostales muscoli. Igitur his  
 nihil agētibus, animal vocē amittit, & q̄-  
 dem nullo interdū in propriis vocis par-  
 ticulis, apparente affectu. Sunt verò huius-  
 modi partes, summatim quidem loquēdo,  
 totus larynx. Si verò particulatim explica-  
 re volueris, sunt tres cartilagine, à trib<sup>9</sup> 10  
 motæ musculis, quib<sup>9</sup> accedūt nerui à cere-  
 bro demissi. Est prætereā in gutture ligula  
 (Græci epiglottida vocāt) hæc maximè p-  
 priū vocis instrumentū est. Etenim quū mo-  
 deratè & aperitur & cōmittitur, vocē effi-  
 cit, quanquā vocem reddi impossibile est,  
 nisi vehemēter spirit<sup>9</sup> egrediatur. id verò,  
 intercostales muscoli p̄ficiūt. Cecidit qui-  
 dam ab alto, † ita vt dorsi initiū affligere-  
 tur, is tertio die exiguam admodū vocem 20  
 emisit, quarto deinde die omninò obmu-  
 tuit resolutaq; simul fuerunt crura, mani-  
 bus omninò illæsis, sed neque spirationem  
 amittebat, neq; difficulter spirabat. Quum  
 enim tota sub ceruice spina esset resoluta,  
 accidit thoraci, vtrum per septum & septū  
 trāuersum, & musculos supernos, numero  
 quidē sex, moueretur: quippe nerui ex spi-  
 nali medulla, quæ in ceruice est, ipsis adue-  
 niunt



niunt. At intercostalium musculorū nerui, *Interco-*  
per quos efflationē fieri diximus oēs affe- *stales mu-*  
cti erāt. Quum itaq; frustra medici nego- *sculi læsi*  
tium subirēt, circa crura quidem, vtpote re *vocem vi-*  
soluta: circa guttur verò, propter vocis af- *tiant.*  
fectū, equidē id interdixi, atq; affecto dūta  
xat loco curationē adhibui. Proinde fini-  
ta tandem spinæ inflāmate: à septimo  
die vox restituta est iuueni, & crura motio  
10 nis facultatē recuperauerūt. Huiusmodi er  
go noxę speciē, magis propriē p cōsensum  
euenire dixeris, quā vbi ab humorib<sup>9</sup> in  
ventriculo cōtentis, caput dolore tentatur.  
quippe per huiusmodi dispositiones, eleua  
tur ad ipsum aliquid: sed in dictis nuper di  
spositionibus, nihil noxium ad crura defer  
tur. Nam cōtra, priuantur ea facultate, quā  
antēā spinalis medulla ipsis suppeditabat.  
Guttur verò, quum vox ablata est nō om-  
20 ninò priuatur spiritu. quippe spirare ani  
mal per ipsum, etiamdum videmus. At ve  
rò flatū amittit, qui quidem fieri solet, cū  
affatim plurimus spirit<sup>9</sup> per guttur anima  
lis foras effertur. Sed de nominibus cōten  
dere cæteris permittamus, nobis enim res,  
quas illi penitus ignorāt, pertractare satis  
fuerit. Quippe aliter dolet caput, vbi con  
tenti in ventriculo humores eleuātur, qui  
simul & calfacere, & distendere caput  
possunt



*Suffusio.* possunt: atq; aliter suffusorū apparent visa quēdā, neq; calfactis, neq; intēris oculis, sed solo vapore per ipsos trāseūte. Prētereā aliter affici videtur is, cui meat<sup>9</sup> à cerebro descendens obstructus est: aliter ille, (quāuis huic quodā modo sit similis) cui propter spinæ inflātionē resoluta sunt crura: atque aliter is, cui vox aut periit, aut vitia est. Etenim ad crura facultas quēdā, sed citra essentiā, descēdere prohibita est, ad oculos 10 verò cū essentiā: verū ad guttur; quāuis materia perueniat, sufficiens tamē ipsius quātitas haudquaquā accedit. Qui verò ob intercostaliū musculorū perforationē obmutuit is totā vocis materiā amisit. Porro quēadmodū crura, per dictas spinæ dispositiones resoluuntur, ita etiā guttur, vocalibus nervis vel incisis, vel laqueo interceptis. (Vocare aut vocales nervos cōsuevi eos, quos ipse inueni: nā praeceptores mei eos dunta 20 xat qui ad arterias pertinet, cognoscebāt) atque ob horum quoque vitia, vox perire solet. quoniam proprii gutturis nervi, quos equidem recurrentes nominare sum solitus, ipsorum essentiā pars esse censentur. Sed quum ad multas alias partes distributi perueniant, nullam habeo aliam magis propriam appellationem, ea qua vocales ipsos nominaui. quippe ad instrumēta vo-

*Vocales nervi.*

*Nervi recurrentes.*

cem



cem cōcinentia, propriè pertinent. Atq; idē  
 est modus, quo gutturis muscoli læduntur,  
 siue recurrētes nerui, siue hi qui iuxta arte-  
 rias sunt, vitiētur. vtrinq; enim animalis fa- *Facultas*  
 cultas desideratur, sine qua à cōsilio, & vo- *animalis.*  
 luntatis imperio, moueri illos nō cōtingit.  
 Et quidē incisus musculus, qui ligulā (id est  
 epiglottida) mouent, animal penitus mutū  
 euadit, sed neq; simili omninō modo, neq;  
 10 etiā in totum diuerso, ab eo quo læsis ner-  
 uis, vox perit. Nā vtriusq; noxa, hoc cū al-  
 tera habet cōmune, quòd ligula cōtinuita-  
 te, quam admouens principiū habet, priua-  
 tur. id verò fieri solet siue neru<sup>9</sup> siue muscu-  
 lus incidatur, aut laqueo intercipiatur, aut  
 contundatur, aut quomodolibet aliter vi-  
 tierur. Equidē vocē vitiatā fuisse memini,  
 adeò vt penè perderetur, in frigidatis vehe-  
 menter neruis recurrentibus, quū per hye-  
 20 nem cernix fuisset incisa: quod quū intelli- *Vox qui-*  
 gerē, calorificis remediis naturalē tēperatu- *bus affe-*  
 rā neruis restituens vocē reuocaui. Cæte- *ctibus pe-*  
 rūm vt ob materiæ priuationē, perforato *rit.*  
 thorace: ita etiā aspera arteria tota incisa,  
 vox perit, quòd nullus supersit spiritus, qui  
 ad proprium vocis instrumentū trāsmitta-  
 tur. Idē efficit, sed alio modo, laqueus [toti]  
 collo circūdatus. verū hic nō solū mutū  
 reddit animal, sed etiā suffocat, tollēdo  
 scilicet.



*Angina.**Chæra-  
des.**† Διὰ φ-  
θίγεται.*

scilicet spirationē. Arteria autem dissecta, voci quidē nocet, sed animal respiratione non priuat. Angina verò vocata, quum sit internarum gutturis partium inflāmatio, strangulationi proportionē respōdens, respirationē tollere potest, ipsius meatū obstruendo. Idcirco vocalis instrumēti, maxime proprius affectus est, ac deinceps exter-  
 norum ipsius musculorū noxa est. Cæteras verò partes omnes quarū meminimus, nō io-  
 propriè, sed per consensum potius afficit. Quū ex ceruice quidē chæradas (id est stru-  
 mas) in profundo incūbentes excideret, nō scalpello diuidēs mēbranas, nevas aliquod  
 dissecaret, sed vnguibus eas euellēs, impru-  
 dens ob ignorantia simul recurrentes ner-  
 uos distraxit, atq; hoc pacto puerū libera-  
 uit à strumis, sed mutum reliquit. Quidam  
 alius, in alio puero sectionē faciens, ipsum  
 similiter semimutū reddidit, læso videlicet 20  
 altero duntaxat neruo. Mirabantur verò  
 omnes, quo pacto neq; aspera arteria, neq;  
 gutture affecto, vocē lædi contingeret, qui  
 quum vocales nervos (me ostendente) con-  
 spicerent, admirari desierūt. Quibus igitur  
 partibus, vel materiæ, vel facultatis copia  
 \*non transmittitur, actionē lædi probabili-  
 ter dixeris, parte ipsam faciente nequaquā  
 læsa. At verò si vel à vaporibus, vel humo-  
 ribus



ribus aliunde ad ipsam venientibus, lædatur,  
 eam non rectè dixeris illaeram. Neq; minus  
 etiã probabile est, partem vel materia, vel  
 facultate priuatam, lædi, utique si officium  
 suum, quum hæc reciperet, secundum natu-  
 ram exercere posset. Proinde ex huiusmodi  
 in vtrâque\* partem conatu, dialecticorum *† πικρῆ*  
 problematum cōsideratio, neque ad affe- *γνώσις,*  
 ctuum notitiã, neque ad curationẽ, neque *sunt enim*  
 10 etiam ad futurorum euentuum præfagia, *propria*  
 quicquam vtilitatis afferre posse videtur. *epicare-*  
 Animaduertas ergo velim, quomodo equi *mata dia-*  
 dem curationem ex affecti loci notitia in- *lecticorũ.*  
 uentam, hac cōsideratione neglecta, narra-  
 re aggredior. Occurrit mihi quidam, medi- *Digitire-*  
 camentum tribus digitis adhibitum osten- *soluti.*  
 dens, dixitq; triginta iam diebus, sensificã  
 ipsoꝝ facultatẽ se amisisse, illa seruata  
 motione, sed nihil præsidij ab impositis me-  
 20 dicamentis percipere. Ego verò id quod in  
 huiusmodi casibus facere cōsueui, ne tunc  
 quidem obliuioni tradidi. quippe vocato  
 medico qui digitorum curationem suscep-  
 rat, interrogauĩ cuiusmodi remedia adhi-  
 buisset: quẽ quum intelligerem ad hãc rem  
 esse idonea, causam inuestigare cœpi, cur  
 nullum ab ipsis homo præfidiũ cōsequutus  
 fuisset. inquirens itaque quæ præcesserant  
 accidentia, inueni, ipso dicente, neque in-  
 flam



flammationem, neq; refrigerationem, neq;  
ictū precessisse, sed ipsum paulatim sensum  
perdidisse. Captus itaq; admiratione, rur-  
sus interrogavi, nū superiorū partiū aliqua  
icta fuisset? Ille respōdit, digitos quidē non  
fuisse ictos, sed dorsi initiū fuisse afflictum.  
Deinde quomodo, & quando id accidisset  
quum interrogarem, respōdit, se quum Ro-  
mam proficisceretur, à vehiculo decidisse,  
ac non multò post digitorū incoepisse affe-

*Nervorū à ceruice ortorū pro ductio & confusio.* ctum: quocirca coniecturā feci, nervorum  
qui primi à septimavertebra pcedūt, partē  
quampiā ob ictū fuisse inflammatā, ac nūc  
scirrhosam habere dispositionē. Id verò in-  
tellexi, doct<sup>r</sup> ex arte secādi corpora, q̄ ner-  
ui per propriā circūscriptionem, veluti ve-  
næ, exoriri videntur, adeò vt vnūquemque  
exquisite vnū esse putares, quemadmodum  
& venam. Verūm protinus ab origine mul-  
ti sunt simul concreti, & communibus inuo-

*Parado-  
xon.*

lucris cōtenti, quæ à cerebri mēbranis ex-  
oriuntur. Ergo nervorū, qui à ceruice pro-  
deūt vltimi, humilior pars ad minores per-  
uenit digitos, per cutē ipsos continentē, ac  
prætereā per medij digiti medietatē disper-  
sa. Quod verò ceteros medicos in maximā  
duxit admirationem, quòd media dūtaxat  
pars afficeretur, id mihi persuasit potissi-  
mum, eam tātūm nerui partem quæ in cu-  
bito



bito ab ipso egrediens, in iā propositis digitis finitur, esse affectā. Igitur adhibitum ei medicamentū abiicere iubens, illi præcipuè spinę parti, quę in affecta particula initium & originem obtinebat, ipsum adaptavi. Secutaq; est res, vt aspicientibus videbatur, & admirabilis, & inopinata, qđ digiti manus adhibitis spinę medicamentis essent curati. Verū affectu omnino summoto orta est inter medicos quęstio, quęnā sit eiusmodi neruorū dispositio, vt per ipsam seruato eorum motu, sensus pereat. Equidē id ipsum dicebā, qđ priores medici dicere solebant, quod scilicet sensus per affici, motus verò per facere aliquid, explicatur: quapropter vt quis moueatur, opus est robore: sed vt sentiat, vel minima facultas sufficit. Cū quę recte me hūc dixisse sermonē putarēt: quid igitur (inquā) num vidistis aliquando cōtra euenire, vt seruato sensu, motus periret? Tum cæteris omnibus se nunquā cōspexisse dicentibus, vnus id confiteri audebat: ac nomine laborātis citato, testes quoque adhibere pollicebatur. Quamuis hoc cum proposita ratiōe pugnare videretur, in partibus motis illis quidem, non verò sentientibus (etenim quod ad hanc rationem pertinet, fieri haudquaquā pōt, vt perduto sensu, motus à voluntatis imperio prodiens ser-

*Sensus amissus il-  
leso mo-  
tu.*

*Alias moueat.*

*Motus voluntarius.*

D



uetur) rursus orabāt, vt causam explicarē,  
 quamobrem vtraque appareāt. Ea verò (vt  
 planè intelligūt ij, qui neruorum dissectio  
 nem didicerūt) talis est: Omnis volūtarius  
 motus, ad musculorum officium pertinet:  
 quippe nullus neruorum per se, sine muscu  
 lo, vllam huiusmodi in animātis particulis  
 actionē efficere possunt, sed per musculos,  
 omnes à consilio & voluntate prodeuntes  
 motus perficiunt ad partes verò mouēdas, 10  
 musculi ipsi aliquando quidem manifestè  
 perueniunt, aliquādo verò per medios ten  
 dones, quos aponeuroses (id est deneruatio  
 nes) aliqui cognomināt. Atq; ex hoc gene  
 re sunt tendones, quibus digiti mouentur,  
 haud absimiles his, qui toni ab Hippocrate  
 nominātur, rotūdi scilicet. Si itaq; musculo  
 rū neruos affici contingat, motus digitorū  
 perit: si verò eos qui ad cutē perueniūt, tan  
 gendi sensus corrūpitur. Sed vbi tota resol 20  
 uuntur mēbra, cū videlicet cōmune princi  
 piū affectum est, simul & sensus & motus  
 pereunt: atq; tum locū primario affectum,  
 ex læforum neruorū multitudine dūtaxat,  
 inuenire poteris, idq; si exquisitè cognoue  
 ris cōmunia ipsorū principia, quę in neruo  
 rū dissectione percurrimus, cū nullus ante  
 me huiusmodi dissectionē accuratè tracta  
 set, vtpote nemine nō plus minus errante.

Igitur

*Tēdones.*

*Toni, epi  
dem. lib.*

*2. sect. 4.*

*Paralysis*



Igitur solus ille, qui in ipsis fuerit exercita-  
 tus, exquisitè cōsiderare poterit, in qua ver-  
 tebra, spina sit affecta: siue tota, siue altera  
 eius pars afficiatur. Nam accidit, vt dextra *Pars al-*  
 pars dūtaxat afficiatur, altera oīno illæsa: *tera spina*  
 aut è cōtrario, vt illa manēte itegra, sola si *affecta.*  
 nistra affectū sustineat. Atq; hac ratione, in-  
 terdum tota pars sinistra resoluitur, dextra  
 parte manēte illæsa: interdū contrā, dextra  
 10 pars dūtaxat & afficitur, & resoluitur. Vbi  
 verò nō affecta spina, tātū vnus nerui pro-  
 cessus læsus est, eas dūtaxat partes resolu-  
 tio cōsequitur, in quas neruus ille distribu-  
 tus est. Accidit enim interdum, vt duo, aut  
 tres dūtaxat neruorū processus afficiātur,  
 quum interim spinam nulla noxa infestet.  
 Sic affectus Eratis, qui per reliquas quidē  
 manus partes omnes, ita fuit resolutus, vt  
 neque sentiret, neque moueretur, sed in tri-  
 20 bus digitis sensum habebat integrum. Por-  
 rò cuidā alteri, nō solum ij manserunt ille-  
 si, sed etiam eorum musculorū, in quos ner-  
 uorū propago sub septima vertebra exorta  
 distribuitur, motiones seruatae sunt. Atque *Nervorū*  
 alius, ob casum ab alto vehementer affli- *spina af-*  
 ctus, solos eos musculos resolutos habuit, *fectorum*  
 qui huius nerui partes suscipiūt. Idē etiā in *notitia.*  
 iis dūtaxat cutis partibus sensum amīsit, ad *† ἀπὸ νε-*  
 30 quas prædicti nerui\*ramusculi demittūtur. *μύσος.*



*Musculi  
cognitio.*

Igitur si scire desideras in qua vertebra sit affectus, vtrum in sola nervi cuiuspiā propagine, an in spinali quoq; medulla, in nervorum dissectione te exercitatū esse oportet: communemq; habere methodum, qua resolutos musculos, vnā cum cute quæ sensum amiserit obserues. nā spinali medulla in aliqua vertebrarū affecta, oēs partes inferiores resoluūtur. Quod si in altera parte lædatur, altera manēte illæsa, partes dūtaxat quæ illi è directo respōdēt, resolutio infestabit. Si verò nervi radix afficitur, reliquę partes oēs affecto loco inferiores, nihil afficiētur, sed solæ illę partes resoluētur, in quas singuli nervi distribuūtur. Hęc si accurate didiceris, circa resoluta mēbra, relicta spina, oīno occupaberis: huic enim adhibitis remediis, partē affectā curabis. Sic etiā si nō circa spinā, sed in regione illā sequente, nervus afficitur, partim ex musculis, partim ex cute, quærēdæ sunt notæ. Cutē quidē facile est cognoscere, nā oculis subiicitur: musculi verò, ex actione quę perit deprehēdūtur. Proinde necesse est, circa musculorū sectionē te exercites, vt cognoscas, cuius actionis quilibet sit istrumētū: sic enim duntaxat discernere poteris partes, quarū actio perit nullo morbo corporalē ipsarū essentiā infestante, aut in quibus præcedit mor



morbus, vel fiēs, vel factus. Verū morborū  
 genera & differētias omnes ex eo didicisti  
 libro, qui de Morborum differētiis inscri- *Librorū*  
 ptus est: atq; similiter ex alio accidentium *de morb.*  
 differentias. at de causis vtrorumq; etiam *& sym-*  
 separatim scriptum est. In vno quidem de *ptomatis*  
 morbis, in tribus verò de accidentibus: in *utilitas.*  
 quibus exercitari oportet eū qui facile vo-  
 luerit inuenire, discernereq; & causam, &  
 affectum, & sedem affectā. Etenim fieri nō  
 potest, vt omnia per concursum doceātur,  
 quāuis eorum, qui ab experientia empirici  
 vocātur, huiusmodi fuerit opinio. Qui ve- *Syndro-*  
 rò accuratē & præcedētia, & præsentia co- *mas em-*  
 gnouerit accidentia, atq; sic ad curandorū *pirici fin-*  
 morborū experientiā via & ratione perue- *gunt ex*  
 nerit, inueniet & locum affectum & simul *proprijs*  
 ipsam dispositionem. Sed id magna ex par *accidenti*  
 te accidit partibus, quæ in intimo corpore *bus, com-*  
 20 constituuntur, veluti paulo ante de his qui *munibus*  
 sensum & motum perdiderunt, ostēdimus. *& causis*  
 Atq; non ab re fortasse fuerit, narrare que- *externis.*  
 dam quæ iam facta fuerunt, cuiusmodi hæc *Excreme*  
 sunt. Puer annorū ferè sex, inuitus per aluū *ta sponte*  
 excrementa deicere incēpit resolutio de- *deiecta.*  
 repente circa sedem musculo. Quinetiā se-  
 ni quondā huiusmodi euenit accidens, at-  
 que rursus alius puer, ætatis ferè annorum  
 quatuordecim excremēta inuitus per aluū

D ;



*Musculi  
circa spi-  
nam af-  
fecti.*

*Spina re-  
frigera-  
tio.*

*Curatio.*

deiecit, infestâte simul vesicâ dolore, atque alteri vrina quoque fuit suppressa. Contrâ, alius vrinâ inuitus excreuit, atq; alius non solum vrinam, sed alui quoque excremēta inuitus deiecit. In iis omnibus, ea quæ præcesserunt, scrutari oportet. Nam in totû aut refrigeratam, aut ictam ipsoꝝ spinâ, arbitrandum est. Sed frigus quidem, vni duntaxat affecto musculo nocet: ictus verò, magna ex parte pluribus noxâ infert. Nā per-<sup>10</sup>rarû est, vti icta spina vn<sup>o</sup> afficiatur musculus, quoniâ nerui ex spina orti in plures musculos diuiduntur. Verûm vbi ob ictû affectus est muscul<sup>us</sup>, si superueniēs inflâmatio ob negligentiam in scirrhum coierit, resolui ipsum cōtingit, quanquâ id rarò accidere videatur. At verò frigus sæpenumero vnum lædit musculû, maximè cum qui in superficie sedis est, siue sederit quis super lapidem frigidû, siue in aqua frigida supra<sup>20</sup> modû fuerit versatus. Igitur puer cuius & vesica, & sedes lēdebatur, cû ī fluuio pisces venaretur, sic fuit affectus. Nōnullis etiâ in aqua frigida natantibus, itidē accidit. Hos itaq; sic affectos, curare oportet, calorigifica auxilia locis affectis adhibēdo. Quibus verò neruorum à dorsi spina ortorû quispiâ fuerit affect<sup>us</sup>, eius principio adhibēda sunt remedia. Sæpenumero etiâ vbi ab alto lo-  
co



co quis cecidit, aut vehementem fortemq;  
 ictū spina subiit, inflāmatio ad plures par-  
 tes extensa, non solum musculis, sed vesicæ  
 quoq; noxā intulit, quibus ob vesicæ ipsius  
 affectū vrina supprimitur. Sunt quibus nō  
 solum vrina, sed alui quoq; excrementa pe-  
 nitus retinentur, affectis scilicet intestinis.  
 Nam vt musculi affecti, actiones à cōsilio  
 & voluntate pendentes: ita & vesica & in-  
 10 testina, naturales actiones lædere possunt,  
 eo quòd ipsis cōtractis excernūtur ea quæ  
 continent. Atque in hac re plurimū diffe-  
 runt naturalia ab animalibus instrumētis:  
 siquidem naturalibus cognatam actionis  
 vim esse, animalibus verò instrumentis, à  
 principio (veluti lumen à sole) ipsam de-  
 fluere, iam ostensum est. Ergo vt magneti  
 lapidi vis inest, qua ferrum attrahere po-  
 test, ita naturalia quoq; instrumēta omnia,  
 20 facultatem habent, qua actionem suā per-  
 ficiunt. Proinde si permanens fuisset ipso-  
 rum essentia, neque arteriis neque venis  
 indiguissent. verū quia nutrimento egēt,  
 seruareq; oporteat innati caloris tempe-  
 riem, hanc ob causam, & venis indigebant,  
 & arteriis. Sic etiam musculi, vt essentiam  
 suā seruare possint, non secus quā natura-  
 lia instrumēta, & venis & arteriis indigēt.  
 At quia cognatum sensus & motus princi-

*Vrinae  
suppres-  
sio.*

*Aluus  
astricta.*

*Natura-  
lia instru-  
menta.*

*Animalia instru-  
menta.*

*Musculo-  
rum com-  
positio.*



*Natura-  
lia instru-  
menta.*

*Animalia instru-  
menta.*

*Synceris-  
sima vi-  
si o.*

pium non habent, idcirco nervis (per quos  
hoc ipsis influat) semper indigēt, q̄ illis ea  
suppeditare possint, quēadmodū sol omni-  
bus rebus quas illuminat, splendorē affert.  
Quamobrē solis partibus, quæ & sentien-  
di, & mouendi vim habent, accidit, vt ipsis  
interdū haudquaquam affectis, nihilo mi-  
nus corū actio pereat: id quod naturalibus  
instrumentis accidere nō solet. quoties enim  
horum actio læditur, semper primario affe- 10  
ctu laborāt. Verū animalibus instrumen-  
tis omnibus, naturale quoq; munus debe-  
tur: quippe & arteriarū, & venarum admi-  
niculo indigent, ad essentiā ipsorum seruā-  
dam. Ideo accuratissimē intueri, ac discer-  
nere oportet, quæ accidentia eis, ea ratione  
qua aut naturalia, aut animata sunt, soleāt  
euenire: veluti alterari (vt ita dicam) à vici-  
nis, ipsis, vt naturalibus: alterationem verò  
sentire vt animatis, euenit: Sic oculis quoq; 20  
sæpenumero contingit. Nā vapores à ven-  
triculo elati, ipsos omnino alterant. verū  
tam exigua alteratio non ab omnibus sen-  
titur, nisi syncerissimam habeant sensificā  
facultatem. voco autem syncerissimā, quæ  
minimas quasque res cernere potest.

LIBRI PRIMI

FINIS.

G.L.



CL. GALENI DE  
AFFECTORVM LO-  
CORVM NOTITIA  
LIBER II.

10 *In hoc libro totus ferè Galenus est contra Archigenem in proprietate, hoc est specie, & qualitate dolorum, unde non tam dispositiones quàm affectas partes inuenias. Fuit hic Archigenes insignis medicus, & testimonio Galeni probus. Ex cuius præcipuè commentariis de locis affectis, horum librorum partem Galenus transtulit. Inuenias quoque apud Galenum in libris de compositione pharmacorum *κατὰ τὸ πρῶτον, κατὰ τὸ δεύτερον*, qui ante Galenum hoc idem argumentum de locis affectis tractauerunt.*

20 **S** CORPVS est, iubete semper Erasistrato, exercere mentē cum in aliis artis operibus, tum verò in ea, quā nunc proposuimus, affectorū locorū notitia. Circa quam tres sunt exercitationis modi. Vn<sup>o</sup> circa singulas corporis ptes, quas locos nomināt: Alter circa causas & dispositiones: Terti<sup>o</sup> est de accidentiū differētia. Igitur à locis sumpt<sup>us</sup> modus, huiusmodi est: Affecto cerebro, huiusmodi

*Exercitationis  
modi tres.  
Locos.*

D 5



separatim eueniunt accidentia: Ventriculo affecto, hæc sunt propria: Colo affecto, hæc: atque in reliquis similiter. A dispositionibus, & causis, talis est: Inflammationis seorsum, huiusmodi sunt accidētia: Scirrhi, huiusmodi: Refrigerationis, hæc: Plenitudinis, hæc: *Διαφθορά* (id est corruptionis ciborum) hæc. Ab accidentibus, vt hoc doloris genus, hæc dispositiones portēdit, aut hosce locos: tussis verò hæc: ita & vomitus, sanguinis profluuiū, fluor alui, conuulsio, rigor, quæ est concussio totius corporis, horror, delirium. Quum enim hæc omnia inter se hoc pacto distinguuntur, facile intelligetur, quid vel bene, vel male dictum fuerit. Quòd verò sic sese res habeat, planè disces, si singula consideraueris.

*Διαφθορά est cum humor a deo vitiosus est vt nullo caloris & nature officio alimentiformam & qualitatem suscipiat.*

*De his quæ ab Archigene scripta sunt putante ex doloris specie sedem affectam posse discerni.*

## CAP. I.

**Q**Uale hoc sit quod statim initio proponatur: quū in hoc genere multus sit Archigenes, qui ex dolorum differētiis, locos affectos significari existimauit, exactè super his considerandum est. Nam stupidum quidem dolorē in neruis fieri dicit, sed planè peccat. quippe cū stupor à frigida dispositione oriatur, non neruorū dun-

tax



taxat, sed etiam venarum, arteriarū, carnis, membranarum, tunicarum, & cutis erit. Igitur si ob id, quòd hæc omnia per nervos sensum habent, ad nervos dispositionē refert, cur non reliquas omnes dolorum differētiās, propriè ad nervos pertinere dicit?

Quippe ut dolor, tristis sensus est: ita voluptas, blādus est sensus. Ergo non solūm stupor in nervis est, verūm etiam reliquorum

*Dolor.*

*Voluptas  
vel delectatio.*

10 dolorum omnium, quos ipse quoque Archigenes descripsit, unusquisque. Quòd si rem accuratius inspexeris, haudquaquā doloris, species dicendus est stupor: veluti neq; vlcis species, vlcus inflammatū. Sed duarum potius rerum, in his quidē vlcis & inflammationis, in illis verò doloris & stuporis cōcursus est. Etenim stupor refri-

*Stupor*

20 geratio insignis est, idcirco corporibus ita dispositis, & sensus & motus difficultatem inducit. Quemadmodum completa refrigeratio, & sensum & motū omnino tollit. Sed quod stupor dispositionis sit nomen, non sensus, aut doloris, sic dicente Hippocrate declaratur: Stupor enim mediocris, dolorē soluere potest. Nam stupor, ob refrigerationem fit, ut planè videre est in his, qui in hyeme per frigora p̄ficiscūtur, atq; in refrigerantibus quoque medicamentis. Nā si extrinsecus immodice adhibeantur,  
par



*Nimia  
refrigera-  
tio.*

*Paulus  
libro.2.  
cap.39.*

*Torpedo.  
4.de sym-  
pto.caus.*

particula ipsa stupida euadit: quæ deinde  
sensum quoq; omnino amittit, si vehemen-  
tissimè refrigeretur, idq; nō solū à medica-  
mēto, sed etiā à circūfusō nobis aëre. Equi-  
dem noui quosdam adeo refrigeratis pedi-  
bus, vt in primis quidē sensus, periret sequē-  
tib<sup>9</sup> verò deinde diebus emortui pedes pu-  
trescerent. Ergo vt perfecta refrigeratio, &  
sensum penitus aufert & motum, sic mode-  
rator, & sensus & motus difficultatē indu-  
cit. Nominaturq; (vt dixi) huiusmodi refri-  
geratio, stupor. Itaq; stupidum dolorē dis-  
positio efficit frigida simul & dolorifica: in-  
dicāte id nomine, non doloris (vt dixi) dif-  
ferentiā, sed dolorem simul, & frigidā dis-  
positionē, aut ab ipsa inductam particulæ,  
& sensus, & motus difficultatē. Constat au-  
tem quòd cōstrictas vehemēter particulas,  
atque eos quoq;, qui torpedinem animal,  
dū adhuc viuit, tetigerint stupor infestare  
solet. Et quibus membrū aliquod stupidū  
fuerit, ii quicq; tetigerint, obscuro, & he-  
beti sensu percipiūt, neq; moueri possunt,  
si verò moueri cogātur, dolēt. At citra hoc  
quòd moueri tentēt, affectū ipsum stupo-  
ris haud obscurè sentiunt, sed tū nequaquā  
dolēt. Proinde male Archigenes enūtiavit,  
stupidū dolorem ad nervos propriè ptine-  
re. Stupor enim dispositionis, non loci affe-  
cti



Et indicium est. Atqui paulo post rursus Archigenes propriè ipsum ad musculos pertinere ait, habet autè dictio vtraque ad hunc modum: prior quidem, Nervi autem cōtor-  
 ti, distenduntur, & indurantur, atq; hi stupidos inducunt dolores, atque dure intendentes. Deinde paulo post, in hunc sermonem prorumpit, Musculi carnis neruorūq; mixtura, tanquā propria substantia constituti, arteriarum quoq; in doloribus mixtionē prae se ferūt, istringentes (vt ita dixeris) atq; latè distēti, ac stupidè pulsantes. In horum sermonum priore neruos ait stupidos inferre dolores. In altero verò musculos stupidè pulsare: stupidum non ad affectus, sed ad partes, referēs. Sed vt dicebā: stupor nō particulæ cuiuspiam proprius affectus est, sed dispositio: quæ quidē in omnibus corporibus fieri potest, sed nō in omnibus sensibilibiter apparere, quippe in his dūtaxat apparet, quæ suos affectus sentire, & pro volū-  
 tatis imperio moueri nata sunt. Ceterū his, quæ manifestè in musculis apparent sermo ipsius repugnat: quinetiā indistinctè prolatus est, ac fortasse non intelligit, nusquā in corpore carnem ipsam per se inueniri. Nā musculi quidē in plurimis vel capitib⁹, vel extremis partibus neruosi sunt, vbi etiā tēdones inueniuntur. Id verò quod in medio  
 con

*Malè hic quoque Archige. ad musculos nō dispositionē stuporene retulit.*

*Musculorum compositio.*



*Caro.* continetur, omnes homines carnem nominant, nemine intelligēte, quū exquisitè dissectatur, non esse solā carnē, sed cū tenuissimis quibusdam veluti fibris, in quas nervosum genus resolutū est. Voco autem nervosum genus, in vnicā appellationē cogens, *Vincula.* tum vincula, tū tēdones, quippe ex iis per *Tēdones.* carnem dispersis, musculorum ostendimus essentiā consistere: quæ ut permanere posset, venis indigebat & arteriis. Ceterū circa *Arteria* *pulsant* *sine dolore.* dolorē pulsare, ad solas arterias pertinet, animali etiā dū benevalēte. Vbi verò ingēs oborta est inflammatio, vel erysipelas, vel abscessus, arteriarum pulsus cum dolore sentimus, quum antea per bonam valetudinem, neque cum dolore, neque sine dolore ipsum sentiremus. Etenim res ad hunc modū se habet. Duabus præcipuè occasionibus, vehemens dolor inflāmati partibus infertur: quum moventur, aut quum à re *Inflāma-* *tus mu-* *sculus.* quapiam comprimuntur. Inflāmato igitur omino musculo, duplici modo, dum attoluntur arteriæ, dolorē sentimus. Nā & moventur, & ab adiacente carne cōprimūtur, & ipsam comprimūt. Atq; hac ratione partes inflāmatæ pulsant, quem veterrimi quique solū vocant pulsus: Posteriores verò omnē arteriarum motum, quē sensus percipere posset, similiter nominauerunt. Sed non



non protinus stupidè pulsare, inseparabili-  
ter, aut omnino ppriè, ad musculos (affe-  
ctos) pertinet: quū ne pulsare quidem pro-  
prium eorum omnino sit: si quidem pulsus  
(vt prius dictum est) dolorē quendam insi-  
nuat. Nam in scirrhis, & œdematis, proprie  
appellatis, atq; in intēperieb<sup>9</sup>, quæ sine tu-  
more cōsistūt, motus arteriarum dolorem  
haudquaquā excitat. Ac ne per inflāmatos  
affectus quidem, nisi quū maiores affecti  
sunt, dolor infestat. Quinetiā sine muscu-  
lo, arteria ipsa per se inflāmatoriū sustinēs  
affectum, cū dolore pulsat. Dico autē in-  
flāmatoriū affectum, vt simul cū inflam-  
matiōe, & erysipelas, & abscessus intelliga-  
tur. Huiusmodi igitur affectuū, quū maio-  
res fuerint, pulsus accidens esse censetur.  
Quòd si aliqn̄ in iis pulsus, ipsi scilicet la-  
borāti, stupid<sup>9</sup> esse videatur (hic enim stu-  
poris affectū sentire potest) tum scire licet  
dispositiōē in musculi neruis cōsistere: sed  
ita cōsistere, vt ad paralysem (id est resolu-  
tiōē) tēdāt. Quippe stuporis dispositio, in-  
ter resolutionē, & integrā valetudinē me-  
dia est. At pulsus cum dolore factus, sequi-  
tur inflāmatorios affectus notatu dignos,  
idq; semper in ipsis arteriis, atque in cōti-  
nētibus ipsas partibus, quas & ob angustia  
premunt, & quum attolluntur, modo pars  
affecta

Οἱ δὲ μὲν  
enim a-  
pud Hip.  
& vete-  
res omne  
tumorem  
præter na-  
turam no-  
tat.

Inflāma-  
torius af-  
fectus.

Paralysis  
resolutio.



*Peripneumonia.* affecta sentire nata sit, veluti percutiūt. Ergo neque in peripneumonia, neq; in pleuritis. ritide dolor pulsatori<sup>9</sup> euenire potest, idq; *Pleuritis.* ob partiū naturam. Namq; pulmo sensum non habet, pleuritis verò membranę costas succingētis, morbus est: quæ vbi costis quidem vicina est, necessariò comprimitur. At *Alias ossibus.* media ipsius pars comprimi nō potest, sed inflammationis duntaxat ratione dolet. Atque in hoc spacio arteriæ sunt: quæ per intercostalia vocata spacia, & p crassas, laxasque laterū partes extēdūtur, ac in profundo magis delitescūt, & succingentē costas tunicam haudquaquā attingunt. Harum igitur arteriarū mot<sup>9</sup> in pleuritide ab egrotante, sensu non percipitur, tantum abest vt ei dolorem inferat. Nam inflāmati interdum intercostalib<sup>9</sup> musculis arteriarū eleuationē dolorem inferre necesse est. proinde laborās ipsum facile percipiet atq; pro inflammationis magnitudine, sentiet in parte inflammata pulsationem. Ob hanc quoque causam vbi vehemens fuerit pulsatio, suppuratur inflāmata particula, cōsequēte suppuratione ingentes duntaxat inflammationes. Constat igitur ex his quæ iām diximus, quòd pulsatori<sup>9</sup> siue pulsatiuus, à Medicis vocatus dolor, per inflāmatorios affectus fiat, atq; in corporib<sup>9</sup> sensibilibus: idq;

*Media pars quæ musculis intercostalib. asfidit non costis.*

*Pulsatorius dolor.*

vel



vel per se, vel propriè, vel primario affe-  
ctu in arteriis (nominet enim quilibet ut vo-  
luerit) in reliquis verò partibus sensibilibus  
omnibus, per cōsensum, eò quòd à vicino-  
rū contactu premantur. Quare neq; in he-  
pate neq; in renibus vnquā huiusmodi pul-  
satio apparet: quoniā nullus per totū cor-  
pus ipsorum neruus dispersus est, neq; etiā  
per pulmonem. Quocirca grauitas in ipsis  
10 sentitur, quum tumoris præter naturā ge-  
nus aliquod ea infestauerit. Nam in horū  
viscerū quolibet, adiacens membrana per  
quā neruus dispergitur, sensu potitur. Quia  
verò à tumore qui est in viscere, ipsa extē-  
ditur, doloris speciē appellatione dotauit.  
Proinde Hippocrates primus omnium scri- *Hippocr.*  
psit: In renem dolor grauis. Post hunc verò *libr. epid.*  
optimorum Medicorum nō pauci, nō acu- *6. par. I.*  
ti doloris, sed grauitatis sensum in prædi-  
20 ctorū viscerū inflammationib; fieri dixerūt.  
Enimverò mēbranas ut quibus nullę sunt  
arteriæ, nō pulsare rationi consentaneum  
est, quemadmodum neq; cutem, etiā si ve-  
hemens assit inflammatio: atque eadē ra-  
tione, neq; adenes, quibus nullę sunt arte-  
riæ. Etenim huiusmodi partes, quū inflam-  
mate sunt, vnico dūtaxat doloris modo ve-  
xantur, extēisionis. Quippe huiusmodi do- *Extensio-*  
loris species, à nullo sentientium corporū, *nis dolor.*

E.



*Doloris  
modi.*

in inflammatoriis dispositionibus separari potest. Reliquæ verò doloris species, quibusdam partibus accidere possunt, quibusdã non possunt. Igitur meminisse eorũ semper oportet, ac cognoscere singulorũ locorũ naturã: quinetiã intrueri, quis vnique parti modus doloris peculiariter cõueniat quis verò cõtra. Proinde resumẽtes rursus ipsos dicamus. Quippe vn' doloris modus est, qui per inæqualẽ intemperie in affecta parte cõsistit, vt nulla re ipsam extrinsecus attingente. Alius qui ob tensionem fit, non soli affectæ parti proprius, vt qui vicinas partes interdũ afficiat. Est item dolor qui à tangẽtibus dũtaxat, in affecta particula generatur, quũ videlicet vel cõpressa, vel contusa, vel à re quapiã superueniẽte vulnerata dolet. Atque is doloris modus, qui à motu procedit, quẽadmodũ paulò ante de arteria dictũ est, à re quadã media dolore efficiẽte pendet, etenim quæ per se mouetur pars: tenditur: & ad vicinas accedens comprimitur interim, & cõtunditur, & vulneratur. Si verò nulli inciderit, eã sola tẽsione, dolere necesse est. Veluti partes omnes ab aliis motæ, si nihil extrinsecus ipsas tãgat, nullo, præter eũ qui necessari' est, dolore afficiuntur. Cæterũ alibi me frequenter dixisse memini, primas doloris species



species duas esse: quum affatim temperies *Vt libr. de*  
 alteratur, atq; quum soluitur continuitas. *in aquali*  
 Quæ cū iam dictis haudquaquā pugnare *intēperie,*  
 vidētur. Nanque pars intēta, aut cōpressa, *et libro de*  
 aut contusa, aut vulnerata, dolet ob conti- *symp. 4.*  
 nuitatis solutionē. Neque enim quum acu *& libr. de*  
 quispiā vulneratur, alio affectu laborat, q̄ *victu a-*  
 si ab acri humore facta fuisset erosio, vtpo *cut. cō. 1.*  
 te per vtrūque affectū corrupta cōtinuita-  
 10 te. Igitur non eandem doloris speciē exci-  
 tant, mordax humor, & plurimus. Nam ille  
 rodendo dolorē excitat, hic verò tenden-  
 do, flatuosi spiritus exemplo ac veluti vri-  
 na vesicā intendit quū nō redditur. Verūm  
 in erysipelate, & inflammatione, atq; in to-  
 tum in affectibus inflāmatoriis, nō solūm  
 quia intentæ sunt [ob repletionē] partes la-  
 borāt, verūm etiam quia intēperie affectæ  
 sunt, ac ne hac quidē exigua, ad dolorē  
 20 inducendum, vim habente. Id quod decla-  
 rant hi, qui per vehementem hyemē profe-  
 cti, manus ad ignē affatim calefacere ten-  
 tant: intolerabilem nimirum sentiūt dolo-  
 rem, & quidē maximē in vnguium radice.  
 Porro memini, mihi ipsi accidisse dolorem  
 vehemētissimū, vt mihi viderer in intimo *Galen. 10*  
 vētre terebro pforari, in eo potissimū spa- *lica.*  
 tio, per quod à renibus ad vesicā vteretas  
 scim⁹ extēdi. Iniecto deinde rutaceo oleo,



*Vitreus  
humor.*

*Galenus  
deceptus.*

*Dolores  
colici.*

quum id paulò pòst excernere tentarē, ex-  
creui simul grauissimo cū dolore, humorē  
vitreum à Praxagora appellatū, quippe vi-  
tro fuso, tum colore, tū substātia, haud ab-  
similis erat: atq; id aliis quoq; accidere cō-  
spexi. Quòd verò hic tumor sit frigidissi-  
mus, iam à Praxagora dictū est, qui ob hoc  
vitrei nomē ipsi iposuit. Id enim haud ob-  
scurè percipitur sensu tactus tum ipsorū  
qui illū excernunt, tum aliorū si quis cōse-  
stim ipsum tāgere voluerit. Sed dignū vti-  
que admiratione est, quomodo frigid⁹ ex-  
cidere possit, neq; ab excretionis violētia  
quū excidit, calidus euadat. Equidē putabā  
lapidem in altero vreterū impactū, adeò  
erat, vt mihi videbatur, doloris ipsius spe-  
cies pforātī similis. Atqui vacuato humo-  
re, doloreq; sedato manifestè cōstabat, ne-  
que lapidē fuisse causam, neq; in vreteris,  
aut renib⁹, locū fuisse affectū, sed in intesti-  
nis potius, præcipuè verò crassiorib⁹. Neq;  
enim vt à tenui corpore, breui tēporis spa-  
tio exire poterat, sed à profundo quodā &  
quidē crassiori corpore, quàm sit tenuium  
intestinatorū tunica, ferebatur. Huiusmodi  
dolores, omnes ferè medici colicos nomi-  
nare videntur, quanquam ab ea parte qua  
dolor sentitur, nullum indicium sumi po-  
test, quòd magis colon quàm tenue intesti-  
num



num dolor afficiat. Nam huiusmodi dolores, pinde ac si terebro partes perforiētur, molestare solēt, narrātib⁹ ita infirmis. Sūt alij dolores per quos palus videtur infix⁹, qui & ipsi corpus affectum crassum motu esse significant. differunt autē inter se, aut *Differen-* multitudine, aut crassitudine, aut motu, *tia dolorū* aut rei dolorē faciētis potentiā siue ea hu *quadrifa-* mor fuerit, siue spiritus flatuosus. quippe *riam su-* paucus plurimo, & tenuis crasso, & pmanēs *mitur.* moto, minorē dolorem excitare solet. Atq; qui ad vehemētem refrigerādi vim haudquaquam accedit, vehementissimē refrigē rāte minus cruciat. Verūm hoc doloris genus, ad crassum intestinum referendū est, siue palum ibi infixum, siue terebro perforari locum quis putauerit. Atqui huiusmodi dolores, ab eo quo lapis impactus est, discerni nō possunt, nisi quis accidētia quę *20* postea cōsequuntur expectauerit. Quāuis *Lapidis re* ob huiusmodi ignorātiā, quod ad doloris *nū, & co-* mitigationem attinet, nullā laboranti no- *lice incer* xam inducamus. siquidem vtriusque do- *ta diagno* loris præsidia, omnia communia sunt, & *sis à prin-* quidem calorifica in primis, siue ea extrin *cipio.* secus adhibeantur, siue iniiciātur. Deinde nisi mitigatus dolor fuerit, eorum medicamentorum, quę dolorem obtundere possunt, aliquod adhibendū est: cuiusmodi est



*Philonis* id quod à Philone institutum est. Verùm si  
*antidotū.* lapis dolorem excitauerit, ipse interdū so-  
*Nephriti-* lus, interdū vnā cum cruore excernitur. et-  
*du nota.* enim radit ea corpora per quæ trāsit maxi-  
*Vrina* mē si vel asper, vel acutus fuerit lapis, ac si  
*cruenta.* postea vrinās inspexeris, fabulosa quēdam  
*Colica si-* subsidere inuenies. Quod si in colo affect⁹  
*gna.* constiterit, neq; lapis, neq; cruor, neq; are-  
 na, sed humor aliquis, qualis iā dictus est,  
 subsidere videtur. Atq; alia quæ ad affectū 10  
 intestinū pertinent, apparēt accidētia. Pro-  
 tinus enim inflatio quēdā, & distētio, & fla-  
 tus cōplures† præsertim postmodū, & tor-  
 mina, & excremēta flatibus plena videbū-  
 tur. Ea autē discernere licet, si super aqua  
 natent, ac bubulo stercorei similentur, quin  
 etiam cibi tum cupiditas tū cōcoctio dete-  
 rior, tum quæ præcedit morbū, tū quæ co-  
 mitatū quæque cōsequitur, propter cōsen-  
 sum ventriculi : qui simul cū ea patre quæ 20  
 primariò laborat afficitur. Insuper colicos  
 nominatos affect⁹, magna ex parte præce-  
 dit & cruditas & spirit⁹ flatuosus, & vom-  
 itus, & nausea q̄ multo tēpore inanis pma-  
 net, & ī præcordiis mordacitas, &† fastidiū  
 † ἀσθένεια & indigētia plurima. Igitur ex huiusmodi  
 quidē doloribus, ij qui vehementissimi  
 sūt, haud ab re ī crassis intestinis cōsistere  
 nontā fa- putātur: qui verò mitiores sūt, ex duobus  
 alterum



stidium cibi, quàm quod implacide & inconstanter habet,  
omnemque figuram corporum subinde variant, ut modò in  
dextrum latus, modò in sinistrum decumbant, ac protinus  
in dorsum,

alterum necessarium est: aut quòd in his ipsis aut ven-  
sunt, sed à leuiori causa: aut quòd in tenuibus trẽ iaceat  
cõsistant intestinis, sed qui mordaces sunt, quod &  
à mordaci humore intestinũ erodente, fie- gũw/xo-  
ri solent. Vnde dysenteriam semper huius- mèn inde

modi dolores præcedunt: utpote per quam & duosq;  
intestina exulcerantur, quàm vel solam, tũ gĩa v ro-  
recentiores Medici, tũ antiquorũ non pau- cant.

ci, dysenteriam nominant. Ex his nonnulli  
solum hanc, sed aliam quoque quæ cruen-  
ta, ob excretorũ speciem nominatur, dy-  
senteriam appellant. Nam interdum synce-  
rus plurimũsq; sanguis, interdum veluti li-  
mus & fæces ipsius non parua quantitatē  
excernitur. Verũ hæc affecti iccinoris acci-

dens esse censetur. Ea verò per quã synce-  
rus multũsq; sanguis excernitur, vniuersũ Sanguis à  
corpus plerũq; euacuat, haud secus quàm toto corpo  
hæmorrhoides, aut muliebri profluuiũ. Ve re.

rũ de his posthac rursus nobis agere lice Hamor-  
bit. Nunc ad dolorum species redire oport- rhoides.  
tet, eas enim in hoc libro persequi potissi- Mēstrua.

mum proposuimus. Igitur iterum incipia-  
mus ab eo dolore quem punctoriũ vocat,  
qui circa membranas potissimum cõsistit



ipsius affectus veluti radice eo loco fixa,  
 vbi mēbrana pungitur: dolore verò circa  
 locum punctum, ad magnū spatium circu-  
 latim se fundēte, atq; hoc modo in laterali  
*Dolor pū* morbo dolorē punctoriū esse, & inflamma-  
*etorius.* tione pulsatiuum, apud omnes ferè medi-  
*Pulsati-* cos in confesso est. Non tamen hæmodiæ,  
*uus dolor.* id est, dentiū stupori, simile quid dolor mē-  
*Hæmo-* branosorū corporū habet (vt Archigenes  
*dia stu-* scripsit.) haud enim ignoramus ori dunta- 10  
*por dentiū.* xat, neq; toti tamē ori, eā accidere: sed dē-  
*imilium* tes, gingiuasq; infestare solet affect⁹ qui-  
*6. cap.* dā, quē hæmodiā vocamus, hāc verò ora-  
 tione quidem enarrare impossibile est, sed  
 cū quispiā & austeros, & acidos cibos in-  
 gesserit, ita vt affectus aliquis sequatur in  
 dētibus, & gingiuis, eū in oībus eundē esse  
 credimus, siquidē videmus nos magna ex  
 parte similes esse in affectib⁹ tolerādīs, ita  
 vt ab iisdē causis, eadē sustineamus. Talē 20  
 quidē dolorē in ore duntaxat fieri scimus.  
 Sunt alia dolorum genera ab Archigene  
 † *Gracè* perscripta, quæ neque dum fiunt cognosci,  
*est ἀγνώ-* neque dum proferuntur intelligi possunt,  
*λον.* veluti holcimos (id est tractori⁹) austerus,  
*Copus vi-* dulcis, leuiter acut⁹, † *salsus viscosus, ferus,*  
*detur le-* stringens. Atque huiusmodi nomina in li-  
*gisse ἀλι-* bro de Pulsib⁹ scripta posteritati reliquit,  
*κιν.* quæ auditores nihilo doctiores reddere  
 possunt



possunt, eo q̄ doctrina quęque propria de-  
siderat nomina. Si enim de saporibus aut *Nomina*  
omninò de ppriis quę lingua iudicantur *dolorum.*  
differamus, dicemus utiq; austerū, & acer-  
bū, & stringentē, & mordacē, & falsum, &  
dulcem, & amarū. Si verò de his quę tactu  
iudicantur, humidum corpus, & aridum, &  
calidum, & frigidum, & asperū, & leue, &  
molle, & durum, & acutum, & obtusum.

- 10 Haud secus de his quę visu discernuntur,  
rubrū, flauum, nigrum, album, fuscum, aut  
aliud quidpiā huiusmodi. Quòd si appella-  
tiones ipsorum permutaueris, quid dicas  
auditorū intelliget nemo, veluti de adstring-  
gente, aut austero dolore. quippe fieri non  
potest: ut qd sit dulcis dolor, intelligatur.  
Nā dolor semper molestare laborantē so-  
let, atqui dulcia quęq; incūda sunt. Igitur  
quām verissimū est, Archigenē circa medi-  
cæ artis opera fuisse studiosum: quo pacto  
20 tamē in huiusmodi nomina inciderit, quū  
sæpenumero inuestigauerim, inuenire nō  
potui: Videamus ergo quid manifestē ex  
ipsis colligere possimus, veluti paulò antè  
de torpido labore iam fecisse videmur. Nā  
iustū est ut obscura nomina in dubio dere-  
lictā, inutilia reputētur, p̄inde ac si nūquā  
scripta fuissēt. Quę verò clara sunt, iudicē-  
tur nō ratione dūtaxat, sed multò etiā prę-



cedere experimēto, quāquam huiusmodi iudiciū p̄difficile est. nā plerunq; aliis nos credere oportet, qui suos affect<sup>9</sup> ob animi mollitiē, neq; cōsequi planē, neq; si consequatur, eos enarrare possunt: aut quia oratione quid patiātur: declarare omninō nequeunt (quippe nō parvæ facultatis ea res existimatur) aut quia affect<sup>9</sup> ipse ineffabilis est. Ergo relinquitur, q̄ nemo singulorum dolorū species cōscribere potest, nisi 10 ipsemet passus fuerit, sicq; Medicus, q̄ interpretādi aliis facultatē habeat, & q̄ prudēter, & sine mollitiē, cōprehendere possit suos affectus, dū laborat. Atqui nemo inuentus est qui p̄ totū ætatis suæ decursū, oēs affectus sustinuerit, etiāsi perquā morbosus fuerit. Proinde non possum mirari, quū eorū proprietates ab Archigene scriptas lego, ita scilicet ipso narrante, tanquā oēs passus fuisset quāquam non admodū mor- 10 bosus erat Archigenes. Si enim vnā aliquā partem, & infirmam, & morbidam habuit, nō protinus omnibus laboravit: velut nec reliquorum mortaliū vllus. Neq; eim inuenire est hominem eundem, qui simul & caput habeat infirmū, & thoracē, & pulmonem, & hepar, & lienē, & vētriculū, & intestinum ieiunū, & colum, & vesicā, atq; reliquas id gen<sup>9</sup> partes. Videtur itaq; Archi-  
genes



genes propriis quibusdam consiliis, & quidem dialecticis potius, quàm affectuū ipsorum experiētiā fulcitus, pro viribus dolorum species explicare voluisse.

*Quòd ea quæ ab Archigene dicta sunt, aliqua verè, & absolutè, & clarè: alia omnino obscurè, imperfectè, indistinctè, & falsò dicta sunt.*

## CAPVT II.

10 **V**Erùm vt studiosi maiori à nobis copia dotati recedāt, proposita eius oratione, eos qui in arte exercitātur, moneo & hortor, vt quæ planè vera sunt, ea duntaxat eligant, ipsisq; credant: quæ verò ab iis abhorrere videbuntur, ea præteriri oportet. Igitur Archigenes quū reprehēdisset Asclepiadem dicentem in articulari morbo nervum affectum, dolore haudquaquam cruciari, quod nihil omnino sentiat: carnē autem, quanquam nō affectam, dolere tamē, vtpote à parte vicina compressam. Postea ad verbum ita scribit: Porro vasa vehemēter compressa, capitis dolores, sine inflammatione obortos arcēt, veluti prohibita in ipsa incurfione, id quod barbaricum vinculum tum maximè perficere potest. Sphacelodes verò altera capitis parte dolores dissectio eorum, sed maximè arteriæ circumscribit. Quæ primò affecta, pullatorium

pene

*Archigenes.*

*Βαγβαγινὸς δια-  
λεξιπὸς.*

*Nā in remediis cephalalgias vincula sunt inducta fronti & tēporibus.*



†καθελ-  
κοντες.

penetrantemq; dolorem inducit, ac rotūda-  
 euadit, horrorē planē excitās, quēadmodū-  
 venę quēdā in varices degenerāt. Nerui ve-  
 rō intorti distendūtur, ac indurantur, atq;  
 hi torpentes inferūt dolores, dura distētio-  
 ne cruciātes, & profundos, & infixos, & an-  
 gustiā plenos, & minimē fufos. Membranę  
 in latum discurrētes, & inæquales dolores  
 excitant, atq; crebro ita laborant, vt hēmo-  
 diā, (id est dentium stupori) simile quidpiā<sup>10</sup>  
 habeant, trāsmissionis videlicet asperitatē.  
 Ita superficies quoq; & membranę in me-  
 dia carne contentę, quę dilaniantes quoq;  
 dolores inferunt. Dolores verō à membra-  
 nis ossa circundantibus depēdentes, perin-  
 de affigere compēriuntur, ac si in ossibus  
 ipsis confisterēt: A venis, graues & descen-  
 dentes, & æqualiter infixi dolores suscitā-  
 tur. A carne autem, & fusi & laxiores, qua-  
 propter non adeò extendi videntur, sed ar-<sup>20</sup>  
 bitratur laborans sensum asperis quibusdā  
 rebus impleri. Musculi carnis neruorumq;  
 mixtura tanquam propria substantia cōsti-  
 tuti, arteriarum quoq; in doloribus mixtio-  
 nem præ se ferunt, stringentes (vt ita dixe-  
 ris) & cū capaci latitudine intenti & torpi-  
 dē salientes. Ex reliquis verō vlcerofus qui-  
 dam dolor, & in vlceribus leuiter acutus,  
 & maximē dulcis, & qui pruriginem indu-  
 cere



,, cere potest, ad superficiē pertinere videtur.  
 ,, Punctorius autē profundas partes infestat:  
 ,, infixus aut, cum sinus accesserit. Stimulans  
 ,, autem, partim eorum quæ in loco sunt, ali-  
 ,, quid affectū esse declarat, partim cōtra, ut  
 ,, pote qui haudquaquā profundas partes oc-  
 ,, cupat. Lacerās autē est, qui in sinu cōsistit.

Hic est primus Archigenis sermo ex libro  
 primo de Locis affectis, quo docere cona-  
 tur quomodo ex dolorū differentiis partes  
 affectę possint inueniri. Igitur rursus ab ini-  
 tio ipsum examinemus, nō obiter & trāscur-  
 sim. Sphacelodes (inquit) hemicranias, va-  
 sorū dissectio intercipit. Igitur quos dolo-  
 res nominet sphacelodes, inuentu difficile  
 est. nō enim inter omnes cōuenit, quid hec  
 vox (sphacelos) significet. Sunt enim qui di-  
 cūt ipsam vehementē dolorē declarare, alij  
 tantū inflāmationis excessum: ut partē ad

10 corruptionis periculū inducat, quæ disposi-  
 tio à nōnullis gāgreña appellatur. Alij par-  
 tis affectę corruptionem ipsam, sphacelon  
 dici volunt, Alij conuulsionē, Nōnulli non  
 eam, quæ fit conuulsionem, sed quæ ex in-  
 flāmationis magnitudine expectatur, Alij  
 non simpliciter cōuulsionem, sed neruoso-  
 rum corporum quæ inflammatione labo-  
 rant, Alij simpliciter fortem rētionem, alij  
 putredinē. Ergo vocabulum sphacelodes,

in

*Sphacelos  
 vide Gal.  
 libro 7.  
 aph. 51.*

*Gangre-  
 na.*



*Circūscribere.*

*Pulsati-  
vus dolor.*

*Dolor per-  
tendens.*

in iam proposita Archigenis oratione scriptum, ad tantā peruenit obscuritatē, vt nihil per ipsum explicari posse videatur, ipso nusquā in aliis libris Medicorū nominū enarrationem conscribente. Per verbū autem circūscribit, fortasse intelliget quispiā ab eo, veluti celeriter & ex toto sanari: ac subiiciamus vt ita dicatur. Nā quid facere poterit is, qui intelligere cupit ea, quę ne is quidē qui scripsit, intelligi voluit? Deinde 10  
pulsatorium, & turgidū dolorem, arterias inferre dicit, cū ipsę videlicet per sphacelodes altera capitis parte dolores primogenia affectione laborāt. In primis itaq; qualis sit pulsatorius dolor enarrare tētemus, quamuis ante nostrā enarrationem, omnibus medicis notus sit: siquidem ingentium inflammationū accidens ipsum esse perhibent. Pertendens autē dolor est, qui à parte primario affecta, veluti à radice incipiēs 20  
celeriter in partes adiacentes trāsferitur. Id verò non solū in hemicrania vehemētissima, vt Archigeni placuit, sed in cephalca quoq; vocata, euenire solet. Etenim in hac nonnunquam arteriæ primario affectæ huiusmodi (qualem dixit Archigenes) dolore vexantur. Ita vt fateantur nonnulli, vasorum ipsorum se dolorem sentire, id interpretari tentans, arteriam subhorrentem, fieri



fieri notundā dixit. Igitur inquirendū est, vtrū veluti per sphacelodes hemicranias, arterias ita affici dicit, ad eūdē modū de venis eum sensisse existimandū sit, quòd per hunc solum morbum, varicum exēplo obtortæ sint, an commune sit accidēs venarū, vel quomodolibet affectarū, vel duntaxat inflammatarum. Ex eo enim quòd sermoni de venis, iungit sermonē de arteriis: par-  
to est, vt coniiciamus, de eodē affectu ipsum fuisse loquutū. Ex eo autem quod mox in vniuersum de neruis, atq; de aliis huiusmodi partibus scribit, non adaptans vni morbo sermonem, eadem ratione putandum est, itidem de venis quoque fuisse dictum. Itaque in hac ambiguitate satius fuerit, vt existimemus in eo sermone quem de hemicrania cōscripsit, simul cum arteriis, ipsum venarum quoque mentionem fecisse, simpliciter verò reliquorum instrumentorum sine vllō distincto affectu, neque in neruis, neq; in iis partibus, quæ illos deinceps consequuntur, in quibus dixit venas graues, ac detrahentes, atque æqualiter informatos dolores inferre. Verūm hæ nonnihil ambiguitatis continent. Quòd verò deinceps sequitur, vbi dicit: Nerui verò distēdūtur, & manifestè cōtorti indurātur, recedit enim ab hemicranica dispositione, definiens id,  
in



in vniuersum ad nervos quomodolibet affectos pertinere, quod planè mendaciū est. Neq; enim quilibet nervorū affectus, ipsorum essentiā indurat, atq; intorquet. Sunt enim nōnulli, per quos laxiores euadūt nervi quemadmodū per atrophīā manifestē. Quinetiā sēpenumero nullam sensu perceptibilē habent differentiā, ita vt exquisitē sani videantur, nihilominus neq; sensum neque motū præstāt subiectis corporibus. 10 Itaq; in solis fortasse inflāmationibus, aut inflammatoriis morbis, aut præter naturā tumorib<sup>9</sup>, dixit nervos & indurari, & intorqueri, quandoquidē in iis quidē manifestē apparet nervos intēdi. Nā & laborantibus ipsis & nobis aspiciētib<sup>9</sup>, intēti nerui apparent: quapropter nisi curentur, & cōuulsiones & distensiones ad ipsos sequūtur. Atq; omnium quæ in tumore attolluntur, commune accidens esse videtur vt intēdantur. 20 Nā & arterias, & venas, inflāmatione affectas manifestē intēdi vidimus: venas quidem, vbi per summa membra orta inflāmatione, bubon exurgit. Plerunq; etiā totum vas intentū videtur, ac ruber magis, & calere, atq; maiori dolore (si tangatur) affectum, vt sit manifestum totum inflāmari, incipiēdo ab ea parte quæ primario affecta est, vsq; ad alas, & inguina. Proinde recte dixit:

*Tensio cō-  
mune sym-  
ptoma eo-  
rum quæ  
extume-  
scunt.*



dixerunt omnes ferè medici, inflammatis partibus accidit vt rubescant, tendantur, remittantur, intumescât, & doleant. Verû (vt diximus) non omnibus, sed his dūtaxat accidit pulsus, quæ arterias habent notatu dignas, & partē sensu præditā, aut vbi ad notabilem magnitudinem inflāmatio attollitur: tunc enim pulsatoriū dolorem sentiūt laborātes, vel nullo existente sensibili vase

10 in affecto corpore. Sed interrogabis me fortasse, quæ sint singulorū instrumētorum propria accidentia? Id verò iam antea neq; semel dūtaxat explicatū est, quòd videlicet propriæ actionis noxa, qualicunq; sit specie, cuiuslibet partis proprium est accidēs, Neq; enim aliud eis ex necessitate accidēs, neq; etiā noxarū differentiæ existunt. Nam differentiæ quidē variāt, pro affectus, tum specie, tū magnitudine: Accidentis verò ad

20 vitiatā actionē pertinentis, siue genus, siue species, aut vtcūq; nominare volueris semper permanet. Ceterū satius fuisset Archigenē, qui omnia, via & ratione se explicaturum professus erat, abūdātius hæc persequi, præsertim cū ab aliis negligētius essent tradita: quorū non pauca, in plurimis aliis libris conscripsimus, quēadmodum & post hac deinceps dicētur: sed breuiori quidem compendio, ea quæ exactè alibi fuerunt

*Inflāma-  
tionis ac-  
cidentia.*

F



exarata: lōgiori verò disputatione hīc tra-  
 ctabuntur ea, quæ alibi breuiori stylo per-  
 currimus. Nunc verò reliquas dolorū dif-  
 ferentias, quarum in præscripto sermone  
 Archigenes mentionē fecit, persequamur.  
 Quod enim peccauerit, dicens torpidos do-  
 lores nervis euenire, quodque stupor non  
 vnius cuiuspiā partis sit affectus, sed causæ  
 potius, ac dispositionis rationem habeat,  
 iam antea dictum est. Quod verò dolores <sup>10</sup>  
 durè distendētes in ipsis fieri dicit, rectè di-  
 ctum est: quanquā melius erat, si simplici-  
 ter dixisset, distendentes nō addendo durè.  
 Nam nervorum dolores, vtrinq; vehemen-  
 ter distēdere possunt: quia ad vtrāq; extre-  
 ma tenduntur, tum id à quo incipiunt, tum  
 illud in quod finiūtur. Nō secus quā chor-  
 dæ in cithara quæ sæpenumero, vbi nimis  
 intenduntur, disrūpi solēt. Quapropter ci-  
 tharistæ, quum instrumenta sua post vsum <sup>20</sup>  
 reponere voluerint, chordas relaxāt. Nam  
 planè constat eas à cōtrariis, tū causis, tum  
 dispositionibus intēdi, siue humidus fuerit  
 ambiens aēr, vt rigare ipsas & implere pos-  
 sit, siue vehementer aridus: ab vtrāq; enim  
 ambientis aëris temperie, ad vltimā tensio-  
 nem perueniunt, vnde nō mirum, si rumpā-  
 tur. Proinde rectè dixit Hippocrates neruo  
 rum conuulsiones & à plenitudine & ab  
 in

*Nervorū  
distentio.*

*Hippoc.  
libro 6. a-  
phor. 39.*



inanitione euenire vtpote per quas nerui  
 immodicè scilicet tenduntur. Sed q̄ profun-  
 dos dixit esse dolores, id ab accidentibus,  
 quę plurimis ex neruis eueniunt, sumptū est. *Dolor pro-*  
 Etenim quum venę quidem semper prio- *fundus.*  
 res in superficie sint, deinde post eas arte-  
 rię, quibus postea nerui subduntur, idcirco  
 laborātes tensionē in imo sentiunt: quāquā *Ordo ve-*  
 multi tendones ( qui ob id, quod neruosa *forum.*  
 sunt corpora, à nōnullis plane nerui nomi-  
 nātur) non profundos, sed in superficie do-  
 lores habent, si quando ipsos quoq; sic in-  
 tendi contigerit, vt sunt illi qui digitos ex-  
 tendunt: sunt autem & qui illos incuruant  
 in superficie quidē, sed non similiter vt ex-  
 tendentes. Porro Archigenes neruorū do-  
 lores infixos esse dicit, quū huiusmodi do- *Dolor in-*  
 loris species, vt antea diximus, ad colō ma *fibulatus*  
 gis pertineat. Atq; accidit etiam auri, cum *Archige.*  
 quadam pulsatione, atq; dentibus molari-  
 bus, quinetiā oculis, sed infixus dolor ner-  
 uis minime euenire potest: etenim magna  
 ex parte vtroque extenduntur, & ad super-  
 nas, & inferiores animantis partes. Quod  
 verò deinceps ab Archigene dictū est, ner-  
 uos, angustię plenoshabere dolores, inepte *Dolor an-*  
 quidem dictum est. Nam nihil amplius de *gustie*  
 elarat, quā quum dicit & minimè fusos: *plenus.*  
 re vera enim minime fusos idē est, quod in



*Dolor cir-  
ca mem-  
branas.*

latitudine porrectos dolores nervi non habent, sed magis quodāmodo circūscriptos, utpote perueniēte ipsorum tensione, & ad supernas, & ad inferiores partes, magis verò sursum vsq; ad caput. Ac tū primū ipsos vniuersi corporis, & conuulsiones, & distē-  
tiones comitantur, nulla nervi tentione huiusmodi accidentiū aliquod inducere potēte, antea quā caput ipsum attingat. Post hæc cōsequēter scripsit Archigenes de mē- 10  
branis, quod in latitudinē perueniant ipsis dolores quum afficiūtur, quod quidē verū esse fatemur: quòd verò aliquid hæmodiæ (id est dentium stupori) simile habeāt, non est verum, ut antea dictum est. Neq; etiam in totum verum est, quòd membranarū dolores sint inæquales: siquidem contrarium magis veritati cōsonat: quippe ex propria ratione, vidētur æquales inducere dolores eo quòd vniuersum ipsarū corpus, æquale 20  
est. Nam q̄ ob communicationem cum vicinis, inæqualitatem quandam afferunt, id interdū per accidens euenire solet. Quum enim ad affectam ipsarū partem, circuniacentes & ducuntur & tendūtur, dissimilem fieri dolorem necesse est. Vbi enim intenta particula acutiori sensu est, ibi dolore vehementiore cruciātur. Vbi verò sensum habet hebetiorē, ibi minus dolēt. Atq; ex eo quoque



que quòd quæ tēditur mēbrana, os ipsum  
 vel attingit, vel nō attingit, nō ab re dolo-  
 rum differētia deprehēditur. Atque hac ra-  
 tione nonnulli pleuriticorū, iugulum do-  
 lent, porrecta in hūc locum membrana co-  
 stas succingente. Aliquando tamen non ad  
 iugulū, sed ad præcordia dolor trāsfit, perce-  
 pto ipsius sensu in septo trāsverso, (vtpote  
 quod necessariò mouetur, quum pleuritici  
 respirant) magis, quàm in cæteris thoracis  
 partibus. Quū enim veluti radix doloris in  
 latere cōsistit, tum laborātes, musculis qui  
 illic sunt, respirare pigritāt: quare tum soli  
 septo transverso, natura respirationis offi-  
 ciū cōmittit: quemadmodū in bene valen-  
 tibus, qui libera vtuntur respiratione, con-  
 ringere solet. Igitur quū in partibus laterū  
 infernis, oritur inflammatio, septum trans-  
 uersum intentum, magis dolet: quum verò  
 in partibus supernis, tum iugulum potius  
 dolor infestat. Cæterum septum transuer-  
 sum, quia mouetur: iugulum autē quia du-  
 rum est, dolorē efficit. Vbi verò ingens in  
 hepate oritur inflammatio, aut vbi ipsum  
 induratum est, dolor qui tum iugulum in  
 dextra parte infestat, concauæ venę magis,  
 quàm membranarum tentionem sequitur.  
 Quum autē dixit, hoc modo sæpenumero  
 superficiem quoque separatim dolere, pla-

*Pleuriti-  
tici.*

*Videtur  
hac etiam  
Gal. sen-  
sentia.*

F 1



Quum autem dixit hoc modo sæpenumero superficiem quoque separatim dolere, vt in superficie qualitas atque proprietas doloris membranarum referatur, apertè ostendit vnde commotus dixerit, membranas habere dolorem similem hæmodiæ

*Fallitur* nè declarat id esse, quū membranæ affectū  
*Archigenes* quempiam habent. Vnde Archigenes dixit  
*nes qui e-* ipsas dolores habere hæmodiæ nō dissimi-  
*pidermi-* les. Quia enim simul cū hæmodiæ proprie-  
*dis &* tate, stuporis etiam sensus percipitur, perin-  
*generis* de ac si ab eadē causa vterq; affectus fiat:  
*mēbrana-* membrana aut quæ in superficie cutis, sub-  
*rum quæ* strata est, sæpenumero stupēti dolore affici-  
*musculis* tur, vtpote qui ab externis causis, & quidē  
*intertext-* frigidis, celerius noxā subit. Idcirco dece-  
*ta sunt eā* ptus Archigenes dispositionis cōmunitate  
*dem pro-* cæteras mēbranas hæmodiæ simile quid-  
*prietatem* piā habere dixit, ac sæpenumero superficiē  
*doloris &* quoque, non secundum affectæ particulæ  
*qualitatē* essentiā facto dolore sed ob membranarū<sup>20</sup>  
*faciat.* ipsarū essentiā, quæ exāguis est, & frigida,  
 quapropter facilè à frigidis affectibus infe-  
 stantur. Quia verò affectū ipsum huiusmo-  
 di dolores comittātur, idcirco sæpenume-  
 ro dixit fieri huiusmodi dolores, nō veluti  
 per affectæ particulæ essentiā. sic enim inse-  
 parabiles essent, sed per accidēs superueniē-  
 tes. Substrata igitur cuti mēbrana, quæ cū  
 ipsa simul excoriatur, dolores facit tēsius  
 &



& torpidos: mēbranæ verò quæ in media sunt carne, veluti diuellentes dolores excitant, sunt enim plurimæ & inæquabiliter insitæ, atq; eam circundantes. Quūque aliquando ex contrariis secundum naturā tendi carnē contigerit, huiusmodi dolores euenire necesse est. Sanè à multis exercitationibus, aut tēsiui, aut vlcerosi, pueniūt dolores, qui totos musculos occupare consueverunt, inter quorum partes, carnes quoq; numerantur. Verū de huiusmodi doloribus satis in Salubrib<sup>9</sup> præceptis iam dictū est. Sed quod mēbranarū quæ ossibus adiacēt dolores, & profundi sunt (id est in intimo corpore sensum excitātes) & ossium ipsorum, veluti dolentium, inducūt imaginem, haudquaquā mirandum est. Nam ij à quā plurimis ostocopi (id est ossium labores) nominātur, & magna ex parte ab exercitationibus euenire solēt. quamuis interdū vel à frigore, vel à plenitudine, fieri possint. Insuper venas dixit graues, & detrahētes, & æquabiliter infarētos īferre dolores. Verū ab initio, vbi hemicranie mētionē fecit, venas veluti varices īcuruari ait. Ergo in hoc solo fortasse accipere oportet, ipsum hoc dicere. Atqui scire licet, p̄priū arteriæ venæq; dolorem, extensi secundū longitudinem corporis, veluti chordæ cuiusdam

*Membrarū ossibus adiacētū dolores.*  
*Ostocopi.*

*Vide Aetium lib. 4. ca. 39. Gal. 3. de san. tu.*



*Dolor laxus.*

*Dolor carni.*

*Musculorum compositio.*

speciem referre, nullavtiq; gravitate simul apparēte. Aequabiliter autem infigi venarum dolores, admodū obscurum est: quippe infigi, ad nihil quod ip̄is accedere solet, referri potest. Deinde de carnib<sup>9</sup> dicit, q̄ & fusos, & laxiores inducāt dolores. Atqui in totum nullus dolor laxus est, nisi eos fortasse, qui minus intēduntur, laxiores vocitet: quoniā & vasorū, & membranarū dolores, magis intēdi videantur. Id enim confitetur, eos non adeo extētos conspici, ob hoc quōd carneæ musculorū partes, brevibus lineamentis continentur. Sed id quod deinceps scribit, videri tactū, veluti asperitatibus quibusdā plenū, an propriē ad dolores, qui in carnibus consistunt, pertineat, inquirendum est. Nam quōd interdum aliquid huiusmodi p̄ ipsarū dolores eveniat, à veritate haudquaquā abhorret. At quia nō semp̄ evenit, sed facta ab ipsis vt plurimū, certa quadā dispositione, nō ppriē ad substantiam earum referendū neque simpliciter intelligendū est, eam dispositionē esse affectū inflammatorium, sed qui cum humore fit, exasperare suapte natura potēte. Porro deinceps de musculis scribēs Archigenes, eos carnis nervorūq; mixtā proprietatem referre dicit, tanquam peculiari ipsorum essentia ex his cōsistēte. Addit verò



rō arterias, quoniā in ipsis inueniūtur. At-  
 qui hoc pacto, venas quoq; dicere debuit,  
 atq; membranas. Vocabulū autē † astringē-  
 gētes, patrio sermone de his dicitur, q̄ quā  
 quam pleni sunt, à bono tamen habitu nō  
 aberrant, atque idcirco de iunioribus dun-  
 taxat dici consuevit: de senibus verò mini-  
 mē, quòd nō possit ipsorū corpus, boni ha-  
 bitus plenitudinem suscipere. At verò in  
 10 quam rem hoc vocabulum Archigenes re-  
 ferre velit, inuenire non est facile, maxime  
 quia cōfundere, & corrūpere solet patriorū  
 nominū significata. Quòd si astringentes,  
 de iis dici intellexeris partibus, quæ à ple-  
 nitudine intēdūtur: non propriè ad muscu-  
 los, sed cōmuniter ad omnia repleta corpo-  
 ra pertinebit. Quū verò eos capaci cū spa-  
 cio extēdi dixit, puto ipsum hanc à neruo-  
 20 rum plenitudine voluisse sciungere. Torpi-  
 dē autē pulsare, haudquaquā fuisse recte  
 dictū, iam antea declaratum est. Reliquo-  
 rum verò dolorū, vlcerosus, inquit, leuiter  
 acutus est. Est autē hæc quoque oratio ob-  
 scura, neque per se quicquā docere potest,  
 haud aliter quā cæterę ipsius obscurę o-  
 rationes, quas ne enarrare quidē possibile  
 est: nisi quis rem ipsam per se intelligens,  
 eam orationi adaptare conetur. Quū ita-  
 que sciueris, tū medicos, tum gymnastas,

† Σφύγ-  
 γῶντες,  
 non σφί-  
 γοντες, ver-  
 bum di-  
 ctum de  
 robusto ha-  
 bitu, vi-  
 gore &  
 feruore a-  
 tatis.

Torpidē  
 pulsare.  
 Vlcerosus  
 dolor.



*Dolor le-  
uiter acu-  
tus.*

*Dolor  
dulcis.*

*Prurigo.*

*Prurigi-  
nosus do-  
lor.*

cos dolores vocare vlcerosos, per quos in-  
ter mouendum: vel tangendum, lassatis par-  
tibus sensus excitatur, qualis in vlceratis  
partibus percipi solet, facile intelliges per  
dolorē leuiter acutū, huiusmodi quāpiam  
speciē significari, qualis ab acutæ acus pun-  
ctura fieri cōsueuit. Ergo cōstat ipsum, ne-  
que cōtinuū esse, neq; equaliter per omnes  
partes porrectum. Hunc itaque dulciorem  
esse dicit, quum dicere deberet imbecillio-  
rem, aut obtusio-rem, aut non vehementem  
aut minus molestū, aut id gen<sup>o</sup> aliud quid-  
piam. Nihil enim quod molestum est, pro-  
priē dulcius appellari potest. Id autē quod  
dicit, & pruriginem inducere potest, inarti-  
culatē dictum est: quippe haud obscura est  
inter pruriginis sensum, & vlcerosam dispo-  
sitionē differentia. Verū quia crebro pru-  
riginosa dispositio vlcerosam antecedit,  
atq; soluta quiescenteq; vlcerosa, in pruri-  
ginosam transmutatio fieri solet: inde est  
quod de ipsis cōfusa, indefiniteq; Archige-  
nes scripsit: quemadmodum neque causas  
harum dispositionum exactē tractauit. Ve-  
rū nos eas in libris Salubrium præcepto-  
rum perfectē exarauimus. Igitur vlcerosus  
dolor, nō solū ad cutem, sed ad imas quo-  
que partes, vt ossa extēditur. Pruriginosus  
autem, reuera ad solā superficiē pertinet,  
non

10

20



non tamē primario, pro ratione ipsius propria, sed per accidens: eo quod densior subiectis sibi partibus, cutis est. Horū ergo dolorum vterq; propriæ dispositionis est accidens: fiunt autem ob acres quosdā humores, atq; tātum ipsi, quantum dispositiones ipsæ inter sese differūt. Sed vt dixi, satis de ipsis in libro Salubriū praeceptorū definitum est. Punctorius verò (inquit) dolor, in profundo est: sed non rectè, nam ad membranas, nō ad imas partes ppriè pertinet. † Infixus autem (vt inquit) quum sinus accesserit. Hic sermo † nō omnino absurdus esse videtur, quippe sinus, concauitas quædam est, quum partium antea coniunctarū altera distat ab altera. Quū itaq; fluxione impletur, ita vt adiacētes partes distendātur, tum tensiū dolorem sentiunt laborantes, non quidem secundum longitudinē latius exporrectū, sed propriis limitibus conscriptū. At excreto quomodolibet è sinu humore, p̄tinus dolor cōquiescit, nisi ambientia sinum corpora, adeo distendantur dilatenturq; vt inflāmatoria dispositione torqueātur. Hæc sunt quæ ppriè ad sinus pertinet. Quod verò ab Archigene dictum est, aliud ab his est. verū quid intellexerit, quū ita scriberet, haud facile inueniri potest. At quod deinceps scriptum est, non minorem

ha

*Punctorius dolor.*

*† Infixus -  
dolor meta-  
phora for-  
tasse sum-  
pta ab ijs  
qui in re  
aliquam  
oculos fi-  
xos conti-  
nent.*

*† Deletur  
negatio in  
quibusdā  
codicibus.*



*Stimulās  
dolor.*

*Lacerans  
dolor.*

habet dubitationē. Nam stimulās (inquit) dolor nō in imo subsistit. Hic enim sermo, cum eo quē in initio præmisit, pugnare videtur, quo in hunc modum scripsit: Stimulans autem, partim eorū quæ in loco sunt, quidpiā affectum esse declarat, partim cōtra. Id enim fieri potest, secundū profundū in parte ossibus maxime vicina, & in cute, atq; omnino in medio, huiusmodi dolore facto ab humore mordaci, sensibiliū ptiū 10  
aliquā erodente. Deinde quod in fine eiusdem orationis sic scriptū est: Lacerās autē “ est, qui in sinibus cōsistit, si lacerans quidē “ idē significat, quod diuellens, mendacium “ est. Nam illi qui in sinu est, id minimē con- “ ringere solet. Quōd si non hoc, sed aliud quidpiā dicere voluerit, quomodo id poterit inueniri? Atq; huiusmodi sunt quæ in præscripto sermone Archigenes posteris memorię p̄didit. Igitur trāseamus ad aliū, 20  
qui & ipse ex dolorum differentia, affectas partes cognoscere docet. Est ipsius dictio huiusmodi, Hepatis verò dolor holcimos “ (id est tractorius) & inhærēs & torpid⁹ est, “ atq; atrocius molestans. Splenis autē acutus nō est, sed & grauitatē simul, & extensionem habet: atq; similis videtur ei, qui ad “ elisionem quidem atq; expressionē, sed ex “ trinsecus incumbentem, renititur. Renes & “  
auste



„ austeros dolores inducūt, & cū permanen-  
 „ te astrictione pungentes. Vesica vehemen-  
 „ ter stringētibus vtitur doloribus, atq; ten-  
 „ sionibus pūctoriis. Vterus autē acutis, per-  
 „ tendētibus, pungentibus, distendentibus,  
 „ torminatim incidētibus: quippe qui huius-  
 „ modi mixtione dolere natus est, quāobré  
 „ idiomatis quoq; ambiguitatem inducit. In  
 hoc sermone iterum Archigenes protinus  
 ab initio hepatis, dolorē holcimon (id est  
 tractorium) esse dicit. Verū hoc vocabu-  
 lum holcimos, apud Græcos in vsu nō est:  
 proinde quid significet haud facile inue-  
 nire est. Nā vocabulorū significationes ex  
 longo vsu deprehēdūtur. Atqui video eos,  
 qui illo vtitur, viscidum per ipsum velle si-  
 gnificare, quale viscum esse videtur, vt cu-  
 ius vna parte tracta, potest per ipsam reli-  
 qua illi continua simul attrahi. Sic pasta  
 20 quoq; ex frumēto holcima dicitur, maxi-  
 mē si accuratissimē subacta fuerit, sed ex  
 hordeis, aut milio pasta holcima non dice-  
 tur. Atqui sub hac significatiōe, hepatis do-  
 lor haudquaquā holcimos euadet: proinde  
 aliā significationē quærere oportet. Itaq;  
 vnus ex his q̄ Archigenis sectā reliq; præ-  
 ponere conātur, holcimon hepatis dolorē  
 dici asserit, quum hepar vel induratum, vel  
 inflammatum, detrahare iugulum videtur.

Alius

*Austerus  
dolor.*

*Stringens  
dolor.*

*Vteri do-  
lores.*

*Holci-  
mos.*

*Viscidū.*



*Dolor in-  
hærens.*

*Hepatis  
dolor.*

Alius quā diuturno morbo laborat. Alius quā mediocri dolore afficitur. Sunt qui tardū ipsum significare velint, vtpote qui acuto aduersetur. Atq; vrgētem & adeò vehementem, vt nullam admittat requiē, hunc acutum cum vocare solitum: contrariū verò, nempe tardum, holcimon dixisse autumant. Nonnulli eum dolorē, holcimon vel grauem dicūt, qui grauitatis speciē refert: vsu enim receptum putant, vt de grauitate holce tractus dicatur. Multa insuper alia variē explicāt, admirādi illi quidē enarratores, sed quæ intelligātur à nemine. Constat igitur hoc vocabulū holcimos, quod in propositæ orationis initio inuenitur, nihil nos posse docere. At verò deinceps cōsideremus, quid vtiq; sit dolor inhærens. Nam hunc quoq; hepatis propriū esse dixit. Mihi quidē facile persuasum est penetrāti dolori, inhærentem per contrarietatem oppositi, ipsum dicere voluisse. Quid enim aliud cōiicere quis posset? Etenim hepatis dolor, si quispiam alitus, vicina corpora ad cōsensum inducit. Nam & ad iugulum vsq; porrigitur, & spirandi difficultatē creberrimē affert: atq; interdum tussim quoque ac dysenteria, neque rarò notas costas infestat. Igitur quonā pacto verē dicetur eodem in loco pmanere? At fortasse satius fuerit putare



tare, quòd inhærentem dolorẽ dixerit, veluti infixum. Atqui hepatis dolor, vt nuper ostẽdimus, haudquaquã huiusmodi est. Similiter antea iam declaratum est, ne torpidũ quidem dolorẽ particulæ cuiusquam propriũ esse. Nam ad dispositionem potius referendus est: hæc autem nõ iecinore, sed in nervosis potius corporib<sup>9</sup> inuenitur. Porro atrociter molestans, cũ torpido pugnat, vtpote qui violẽtus est, atq; continuus. Sed nec huiusmodi quidẽ hepatis dolor est sed potius grauis. At ne grauis quidem exactẽ proprius hepati est, sed spleni quoq;, ac renibus inflammatis cõmunis. Equidem nõ satis mirari possum, quo pacto Archigenes ad lienem duntaxat, hanc doloris speciem referre tentauerit. Nã vel Hippocratẽ audire debuit dicentẽ: Et in renem dolor grauis. Verũ hoc peccatũ exiguũ fortẽ censetur. At longe maximum est illud quod committere solet, nomina scribens cæteris sensibus peculiaria, quemadmodũ nunc de renibus quidẽ, austeros scribit dolores, de vesica verò, astringentes. Hæc enim saporum sunt nomina, qui lingua vt instrumento, & gustadi sensu dignoscũtur. Igitur res quædam declaratur, generatim quidẽ per hoc vocabulum stringens, sed magis particulatim per austerum, & acerbũ: quippe ambo

*Dolor torpidus.*

*Dolor atrox.*

*Dolor grauis.*

*Hippoc. lib. Epid.*

*6. part. 1.*

*Sapor austerus, sa-*

*por astringens.*

*Austerũ.*

*Acerbum.*



*Dolorum  
qualita-  
tes simpli-  
ces expli-  
cari non  
possunt.*

*Gustus  
proprietas  
ineffabi-  
lis.*

ambo astringunt, sed magis acerbū, qualis est omphacia vocata galla. Porro austera sunt multa, ut mali punici genera, atq; cotonea mala, ac reliqua cōplura esui apta. Sanē acerbā haudquaquā sunt iucunda, nō solum ea quę medicamentorū speciem referūt, veluti hypocistis, & balaustiū, & galla, & rhus, sed etiā illa quę quū sint huiusmodi, recipiuntur tamen in cibos. Quapropter non excogitari quidē potest, quid vel austerū, vel acerbū dolorem dicere voluerit Archigenes, nō magis quā aut cæruleum, aut rubrū, aut fuscū, aut alium aliquem, à coloribus nominatū. Nunc autem quid dixerit doctor quidam ex Archigenis familia, tempus est cōsiderare. Nam dolorum proprietates Archigenē arrogātia motū interpretari voluisse censeret, at quia reuera ineffabiles sunt eū in huiusmodi nomina absurda incidisse, nō intelligēs vnāquāque qualitatū, siue gustabilē, siue tangibilē effari posse. Vbi verō multæ qualitates circa vnā essentiā apparent, ibi & proprietatē fieri contingit, idq; maxime in gustu videre est, cum verbi gratia & amaritudinē, & dulcorē, & austeritatem, & acrimoniam, in vna essentia apparere contigerit. Sic enim in gustu proprietas quædam oritur, ineffabilis illa qdē, si vnico nomine ipsam explicare



care tētaueris: sed quæ dici tamē potest, si per singulas qualitates discurras, eo addito, q̄ & magis & min⁹ declarare haud impossibile est. Ita & herbas vniuersas, & reliquā quoq; materiā, enarrauerunt medicorum nō pauci: singulas qualitates, quæ enūtiatis reb⁹ insunt, explicātes. Ergo Archigenes, si vniuersam essentiaē proprietatē, vnico nomine cōprehendere voluerit, indoctus oīnō fuisset, id quod de Archigene nequaquam sentiendū est. Si autē simplices qualitates, ipsæ quidē ineffabiles nō sunt, earum verò quantitas, exacta quidē mensura, ineffabilis est: quanquā sub latitudine quadā explicari pōt. Igitur lōgiōri sermone vti non oportet, quum ea species ob oculos omnibus sit posita, qua vti debet is, qui quālibet rerū sensibiliū interpretari aggreditur: quippe omniū tangibiliū qualitātū, propria habemus noīa, haud secus quā gustabiliū, visibiliū, & audibiliū. Atq; omnibus iis patrio more vti debemus, & neq; stringentē, neq; austerum nominare dolorē, vtpote quæ saporū propriae appellationes sunt. Plurimi enim medici ab Archigene stantes, quū dolorū differentias cōscriberent, haudquaquam ausi sunt à consuetudine in nominum vsu recedere, quæ ab ipsis laborātib⁹ audire li

G



*Dolorum  
vagus.*

cer, qui perinde se dolere interdū aiunt,  
quasi acu pungantur, ac rursus perinde ac  
si terebro perforētur. Quinetiā videri sibi  
aiūt, cōtūdi sese, & diuelli, & tēdi, & retra-  
hi, & detrahi, & grauitatis cuiusdam sen-  
sum pcipere, qua interdū subiectarū par-  
tiū aliqua suspendi videtur, interdū verò  
circūdātibus incūbere. Igitur vt huiusmo-  
di nomina oīa facilē intelligūtur, ita ad-  
stringētes, & acerbī, & austeri, dolores in-  
telligi haudquaquā possunt, ac prætereā  
ab vsu omninō aberrant. Hæc intelligere  
debuit Archigenes, quū docere nos vellet  
quomodo loci affecti possint cognosci.  
Nā omnis q̄ de dolorib⁹ habetur sermo,  
vanus nugarūq; plenus esse censetur, nisi  
ex his, quę laborātes ipsi dicūt, eos cogno-  
uerimus. Ergo si ab ipsis, quomodo dolēt,  
discere oportet, nūquā verò dicāt, acerbū,  
aut austerū, aut atrocē, aut holcimon do-  
lorē, rursus inutilis erit huiusmodi doctri-  
na. Præteteā ex eo loco, quo dicūt Archi-  
genē interpretari velle dolorū propieta-  
tes hæc docēdi, ratio tū impossibilis, tum  
inutilis esse planē videtur. Primū enim vel  
ipsis autoribus non oīs ipsorū proprietates  
enūtiari potest: quod cū ita sit, omninō  
fieri nō potest, vt ad doctrinā aliquid cō-  
ferat, vtpote quam ij duntaxat qui sensi-  
biliter



biliter ipsam percipiunt, noscere possunt. Deinde ea nobis ignota sit necesse est, quā nō laborauerimus, nisi fortasse Archigenes oēs sui corporis partes habuerit affectas; quā licet cōcesserimus, fieri tamen nō potest, vt credamus vnū hominem omnes singularū partiū affectu, fuisse expertū. donemus tamen (si volueris) hoc quoque, quāquam impossibile est. Nā vteri saltem affectus nunquā scilicet percepit Archigenes, nihilominus huius proprietates cōscripsit, quæ à solis mulierib<sup>9</sup> expertis dignoscuntur. Itaque admirationem (ita dii me ament) sæpenumerò mihi induxit, ex qua tādē ratiocinatione tam absurdā hanc doctrinā collegerit: quā & si veram cōtendis, nihil tamen ex ea vtilitatis prouenire fateri cogeris, nullo infirmo suos affectus per Archigenica nomina interpretāte. Nā quòd nonnulli laborantium fastidire stomachū aiunt, id nobis eo quòd aliquādo ita fuim<sup>9</sup> affecti, planè notū est: sicut etiā mœstitia torqueri, quippe quosdam sic fuisse affectos satis constat. An verò austero dolore ab Archigene dicto quispiā fuerit affectus, intelligi nō potest, vtpote nemine sciēte, cuīnam rei nomen hoc adaptauerit. Nā punctorium, & distēdentem atque eos qui cōformiter nominātur, atq;



iis multò magis vehementem, & fortè, & violentū, & cōtinuū, & intermittētē, nemo est qui non nouerit: utpote qui per nomina à consuetudine nō abhorrētia, enarratur, & quos quotidie euenire videmus. Ad austerū, & adstringētē, & atrocem, & holcimon, ut nemo pferat, ita si quis fortasse pferat, nemo intelliget. Ceterū oportet, & affectū esse communem: & appellationē ipsum declarantē, ab auditorū con-

*Stomachi  
cōpressio.  
Os vētri-  
culi.*

*Stoma-  
chus.*

*Hepatis  
obstru-  
ctio.*

*Scirrhus  
hepatis.*

suetudine nō aberrare: veluti quū stoma-  
chū premi dicimus, id quod nemo nō di-  
cere solet. quippe tali sæpenumērò sensu  
afficimur, qualē extrinsecus onus aliquod  
incubēs, inducere pōt: idq; in nōnullis o-  
ris vētriculi dispositionibus, qđ per abu-  
sionē non solum populares, sed probatissi-  
mi quoq; medici stomachū appellāt. Quin  
etiā inter vehemēter respirandū, nonnun-  
quā grauitatē in dextra præcordiū parte  
sentim⁹. id ē citra febrim eueniat: aut ob-  
structione, aut scirrhusa dispositione, he-  
par laborare cōiiciendū est. Veluti cū in-  
flāmatione infestatur, febrim comitari ne-  
cesse est. Itaq; oīa huiusmodi & dici pos-  
sunt, & manifesta sunt oīb⁹ medicis Archi-  
gene priorib⁹, atq; sine absurdis illis noī-  
bus doceri possūt. Archigenis verò doctri-  
na, hoc habet exactē p̄priū, ut nō nouarū  
rerum



rerum, sed nominum rem nullā declarantium, enarrationi studeat. Nam librum de pulsibus, huiusmodi nominibus impleuit. quāuis ille, vt in cōmentariis de pulsibus ostēdimus, haudquaquam impropriorum nominum metaphora indigeat.

*De via & ratione, qua simul & sedes affecta, & ipsius dispositio possit cognosci.*

## CAPVT III.

○ **E**Quidem voluissē Archigenē tantorum medicorū successorē, aliquid lucis doctrinæ addidisse: sed eā ita obscurauit, vt ne nos quidē, qui in artis operib⁹ iam senuimus, dicta ipsius intelligere valeamus. Quod igitur illius erat officij, id nos pręstare nitamur, docebimus enim in primis viā & rationē vniuersalem, cuius adminiculo, & ipse affectos locos inuenire, & ceteris viā ostēdere possis. Igitur vt in priore libro dictū iā est, via & ratio huiusmodi est. In primis enim q̄rere oportet singulorū locorū ppria signa, vt quomodo afficiātur, aut p singulos affect⁹ alterētur, inuenire possis: Deīde vtrū singulorū affectuū ppria sint signa, an circa quālibet partē variētur. Itaq; oportet & loci, & affectus nō īmemores, deinceps signa perstringere. Veluti si ita acciderit, vt pulmo inflammatione laboret, tāta inducetur spirā

*Methodus  
vniuersa-  
lis inueniē-  
di locum.*



*Peripneu-  
monia no-  
ta.*

*Orthop-  
noea.*

*Libr. 4. de  
can. pul.*

*Lateralis  
morbi no-  
ta.*

di difficultas, tantaq; angustia, vt suffoca-  
ri laborantes videantur, ac recti sedere co-  
nentur, quē affectū orthopnoeam nomi-  
nant. Quinetiam calidam sentiūt expira-  
tionem, idq; maximē si erysipelatis parti-  
ceps fuerit inflammatio: quocirca vbi pluri-  
mū efflant, iuuari videntur, ac multū aë-  
rem frigidū attrahere concupiscunt, atq;  
inter tussendum sputū expuunt: idq; mo-  
do hoc, aliās alio colore infectum, vt in-  
terdum rubrum, interdum flauum, aut ru-  
fum, ac spumofum quoq; & nigrum, & li-  
uidū appareat. Insuper grauitatis cuius-  
dam thoraci incūbentis sensum sæpenu-  
merò percipiūt, ac dolorē ex imo ad ipsū  
peruenire, & ad pectus & ad spinā. Præter  
ea acuta est ipsis febris. Pulsum verò ha-  
bent, qualē in libro de Pulsibus diximus.  
Sic vbi mēbrana costas succingēs inflam-  
mata est, acuta febris infestat, accedente  
pulsus ea quā in cōmentariis de Pulsibus  
diximus proprietate. est autē dolor pun-  
ctorius, vnā cū spiritus difficultate: ac ma-  
gna ex parte sputū colore infectum appa-  
ret haud secus quā in peripneumonia.  
Igitur vtrosq; affectus spirādi difficultas  
necessariò comitatur, eo q̃ affecta parti-  
cula spiritus sit instrumētū: oritur autē fe-  
bris, & propter affectū ipsum, & propter  
posi



positum. Nam & pulmo, & succingēs co-  
 stas membrana prope cor constituuntur.  
 Inflāmatio verò calidus affectus est, sic  
 etiā tussis ipsis vt spiritalibus conuenit.  
 Sed quòd aliquid expuitur, id ab affectu  
 ipso procedit. Quippe iā ostēdimus, omnē  
 inflāmatōnem, ex affluēte fieri sanguine:  
 quapropter si biliosus fuerit sanguis, flauū  
 aut pallidū erit sputū. Si pituitosus, & spu-  
 mans & candidū Si melācholicus, aut ni-  
 grū, aut liuidū. Si nihil horū sanguinē infe-  
 cerit, rubrū. Quinetia in pleuritide, sæpe-  
 numero magis biliosum: in peripneumo-  
 nia verò magis pituitosum, sequi cōsue-  
 uit. Sed de hoc satis iam declaratum est.  
 Quòd autē inflāmatarū partiū excremē-  
 ta p asperā arteriā referūtur, eius rei cau-  
 sa, tum ad positū, tū ad formationē refe-  
 renda est, quippe quę per solam hāc viam  
 effluere possunt. At verò vētriculus duos  
 habet meatus [vnū per quē prauī in ipso  
 humores euomuntur, alterū per quē hu-  
 mores ad inferiora delabūtur.] Verūm id  
 qđ in eo vitiosum inuenitur, supernatat  
 magis, ac vomitione reiici consuevit: reli-  
 qua per intestina deiiciūtur. Veluti renū  
 vesicāq; excrementa, meiendo excernū-  
 tur. Cerebri verò redundantia, per nares  
 præcipuē, nonnunquā verò per palatum,

*Sputi  
qualitas.*

*Aspera  
arteria.*

*Hæc in  
Græco ex-  
emplari  
germ. desi-  
derantur.*



*Affectu* & aures vacuatur. Igitur sedes affecte di-  
*locoru* ge- noscuntur, & ab accidētibus, & ab actione  
*nerales no* læsa, & excremētōrū qualitate, & à tumo-  
*ta.* ribus præter naturā, & dolorib⁹, & à t̄co-  
*τὰ χροιάς* loris vitio qđ sequitur, vel ī vniuerso cor-  
*Subtili e-* pore, vel in vna quapiā parte, vel duabus,  
*nim sub-* idq; maximē in oculis, & lingua: extra ho-  
*stātia* e- rū numerū sunt indicia, quę colliguntur se-  
*pellucida* cundū eā quę propriē sympathia, si ita ve-  
*facile colo* lis, appellatur, veluti in priorī libro iā di-  
*res hos ra-* ximus. At nūc tēpus esse videtur, vt ami-  
*piunt. lege* cos, quorū petitioni obtēperās, hos cōmē-  
*6. Epid.* tarios scribere aggressus sum, ad exercita-  
*Exercita* tionē inducā: fit autē exercitatio omnis,  
*tio hæc lo-* quum particularia sub eandē viā & ratio-  
*gica ma-* nem ducuntur. Huiusmodi autem doctri-  
*ximē con-* næ specie, vt persæpe ostēdimus, nō aliud  
*stat ratio-* inuenitur vtili⁹: quippe vię & ratiōes, vbi  
*ne quam* solæ sine multifaria secūdū ipsas exercita-  
*μὲθ' ὁδῶν* tione cognoscuntur: haudquaquā possunt  
*ἀναλυτι-* perfectos efficere discipulos. Altius igitur  
*κῆρυγ' ὀκῶν* viam & rationē dicere aggressi, ad exerci-  
*tum alte-* tationis modū accedamus. In primis qđ ē  
*ra quæ ἐ-* intueri oportet, num actio aliqua sit læsa  
*πασω-* q̄ppe cū ipsa propriū actionis instrumētū  
*γινῆ.* affici necesse est, deinde vbi actionem læ-  
*appella-* sam esse p̄spexeris, ad modū læsionis acce-  
*tur.* dendo, cōsidera ad quam affectionē pro-  
 priē ptineat. Postcā affectā particulā nota  
 num



num tumore quopiã, aut dolore infeste- *Τρόπος*  
 tur, & quidẽ accuratẽ cuiuslibet horũ spe- *modus de-*  
 ciẽ inuestigãdo: sic enim nõ solũ tumo- *finitur p-*  
 rũ, verũ etiã dolorũ quoq; , varios mo- *prietati-*  
 dos addisces. Aspice subinde affectæ par- *bus, id e-*  
 tis excremẽta, per quẽ meatum vacuẽtur: *tiam χα-*  
 ac vide, nũ aliquid essentiaẽ ab affecta par *γαν̄ηq̄ ap*  
 te secernatur. Postea etiã vtrũ omninò in- *pellatur.*  
 cocta sint ipsius excremẽta, an mediocri-  
 ter cocta: Ac tũ cũ ex eo vniuersũ corpus  
 aut pars aliqua incõmodũ rapiat qđ par-  
 tim ab actione læsa, partim à colore & fi-  
 gura deprehẽdet. Esto enim vt quispiã in- *Pleuritis.*  
 ter respirandũ in notharũ costarũ loco do-  
 leat, nõ protinus hũc esse pleureticũ suspi-  
 cari debes, sed in primis quidẽ, an tussien-  
 do aliquid expuat, intueri. id enim si colo-  
 ratũ, vt dictũ est, videris, tũ ipsum pleure-  
 ticũ esse dices. Quòd si tussiedo nihil om-  
 ninò expuat: fieri põt, vt nihilomin⁹ pleu-  
 reticus sit ille quidẽ, sed inflãmationẽ ha-  
 beat, & incoctã & stricctam adeò vt nihil  
 ab ea foras eici possit. Ac fieri quoq; põt,  
 vt ob hepatis inflãmationẽ, dolor in iam *Hepatis*  
 dicta sede excitetur, intẽtis videlicet in- *inflamma-*  
 ternis vinculis quib⁹ nõnullorũ iecur co- *tin.*  
 stis alligatur, atq; sic dolor ad succingẽtẽ  
 costas membranã perueniat. Verũ nequa *Pulsus in*  
 quã similis est pulsus, in hepatis, & mem- *pleuriti-*



*de durus  
tensus, a-  
per: in he  
patide  
mollis est.  
De his ex  
crementis  
hepatidis  
libro 5.*

branae costas succingētis inflāmate: ac  
ne alui quidē sedimēta similia sunt, quan-  
quam non in qualibet iecinoris inflāma-  
tione eadē sunt, sed in his affectibus qui  
propriē iecorarij nominantur. Igitur vt  
nihil excernitur, à quo indicatiū aliquod su-  
mi possit, satius fuerit p̄cordiorū dextrā  
partē tangere, q̄ si nullus apparet tumor,  
ne sic quidē desistere oportet: quippe fieri  
potest, vt in sola sima hepatis parte, sit in-  
flāmario, similiter etiā in gibbis partib⁹, 10

*In flam-  
mata par-  
tium con-  
tinentium  
hepar.*

quando, vt in his haud secus quā in he-  
pate, oriatur tumor p̄ter naturā, cuius  
ocasiōe septū trāuersum oppressū, respi- 20  
rationē efficit difficiliore: atq; q̄ ita labo-  
rant, ab exigua tussi irritātur. Ergo in hu-  
iusmodi dispositionibus, solidū, firmūque  
discernendi indicatiū per omne tēpus mor-  
bi, à pulsu sumendū est, deinde tractu tem-  
poris, reliqua quoque accidētia cōsiderā-  
da sunt. Nam & linguae, & vniuersi corpo-  
ris color alterat⁹, vbi hepar vitiatū est. Si-  
cut rursus thorace affecto, tussis increfcit,  
atque



atq; eo tēpore omninò apparent, ea quæ  
 rufsiendo expuuntur. Igitur quēadmodum  
 fieri nō potest, vt illæsis spirandi tū parti-  
 bus, tum instrumētis, difficilis fiat respira-  
 tio: accidit autē interdū, nullo existente in  
 ipsis proprio morbo, sed transuerso septo,  
 aut detracto, aut oppresso, vt homo diffi-  
 culter spīret: ita etiā vsu venire solet in ea  
 sede, quæ principē in se animę facultatē cō-  
 10 tinet. Nā cū & sciētia, & opinio, atq; cogi-  
 ratio omnis, in ipsa cōsistat, si harū aliqua  
 lædi videat, protinus ipsam quoq; affectu  
 quopiā laborare arbitramur. Nam vbi vel  
 in pleuritide, vel peripneumonia deliriū  
 incidit, nemo vel à costa, vel à pulmōe, ac-  
 cidēs hoc prouenisse dixerit. Quippe vni-  
 uersi eā partē, in qua deinceps animæ vis  
 residet, simul affici putāt, ac nititur quisq;  
 vt modū consensus sectæ suæ conformem  
 20 ostendat. Verū in aliis affectibus, nō cō-  
 sentire, sed primogenio ipsam affectu labo-  
 rare aiūt: veluti in lethargo, & phrenitide.  
 At verò vndiq; affici, vbi propriarū ipsius  
 actionū aliqua læditur. Proprias actiones  
 dico, quæ à nulla alia parte, vt instrumēto  
 fiunt. Nam reuera & videre illā, & audire  
 30 res huma-  
 nas & ca-  
 ducas opinio. *Διάνοια* quæ à Platone *Διάνοια* medium  
 genus est intelligentia circa mathemata.

*Princeps  
animæ fa-  
cultas.*

*Scientia  
constans  
& firma  
cognitio  
circa ea  
quæ eter-  
na sunt,  
lubrica ve-  
rò assen-  
sio circa  
res huma-  
nas & ca-*

haud



*Pars ani-  
me quo-  
modo læ-  
datur.*

*Caluaria  
fractura.*

*Capitis  
vstio.*

haudquaquā negandū est, sed videre ocu-  
lis, & audire auribus. Atqui vt cogitet, &  
reminiscatur, & existimet, & eligat, neq;  
oculis, neq; lingua, neq; alia quapiā par-  
te vtitur. Quòd si hæc animę pars, ita esset  
incontinēte ipsam corpore, vt nos in do-  
mo aliqua, in primis fortasse, nullā ei no-  
xam afferri putaremus à loco, quoniā ve-  
rò ipsam lædi videm⁹, quomodo lædatur  
esset inuestigandum. Si verò veluti forma  
quædā corporis est ab ipso inseparabilis,  
eā lædi nō inficiabimur, ob suscipiētis ipsā  
corporis alterationē. At quia de hac re in-  
ter philosophos ingēs pugna est, aliis eā  
veluti in domicilio cōtineri dicētib⁹, aliis  
verò ipsam corporis formā esse putātib⁹,  
idcirco quomodo lædatur, inuētū perdiffi-  
cile est. Quòd verò lædatur, ab experiētia  
discere licet. Etenim vbi fracto capitis of-  
fi, terebra adacta est, si quis vehemētius cō-  
primat, protinus sensum omnē amittit la-  
borās: quinetiā si inflāmatio quædā oria-  
tur, nā & hanc interdū euenire videmus.  
mentem itaq; lædi minimè negandū est.  
Præterea nonnulli per vehementem capi-  
tis vstionem delirauerūt atque per fortes  
ictus capiti adactos, sæpenumerò stupidū  
soporē sequi videre est: multi quoque af-  
fectus in capite consistentes, mentē haud  
obscurē



obscurè vitiant: adeo vt etiam populares, quum aut delirare aliquem, aut mētē quo modolibet affici cōspiciūt, capiti remedia adhibenda esse cēseant. Verūm enim uero quōd principiū sensus & motionis ab impetu prodeūtis, sedē in cerebro habeat, & quōd hoc à membranīs (Græci meninges vocant) contegatur, id in aliis cōmētariis, quā verissimum esse declaratū est. Nunc

10<sup>o</sup> verò quomodo distinguantur affectus primitiui ab his qui per consensum eueniūt, considerandū est. Nam huiusmodi speculatio propriè ad hoc nostrum institutū pertinere videtur, & quidem non sine manifesta utilitate: quippe q̄ ad curādi rationem imprimis pertinet, cuiusnam parti remedia sint adaptāda cognouisse. Nā per solū consensum lēso cerebro, si ea pars quę primitiuo affectu laborat fuerit curata, prius quā

*Affectus  
primiti-  
uus.*

20<sup>o</sup> cerebro propria aliqua eueniat dispositio, nullum in ipso relinquitur accidēs. Quōd si ex cōsensu, permanēs aliqua fiat in ipso dispositio, tum non solum parti quę primitiuo affectu laborat, sed capiti quoq; remedia adhibere oportet. Quapropter exactè definire, vtrum cerebrum, an membranæ ipsius primitiuè afficiātur, haud magnam utilitatē asserere pōt. In vtraq; enim dispositione, capiti succurritur. Igitur huic rei non

*Affectus  
per con-  
sensum.*

*Dolor ex  
leso cere-  
bro.*



nō ita vehemēs studiū adhibere, sed mor-  
 bi poti⁹ essentiā, qualis sit inuenire: quippe  
 humidū exiccare, aridū humectare, frigi-  
 dū calfacere, calidū refrigerare, oportet.  
*Curatio* Ac si cōiugat⁹ fuerit affectus, per cōtrariā  
*affectuū* coniugationē ipsum curare: vt calidum &  
*capitis.* ficcū, humectare & refrigerare: humidum  
 frigidumq; exiccare & calfacere, atq; in  
 reliquis duabus cōiugationibus ad portio-  
 nem, ac in ceteris morbis omnibus, eadem <sup>10</sup>  
 ratione similiter facere cōuenit. At vni⁹  
 cuiusq; speciē, in libro de morborū differē-  
 tiis persecuti sumus. Quū itaq; & cerebri,  
 & membranarū eius, iidem morbi simili  
 curatione indigeant, logica magis, quā ad  
 curationem utilis esse videtur. quæstio, in  
 vtrolibet illorū contineatur princeps ani-  
 mæ facultas. Verū an in corde sit ea facul-  
 tas, lōgè diuersa atq; omnino differens est  
 quæstio. Esto enim vt à flaua bile in corde <sup>20</sup>  
 & accumulata, & putredine affecta, phreni-  
 tis sit excitata, nōne delirare videbitur is,  
 qui caput oxyrhodino (id est oleo rosaceo  
 cum aceto) perfundere iusserit? Nam si hoc  
 p̄sidio phrenitidis causa sanari possit, nō  
 capiti, sed thoraci, ipsum adhibere poterat.  
 Neq; tñ vniuerso thoraci, sed illi dūtaxat  
 parti, in qua cor cōtinetur. Hactenus hæc  
 explicasse sufficiat, hoc addito, qd non [so-  
 lum



hūm] affectū locū, verūmetiam causam illi  
noxam inferentē, considerare oportet: vt  
exēpli gratia: Deliriū est accidēs ei⁹ actio  
nis quæ à loco mētis impote prodit: simili  
ter†sopor stupidus, sed à contrariis causis  
oriuntur. Quippe & vigiliam, & delirium  
causa potestare calida efficit. At quotquot  
sommelēti & soporosi sunt affectus, oēs à  
frigida causa proueniūt. Id quod ex medi  
camentorum natura planè discere licet.  
Quippe frigida stuporē soporemq; calida  
verò vigiliās & varias motiones inducūt.  
Sed quid opus est fortia medicamēta enu  
merare, cū quotidie videamus & lactucas  
& potabiliū, calidarūq; aquarū balneas, &  
vinum modicè dilutum, somnū inducere?  
reliquorū medicamentorū exēplo, quæ &  
humectare & refrigerare possunt. Quæ ve  
rò iis cōtraria sunt, vigiliās excitare. Itaq;  
tenuis ratio victus, & vinū meracius, vigi  
liās inducunt: idq; multo magis, cū vinum  
meracum, aut suapte natura fuerit calidū,  
aut valide antiquū, veluti apud nostros  
Pergami olim accidisse, memorię proditū  
est. Neque absurda videtur historiæ ipsius  
narratio. Grāmaticus quidā, singulis die  
bus balneū petens, vnū ex pueris secū du  
cebat, altero domi relicto, qui rē familia  
rem seruaret, atq; ea quæ ad victum essent  
neces

*Deliriū.*† τὸ νόμος  
ὑγείῃ ὁ κα-  
ρῶ.*Paraphro  
sine**Sopor stu-  
pidus.**Historia  
de vino.*



necessaria, præpararet. Puer itaq; domum custodiens, quū vehemēti siti cruciaretur, nec esset ei aquæ copia, vinū antiquū liberaliter potauit, atq; ex reliquo tēpore vigil omnino permanfit. Postea correptus febre, vnā cū vigiliis oborto delirio periit.

*Anima.* Cæterū animātia quæ frigidiori sunt natura, per hyemē ob frigoris vim, perinde ac si mortua essent, latitare solent. Atq; tū *Vipera.*

viperas quoq; videres, si manibus tractentur, deferāturq; haudquaquā mordere. Nā per æstatē, tum hoc animal, tum serpentes reliqui omnes, maximē sub caniculæ feruore, quū vehementer æstuant, furorem præ se ferre vidētur, adeo vt ne exiguo quidē momēto quiescere possint. Quod intel

*Cenchris.* ligens Nicander sic de Cenchride cecinit:

*Nicāder.* Non temerē offendas calcando Cenchridis artus.

*Lege 13.* Dum furij agitur.

*Act.* Verūm de iis alibi pleniorē inuenies & enarrationē & demōstrationē. Siquidē calida causa motū excitat, atq; idcirco vigilias affert: frigus aut ociosum & ad motiones pigrū reddit animal, ob idq; somnū soporemq; inducit. Igitur qui hæc intelligit, quū per ardentium febriū vigorē hominem viderit & vigilare, & delirare, deinde

*Vigilia* inclināte iam febre, & dormire, & rectē *Deliriū,* sa-  
perc, in capite nullam propriā esse dispositionem,



tionē, sed à febris abundanti calore, deliriū fieri existimabit. Sic etiā in peripneumonia, & laterali morbo, quū ad vigorem febris peruenerit, deliriū sequi solet, nullo existēte in capite proprio affectu. Quippe tum affectus proprius esse putandus est, cū *Proprius affectus.* permanere in parte quapiā cōspicitur. Vnde si in laterali morbo permanēs eueniat deliriū, caput propriū habere morbū per-  
 10 pēde, ita vt quāuis lateris morbo quiescat, possit tamē capitis morbus permanere. Sæpenumero enim vidim⁹ panū ob vlcus ali *Panus.* quod abortū, vlcere curato, deinde diuti⁹ infestare. Ergo quū pars aliqua simul cum alia sic afficitur, vt irritata quidē vna, altera vehemētius molestetur, remissa verò irritatione quiescat, eā per consensum affici putandum est. Hæc enim vna coniectura *Affectus per con-* cōmunis est. Sed de cerebro, vt dictū est, *sensum.*  
 20 proprium sumitur indicium, si non assiduē delirium permaneat, sed auctā febrim sequatur. Atq; eadem ratione fieri solet, vt quum febriū accessiones irruere incipiūt, *Sopor in febriū ac-* sopore laborantes grauētur, quòd hoc tē- *cessionibus.* pore cerebrum vehemēter sit refrigeratū: quippe quod alioqui paratissimū est, vt no-  
 ram huiusmodi subeat, quum intēperiem habeat frigidam, non verò tantam, vt hæc sola prædictorum accidentium possit esse

H



†κατα-  
πορεν, ἢ  
παρεν.  
causa, sed quū accessio ab initio processerit, frigus adeo increfcit vt ἴσoporē queat inducere. Id verò, vt dixi, fieri consuevit, vel ab intemperie frigida, vel à pituita in cerebro exuperante.

LIBRI SECUNDI

FINIS.

CL. GALENI<sup>IO</sup>

DE AFFECTORVM  
LOCORVM NOTITIA

LIBER TER-

TIVS.

Sequitur hoc libro exercitatio particularis vniuersalis methodi: & primum quidem ab actione læsa: deinde accidentibus tum propriis tum communibus principis animæ affectiones requirit, à cerebro ad olfactum progrediens.

20

*Quod actionum noxæ, ipsarum actionum instrumenta affecta esse declarant, aut primitiuè aut per accidens.*

CAPVT I.

Locus.



DE affectis locis, sic enim vocantur corporis partes, pauci admodum medici scribere aggressi sunt, ac multo plura quàm attigerint, omise



omiserunt. Itaq; cæteris silentio præteritis  
vnius Archigenis haud indigni qui omni  
bus præferretur, meminim<sup>9</sup>. diximus enim  
eum sermonē, quo asserit actiones quasdā  
lædi, illæsa ea corporis particula, quæ ipsis  
deputata est, distinctione egere. Defendi  
enim potest, si pars per alterius cōsensum  
læsa, nondum permanentem habeat dispo  
sitionē, sed veluti vmbra quædam (vt ipse  
dicebat,) insit hæc ei affectio. Nam si ad  
ignem quis propius accesserit, vt ferè cō  
buri videatur, citra tamē vstionē, dolebit  
quidē vehemēter, sed calfacta parte nihil  
adhuc patiente. Sic etiam vbi ambiens aër  
vehemēter frigidus, aut aqua exactè frigi  
da, aut nix infestat, grauis admodū dolor  
excitatur. Atqui ablata re quæ nocuit, pro  
tinus conquiescit affectio. Quāobrem sa  
tius fuerit, vt dicamus, nomine id ipsum in  
dicante, affici quodammodo eam partem,  
quæ alteri consentit. Neq; enim pars quæ  
nihil patitur, sed ea quæ cū alio patitur, cō  
sentiētis vocabulo significatur. Itaq; quū  
affecto stomacho, oculi similib<sup>9</sup> infestātur  
casibus, quales in suffusionib<sup>9</sup> apparere so  
lent, dicendum est illos pati, elato ad cere  
brum ab humoribus in ventriculo cōtētis,  
fumoso quopiā vapore: non tamen adeo  
afficiūtur, vt ablata re q̄ molestiā intulit.

*Suffusio  
nes.*



*Questio-  
nes logicae.  
Chrysip-  
pus.*

propria curatione egeat. Verum huiusmo-  
di disputatio, ut dixi, ad dialecticam potius  
pertinet. Quaecumque enim quaestiones usum  
transcendunt, qualis sit rerum natura secun-  
dum propriam essentiam indagantes, haud  
dubie logicae esse censentur. Sic etiam Chry-  
sippus philosophus de animi aegritudinibus  
scripsit. Vnum quidem de curandi ra-  
tione librum, quo scilicet maxime ad ea-  
rum curationem utimur, cui tres alios sub-  
iunxit, qui logicas continent quaestiones.

*Quod lesarum actionum modos co-  
gnovisse sit utile.*

C A P. II.

*Archige-  
nes.*

*Vocalia  
instru-  
menta.  
Digiti af-  
fecti.*

**Q**UOD autem melius fuerat, & huic no-  
stro instituto commodius, Archige-  
nes parum exacte declaravit. Quod certe  
modis actio laedi possit. Sic enim, & prima  
affectae partes, & proprio vitio laboran-  
tes, aut quomodocumque quis nominare vo-  
luerit, deprehendantur, & curandi ratio ab  
nobis suppeditari possit. Ego vero in  
vocalibus instrumentis id iam exposui, ac  
in eo quoque qui in manu sensum amisit  
digitorum, ipsis non affectis, quippe in-  
uenta in dorsi initio pars, quae primo affi-  
ciebatur, idoneam curationem ostendit.

Tri



## Triplex lesionis modus per consensum.

## CAPVT III.

**S**Ed aliter eueniunt suffusionis acciden-  
 tia, affecto vetriculo: atq; aliter ei, qui *suffusio.*  
 ab alto decidit, nullo existēte in vocalibus  
 instrumentis vitio, vox offensa est. Deniq;  
 alia cōsensus specie laborabat is, cuius di-  
 giti sensum amiserāt. Siquidē oculi vexa-  
 bātur, q̄ ascenderet ad eos aliquid: vox au-  
 tem quod materia eius esset oblēsa. Sed di-  
 giti idcirco torpebant, q̄ sentiendi facul-  
 tas ad ipsos nō descēdebat: proinde satius  
 fortasse fuerit, vt existimes, tū vocalia in-  
 strumēta, tum digitos nulla affectione la-  
 borasse, id quod de oculis haudquaquam  
 dixeris. Nam his vt fumoso vapore imple-  
 tis, affectus ipse inest. Vocaliū verò instru-  
 mentorū, atq; digitorū officiū læditur, nō *Officiū*  
 quod veniat ad eos quippiam præter natu- *vocalium*  
 ram, sed quod careant eo quod secundum *instrumē-*  
 naturam ad ipsos venire debet. Sanè secū- *torū quā-*  
 dum dorsi spinā lēsa nerui origine, vis sen- *do læditur*  
 tiendi digitis nō influit. Neq; guttur reso-  
 lutis intercostalibus musculis efflatū spiri-  
 tum recipit. Nihilominus rectē dixeris, in  
 ipsis hanc esse passionē, quod non perue-  
 niant ad ipsas partes ea, quæ antea quū se-  
 cundum naturam se haberent, venire sole-  
 bāt. Etenim fontes affici haud absurdē pu-



taueris, si non perueniat ad ipsos aqua. Sic  
*Analogia* Cerealiū quoq; frugū è terra prodeuntiū,  
*Affecta* squalor immodicus, passio est, & anima-  
*pars quā-* liū, cibi potionisq; penuria. Quoties enim  
*do dica-* alicui deest illud, sine quo secundū naturā  
*tur.* munere suo fungi non potest, ipsum opti-  
*Disposi-* mo iure affectū esse putādū est. Sed huius-  
*tio hec-* modi quæstiones (vt iam dixi) ad dialecti-  
*ca.* cam potius pertinet. Ceterū magna me-  
 dicorū pars negligit eas considerationes,  
 q̄ vel læsis, vel deperditis actionib⁹ neces-  
 sariæ sunt. Quum em̄ duæ trēsve fuerint  
 aliquādo huiusmodi actiones, accidit in-  
 terdū, vt vna particula affecta, reliquæ illi  
*Disposi-* cōsentiētes in suis actionibus simul lēdā-  
*tio cata-* tur: interdū verò, vt omnes eodem modo  
*schesin.* afficiātur. Atque accidit interdū, vt harum  
*Deiis co-* aliquæ dispositionem habeant (vt ita dicā)  
*piosè 8.* hecticā, id est, quæ tenaciter hæret, reliquæ  
*Method.* verò (vt sic dixeris) cataleschesin, id est, q̄ fa-  
*sub ini-* cilè discutitur, de q̄bus 2. libro de Viuorū  
*tium.* dissectione, atq; in eo qui hunc præcedit,  
 iam diximus, ac nōnihil in sequētib⁹ quo-  
 que dicemus, vt videlicet futurū sermonē,  
 q̄ sine huiusmodi † definitionib⁹ explica-  
 qua simi- ri nō potest, perficiam⁹. Sed iam enarrare  
 lia, disti-  
 milia: eadem, diuersa: propria denique & cōmunia separat,  
 in qua tota vis Logicæ ferè sita est.

aggre



aggrediamur id, quod admodū vtile fuerit prædixisse, propter eos, qui verbo quidē demonstrare nituntur, affectorū locorum inuestigationē Medicis esse necessariam, opere verò illā euertunt. Atque vnum ali-  
 quē affectum pro exemplo sumamus, sitq; is pleuritis, in qua latus esse affectū, dolor ipsius declarat. Sed utrū quē succingēs appellari solet siue mēbrana, siue tunica (nihil enī refert) inflāmetur in pleuriticis, an alia quædā lateris particula, prætereā utrū pulmo secūdum fibras necessariō afficiat, an omnino affectionis sit expers, scire nihil ad rē pertinere autumant ij, qui vsum & experimenta præferūt: dicunt enim multos se vidisse pleuriticos, tū à præceptoribus, tum à se curatos, obseruatis iis præceptis, q̄ ab Hippocrate in libro de Ratione victus in acutis morbis, præscripta sunt: itē  
 20 quid ipsis proſit, & q̄d noceat noscere, cui dētia signa habere, quibus discāt cui venā secare oporteat. Insuper de fomentis, cataplasmatis, victus ratione, alui ductione, nihil sibi ad cōpletā notitiā deesse, idq; ex longa experiētia. Sed quid vel Hippocratem, vel aliū quēpiā illo priorē induxerit, vt hæc inueniret auxilia, se penit⁹ ignorare: satis ipsis esse, si iā dictis remediis cōmodè vtant: id quod alios quoq; artifices

*Pleuritis.**Empiricorum defensio.**Libro 2.**Lege Celsum lib. 1.*



*Gale. de-  
liberatio  
de empi-  
ricis &  
dogmati-  
ci.  
Dogma-  
ti.*

facere videmus. Neq; enim faber, siue li-  
gnarius, siue ærari<sup>9</sup>, neq; cerdo, quo pacto  
artes suæ fuerint inuentæ, inquirunt: sed à  
præceptoribus edocti, vsu eas probant, &  
cōfirmant, atq; sic clarū nomen assequun-  
tur. Equidē, vt verū fatear, quū medicos  
q̄ se empiricos ab experientia nomināt, ta-  
lia proferētes audio, inducor certē vt pro-  
babiles putem eorum rationes, vidēturq;  
mihi, qui rationalem medicinam profitē-  
tur, contra illos parū idonea se respōsiōne  
tueri. Proinde vt cæteris in rebus omnib<sup>9</sup>  
temerariū ascēsum semp̄ refugi: ita in iue-  
stigādis singulorū morborū remediis, diu  
multūq; apud me cogitavi, an logica de-  
mōstratione indigerē, an sufficerēt ea prę-  
cepta, quæ ab experiētia, & præceptorib<sup>9</sup>,  
atq; ex me ipso didicerā. Igitur ea q̄ diuti-  
na inquisitione longē optima iudicaui, ita  
me dii amēt, veritatis amatores docere nō  
grauabor. Nihil enim causæ est, quāobré  
mētiar: quod facere solent ij, qui vni sectæ  
addicti, omnem ex ipsa gloriam quærunt:  
quippe cōtentiosē eos defendere oportet,  
eam sectam veram esse, quam vnicā noue-  
runt: nam ex nullo alio disciplinarū gene-  
re gloriā sperare possunt. Ego verò re ipsa,  
& publicē, & priuatim, apud eos videlicet  
qui sectā quālibet à me discere cupiebāt,  
osten

*Gale. ia-  
Etantia.*



ostendi in omniū sectarū scientia (ne ma-  
 ius quicquā dixerō) me esse posthabendū  
 nemini. Quōd si vni sectarū patrociniū  
 ferre velim, quāuis ex tempore ac pro re-  
 nata dicēdum fuerit, haud tamē faciliē ab  
 aliquo cōvinci me, rationum penuriā, pa-  
 tiar. Nō enim (vt nōnulli faciunt) ex libris  
 eas didici, sed prāstātissimis in vnaquaq;  
 10 secta praeceptorib<sup>9</sup> vsus sum: neq; sanē o-  
 odisse possim empiricos, quorū praeceptis  
 sum institutus, vel dogmaticos: pari enim  
 studio oīb<sup>9</sup> dedi operā, versatusq; sum cū  
 prāstantissimis in vnaquaq; secta praece-  
 ptoribus. Itaq; innotui Romae, tū primori-  
 bus eius vrbis ciuib<sup>9</sup>, tum imperatoribus  
 deinceps omnib<sup>9</sup>, & quidē ob artis opera,  
 non ob sophisticas rationes: quāobrē nihil  
 prohibet, quo minus de vnaquaq; secta ve-  
 20 rē dicā ea quē sentio. Igitur per artis exer-  
 citationem cōperi, eam remediorū inuen-  
 tionē quae ex vera demonstratione proce-  
 dit, in his quae rarō accidunt, experientiae  
 longē praeferre. Vnde multos morbos cura-  
 ui, maximē cōtrariis praeiudiis: interdum &  
 iis quae experiētia & vsu cognita sunt, quae  
 quidē in libro de curādi via & ratione la-  
 tius explicavi. Nūc verō ea dūtaxat pstrin-  
 gā, quae nostro proposito magis accōmo-  
 data videbuntur. Nā cōperi lefas actiones

Cōclusio.

Lesa a-  
ctiones.



non solum ob similes, à quibus adduntur,  
 ægrotantes: verum etiam ob alias quasdam  
 particulas, quæ licet actionem non habeant,  
 usum tamen quendam præstare videntur.  
 Sic etiam instrumentalium partium morbos,  
 actioni nocentes deprehendi, quibus præ-  
 cognitum, inueni deinceps morbos quosdam,  
 continenter plurimos homines infestantes,  
 alios verò raro accideres. Atqui experimen-  
 ta tantum spectantes Medici, non ea quæ ra-  
 10 rò, sed quæ crebro accidunt, memoria & imi-  
 tatione assequuntur. Quocirca dispositionum  
 raro euenientium, non solum curationem,  
 verum etiam præuenientes ipsarum notio-  
 nes negligunt. Proinde primum inuestigavi  
 quomodo cognoscenda sunt, inuenique; ea-  
 rum quasdam scientifica deprehendi posse  
 20 notitia, nonnullas verò artificiosa vocata  
*Artificio-  
sa conie-  
ctura.* cōiectura, atque idcirco ipsas magna ex par-  
 te rectas. Eiusmodi enim est artificiosa cōie-  
 cturæ vis. Verum & has ipsas, & dispositiões  
 eis priores, quæ videlicet scientificam noti-  
 tiam admittunt, indigere semper inueni affe-  
 ctarum partium notione. Itaque medicinam  
*Gale. glo-  
ria.* professus, usque ad senectutem, nullam in  
 hodiernum usque diem calumniam subii,  
 neque curando, neque præfagiendo, id quod  
 celeberrimis quibusdam medicis interdum  
 accidere memini. Quod si quis gloriam ab  
 arti



¶ Via hac & ratione, & si fieri possit, ea periodo, qua vocatur τεμπηκώδης, morbos cognoscas, & remedia inuenias, vtrumque quidem ἰατρικὴν νοσήσας scientificè, aut certè

artis operibus, nō à sophisticis sermonib<sup>9</sup> assequi voluerit, is nullo negotio facili cōpendio colligere poterit ea quę per omnē ferē aetate diligenti inquisitione inueni. Idq; sibi persuasum habeat, ¶ hac via & ratione, medicamenta me inuenisse, quibus morbos rarò eueniētes curarē, cū antea neq; praeceptorē vidissem huiusmodi morbos curantē, neq; ipse aliquod expertum haberē remediū: id quod per deos immortales affirmare nequaquā timeo. Quippe vitiata actiōe, semp̄ inuestigare studebā, quānam sedes, vel ipse afficeretur, vel alteri consentiret: quumq; eam inuenisse persuasum mihi esset, tum dispositionē ipsam  
 10 quærere, atque ex vtrisque totius curatiui generis indicationem sumere, simul remedium & quantitatem, & qualitatem, & idoneam materiam inuenire. Præterea cū prædictis, & aetatem, & naturam laborantis, tum anni tempus, & terrā, & id genus  
 20 alia, quorū in Hippocraticorum librorum enarratione memini, perpēdere operæpretium ducebam. Verū superioribus duobus libris hunc præcedentibus, nisi fluxa  
 admo

σοχαστικὴν  
 νόσον  
 conjectura  
 quadam  
 q̄ sit particeps  
 artificij.

Methodus  
 Galen. in  
 morborū  
 curat.

Affecto-  
 rū locorū  
 quintu-  
 plex de-  
 prehensio.



† ἐπιτρε-  
φομένων  
quæ ἀτεὰ  
vocabat  
ἐπιφύο-  
μιν.

Excremē-  
ta tripli-  
cia.

† Vt vide-  
licet repu-  
dies quæ  
philosophi  
appellant

τὰ ἐπίσκη-  
τα ἢ ἰσχυ-  
ρά ἢ ἀσθενή,

ex quibus  
neque sciē-  
tia fit, ne-  
que conie-  
ctura ar-  
tificialis.

Memoria  
læsa.

Topica re-  
media.

admodū fuit memoria, didicistis affectas  
sedes quinq; modis posse deprehēdi. Nem-  
pe ab excrementis, atque iis quæ affectis  
partibus † adnascuntur, item actione læsa  
quibus cōnumerantur & color præter na-  
turam, & figura. Sed excrementa trifariā  
diuiduntur: aliquando enim affectarū se-  
dium partes, ipsarū videlicet essentia vel  
soluta vel dissecta excernuntur, interdum <sup>10</sup>  
ea quæ in ipsis continentur, nonnunquam  
aliquid quod morbosas dispositiones se-  
quitur: idq; vel † solas, vel semper vel ma-  
gna ex parte. Cum itaq; in quibusdā affe-  
ctibus, nulla alia mihi pateret via, sola a-  
ctionis læsio, satis conducebat ad affecta-  
rum partium inuentionem.

De memoria perditā, deq; alijs affectibus  
qui circa principem animæ facul-  
tatem euenire possunt.

## CAP. IIII.

**I**gitur cū deperditā cuiusdam memo- <sup>20</sup>  
riā restituere oporteret, essemq; adhuc  
iunior, ac neque præceptorem vnquam vi-  
dissem, qui huiusmodi affectionē curasset,  
neque apud vllum antiquorum curationē  
legissem. Primū quidē apud meipsum in-  
uestigavi quānā pars esset affecta, cui to-  
pica, id est, localia vocata remedia adhibe-  
rē, prius videlicet vniuersi corporis cura-  
tione



tione præmissa. Id enim commune præce-  
 ptum est, quod in omnibus morbis obser-  
 uare oportet. Deinde qua via, ratione, re-  
 mediorū singula inuenirē. Cæterū affe-  
 ctam sedē eam ipsam existimaui, qua prin-  
 ceptis animæ vis cōtinetur. Medicamēta au-  
 tem ea adhibenda esse, quæ huius sedis di-  
 spositioni aduersarētur. Interim oratos ha-  
 bere velim omnes, qui in horum cōmen-  
 tatorū lectionem inciderint, vt pruritū,  
 † rabiem, vel insaniā, quam de scētis con-  
 ceperunt, deponant, deinde sic vt probos  
 viros decet, dicendorum seriem conside-  
 rent. Equidē quum ea quæ iam supra pro-  
 posui, perpenderem, accepi Archigenē li-  
 brū quendā, de oblæsa memoriæ restaura-  
 tione edidisse, quocirca omnes bibliothec-  
 as illico percurri, conueniēq; bibliopolas  
 omnes, atq; Medicos quoque, quos & viri  
 10 & scriptorum eius studiosos esse sciebam,  
 quò eius libri copia mihi daretur, sperans  
 in eo remedia me inuenturū, locū autem  
 affectum minimē, quòd planē scirem nul-  
 lam aliam à corde sedem huic affectioni  
 ipsum destinasse, secta ipsius cōstanter de-  
 fendente, principem animæ vim in ea par-  
 te sedem sibi vendicare. Porro intelligere  
 cupiebam quod intemperatiæ genus, eius  
 affectionis causam esse putaret: neq; enim  
 dubi

Vniuerso  
 corporis  
 curatio  
 præmit-  
 tenda.

† Vel (vt  
 vetus in-  
 terpres)  
 rabiosam  
 litē, Gra-  
 est, τῆς  
 ψώρας ἢ  
 λύτης ἢ  
 μανίας.



*Intempe-  
rantia ge-  
nera.*

*Archige-  
nis episto-  
la.*

dubitabam, quin distemperantiā aliquam pro causa afferret, vtpote qui sectam eius nō ignorarem. Sciens itaque octo intemperantiæ genera in qualibet particula posse cōsistere, quatuor simplices, & quatuor cōpositas, noscere cupiebam, quod intemperantiæ genus Archigenes læsæ actionis causam esse declararet: frigusne, an humiditatem spiritus in corde, an compositum ex frigore & humiditate, aut ariditatē cū frigore, putaret huiusmodi posse affectio-  
nem producere. Etenim manifestum erat, eū in hac re nihil tribuisse calori. Sed quid demū mihi acciderit, is qui huius sectę infantiā absterferint, iam narrare aggredior. Sanē primos ei⁹ libri sermones scripsi, vbi videlicet Archigenes curationem scribere aggreditur deletæ recordationis, siue obliuionis, siue memoriæ amissæ, aut læsæ, vel  
utcunq; eam, quā suprà proposui affectio-  
nem nominare volueris: aut si nō affectio-  
nem, sed morbū, aut accidens, aut infirmi-  
tatē appellaueris, talia em̄ à sophistis tra-  
ctantur, quæ ne minimam quidē vtilitatē ad curationis rationē afferūt. Verūm quo clariora reddātur ea quæ posthac dicem⁹, hoc predicere necesse erat, Archigenis vn-  
decim libros epistolarū scripsisse, in quorū primo extat ad Marsum epistola, qua cōsu-  
lit



lit, vt patri memoriã restituere nitatur, at-  
 que ab initio statim post proœmiũ, vbi cū  
 rationē tractare incipit, ita ad verbũ ferē  
 „ scriptũ est: Itaq; modici sanguinis iterata  
 „ detractio, incipiēte etiamdum malo, meo  
 „ quidē iudicio, non parum conferre vide-  
 „ tur, nisi laborātis fortē imbecillitas obsti-  
 „ terit. Deinde rursus inquit: Consultũ mihi  
 „ videtur, vniuerso quidē corpori, & irriga-  
 10 tiones, & fomēta: deraſo verò capiti cucur-  
 „ bitulas adhibere. His ita lectis (vt verũ fa-  
 tear) † fastidio affect⁹ sum: idq; nō ab re,  
 q̃ spe quā de viro conceperā, frustratũ me  
 viderem. quippe qui millies, in multis cō-  
 mētariis suis, affectorũ locorum, atq; dis-  
 positionis ipsorũ sciētiam, necessariam ad  
 rectā curationē esse dixisset. Sed quid vti-  
 litatis inde cōsequemur, nisi ab ipsis ad re-  
 mediorũ inuentionē dirigamur? Qua igi-  
 20 tur ò Archigenes p̃babili ratione p̃suasi,  
 caput aggrediemur relicto corde: cui⁹ con-  
 genitũ quoddā opus memoria est, affect⁹  
 verò actionis, eius est deperditio? Quā dis-  
 positionē sanādo, cucurbitula capiti adhi-  
 bita, memoriã reuocat? qua ratione huius-  
 modi suades remedia? ita nūc quoq; inter  
 visitandũ agros, per cōmunes cōsultatio-  
 nes, video Medicos adinuicē iterrogātes,  
 qua ratione hoc poti⁹ quā illud adhibere  
 sua

† ἐσχοτο-  
 διῶσα,  
 conturba-  
 tus sum,  
 perinde  
 ac qui ver-  
 tiginē te-  
 nebricosa  
 conturbā-  
 tur.



*Cucurbi-  
tula.  
Phleboto-  
mia.*

*Inſodi-  
cia. quaſi  
offuſis te-  
nebris na-  
ta verti-*

ſuaſerit: atque ij ne minima quidem negli-  
gunt, tantū abeſt, vt tam grādia, qualis eſt  
cucurbitula capiti adhibita p̄tereāt. Neq;  
video, ſi pectori è regione cordis fuiſſet  
adhibita, qua ratione Marſi patrē iuuare  
potuiſſet. Præterea p̄poſita iam verborū  
ſeries nō explicat, vtrū cōciſa antè ſcalpel-  
lo, an integrā cute, cucurbitulā thoraci a-  
ptare voluerit. Si enim forte fortuna, vt nō  
nunquā euenire ſolet, frigida aridaq; fue-  
rit diſpoſitio, ſanguinis qdē detractio ad  
extremū ducit periculū, ſolæ verò cucur-  
bitulæ, non alio nomine, quā caloris exci-  
tādi gratia, vtilis eſſe cēſentur. Cucurbitu-  
læ enim attrahūt ad ſeſe humorē ex imo,  
id quod aridæ diſpoſitioni maximè aduer-  
ſatur. Ignota itaq; diſpoſitione, quæ vel ca-  
put, vel mēbranas ipſi<sup>9</sup> afficit, haudquaquā  
tutū fuerit, in exteriores caluariæ partes  
materiā retrahere. Sic enim prædicere de-  
buerat, ſi frigida humidaq; affectio fue-  
rit, capite hoc modo diſpoſito, curationis  
ſummā ī calfaciēdo exſiccādoq; ſtatuerē,  
atq; præſidiorū materiā, quæ huiusmo-  
di habeant facultatem, adhibere oportet.  
Quūq; vix ex obſcura me vertigine recol-  
legiſſem, ſequētia etiam legere aggreſſus  
ſum: inuenire me poſſe ſperās, ſi nō p̄ ordi-  
nē, ſaltē ſine ordine, huiusmodi aliquē ſer-  
monem



monem, qualis is erat, quē nuper exempli *go. atque*  
 causa percurrimus, deprehendi itaq; vni *hic locus*  
 uersum præsidiorū catalogū, vehementer *satis ostendit quomodo*  
 calfacientē & exiccantē, adeò vt totū ca- *do prius*  
 put, sinapismo ab ipso vocato, calfaceret, *verti de-*  
 quamuis vehementissimū sit medicamen *buerit i-*  
 tum. Deinde ablato sinapi, caput nitro cō *σποροδι-*  
 spergere, mox aqua calida rigare iubet, *viaσα,*  
 quo medicamine nullum in arte medica *quod vel*  
 10 violētius inuenies: si quidē dolorē veluti *conturba-*  
 cauterium excitat, sed diutius durat eius *tus sum,*  
 operatio. Itaq; Archigenes inferēs, inqt: *vel percul-*  
 Igitur intolerabilem habet dolorē, neque *sus vorti-*  
 ulli vel maximorū præsidiorum cedit hoc *poteſt.*  
 medicamentū. At verò ex sinapi, nastur-  
 tio, grano gnidio, vua taminea (staphida-  
 griam Græci vocant) apophlegmatismos: *Apophle-*  
 instituit, ac sternuramenta mouere, & po- *gmatis-*  
 tiones propinare iubet: vtraque ex vehe- *mus Ar-*  
 20 menter calidis aridisq; medicamentis cō *chigenis.*  
 ponēs. Vt facile cōstet ipsū credidisse, ad  
 humiditatē & frigiditatē, vel cerebri, vel  
 membranarum, hanc dispositionem perti-  
 nere. Huiusmodi enim dispositio, si calua-  
 riam tantū affecerit, hominē memoriā  
 haudquaquā priuabit. Verū hæc obiter  
 propterea dixerim, quod exiccantia calo-  
 rificaq; remedia inducit: quāquā nusquā  
 ab ipso explicatū est, humore frigoreque



obliuionē cōstare. Sed quis nō indignabī  
tur, vidēs caput tātis vexati negotiis, alia  
videlicet parte affecta? Cæterū id quod  
de cucurbitulis ab initio indeterminatē  
protulit, postea pergēs huiusmodi verbo-  
rū serie manifestissimē declarat: Atq; irri-  
tationes (inqt) quas sinapi, cucurbitulęq;  
lenes intulerūt, leuare oportet. Sunt autē  
interdū mitiores, interdū vehementiores  
esse solēt. Atq; efficaciores sūt illę, q̄ cōcisā <sup>10</sup>

*Remedia  
alia ra-  
tione, alia  
experien-  
tia, qua-  
dam utrā-  
que via  
inuenta  
sunt, &  
experien-  
tia eorum  
est quæ  
plurimum*

Archigenes, nulla tibi suffragari ratio po-  
test, quāobrē capiti ista adhibeas, si affe-  
ctio cōsistat ī corde. Neq; ab experimēto,  
vť interim empiricos alloquamur, talia  
posūt inueniri. Aestuās q̄ spiā sub ardēte  
febri, frigidā aquā per intēperātiā inges-  
sit, & nonnihil præsidiij expertus, medicis  
imitationis viā sine rationali indicatione  
aperuit. Cucurbitula verò, nulla occasio- <sup>20</sup>  
ne duce, sed sola īdicāte ratione adhibet.  
Neq; enim sua spōte cucurbitula sese ad-  
est aptare, neq; etiā si hoc det, per occasionē  
plurimum

& certa ratione fiunt, vel eorum quæ casu aliquo vel rarò  
quidem & sponte sua accidunt κατὰ τὴν ἐξουσίαν. Itaque  
complexionem quam Philosophi κατὰ διαίρεσιν appellant,  
persequitur Archigenes, vt ostendat, nullo modo inuenta  
remedia, si memorię sedes in corde est.

aliq



aliquā capiti adhiberi potest, præsertim in ea affectione, quæ rarò euenire solet. Interroganti verò mihi nostræ tempestatis Medicos, præcipuè senes, & exercitados curassent ne vnquā huiusmodi affectum? oēs penè respōderūt, nunquā id se tētasse, vno dūtaxat excepto, qui diceret curationem quidē aliquando se aggressum, nihil verò profecisse. Quo pacto igitur eorum, *10* quæ casu quodā accidunt, auxilia, vel experimento vel imitatione cognoscemus, cū rarò eueniat huiusmodi affectus: neque fieri possit, vt cucurbitula per occasionē capiti adaptetur? Frigidæ enim potio, *Frigida potio.* cæteraq; id genus remedia, quorū quotidie in multis creberrimū facimus periculum, per experimēta inueniri possunt: sed cucurbitulæ appositio, siue cōcisa prius cute, siue ea integra fiat ab experiētia occasione *20* accipere non potuit. Quū enim reliquarum actionū sedes quamuis nō exactè ad inuentionē tamen remediorū, satis sensibus dignoscantur, in memoria id cōcedit minimè. Reliquas voco affectiones, vt lateralem morbū, peripneumoniā, nephritidem, dispositionem colicā, hepaticam, splenicā, aut vesicæ, aut vteri affectus, atque id genus cæterarum partiū. In quibus omnibus, & dolores, & ea quæ per



Catoche.  
Catale-  
psis.

meat<sup>9</sup> excernuntur, & si nō exactissimè sal-  
tē in latitudine sedē affectā declarāt. In la-  
terali enim morbo, facilē est vniuerso la-  
teri adhibere quicquid volueris, similiter  
vētri in colica, quemadmodū si hepar aut  
lienis inflammetur, prācordiis, atq; haud  
secus in cāteris partibus. Deperdita verò  
memoria, nullū affecti loci signū neq; tu-  
mor prēter naturā, neq; dolor aliq; s, neq;  
excretio, neq; aliud quidpiā extat. Quēad 10  
modū neq; in melācholia, phrenitide, ma-  
nia, morbo comitiali, lethargo, sopore, &  
in ea affectione quā recētiore medici ca-  
tochen, id est vigilātem soporē nomināt,  
atq; catalepsi, id est occupatione: ac ne in  
iis affectib<sup>9</sup>, q. vel toto corpore residēt, vt  
spasms, & saltib<sup>9</sup>: vel altera dūtaxat me-  
diate, vt paralyti: nullū eīm signū ab his  
tāquā ex radice p̄dit. quippe neq; tumor  
prēter naturā, neq; dolor neq; color à prio 10  
ri mutat<sup>9</sup>, neq; excremēta, vnde Archige-  
nes potuisset iuenire remedia: siquidē nu-  
gaces sunt empiricorū occasiones, atq; Ar-  
chigenis sermones ducit ad cor. Verū si cō-  
cedamus ab experiētia dictarū affectionū  
auxilia p̄diisse, nūquid manifestē depre-  
hendet falsa illorū arrogātia q. dogmati-  
ci vocātur? ac ne simplex quidē illa repre-  
hensio erit, sed gemina, atq; vtrāq; fortis.  
Si



Si enim vsq; adeò vtile est experimētū, vt  
 nō solum citra rationē inueniat remedia  
 verū etiam cōarguat rationē tāquā aper-  
 tē falsam, tātū abest, vt ratio dogmaticis  
 medicis sit vsui, vt etiam nocere videat. Sed  
 (vt aiūt) satis reprehēdit id qđ inutile esse  
 ostēditur. Quòd si ratio aliquādo etiam no-  
 cere videatur, qđ maius argumentū desi-  
 deras, quo ratiōis vitiū ostendatur? Porro  
 10 multas de principe vi animę ratiōes, dia-  
 lectico more interrogando inductas, vnā  
 cum affectorū locorū vsu, quib⁹ euincere  
 possis, in animalib⁹ affectib⁹, auxilia cor-  
 di adhibēda esse, ita subito cōtēpsit Archi-  
 genes, alioqui in curādi ratione exercita-  
 tissimus, vt neg lecto pectore, capiti cucur-  
 bitulas adaptaret: ipsumq; licet haudqua-  
 quā affectū & incideret & vreret. Nū igit⁹  
 per Iouē mētitus sum pauloantē, cūm di-  
 20 cerē rationalem viā, qđ ad remediōrū in-  
 uentionē pertinet, oīno prodi ab his scili-  
 cet qui patriæ, quā sectę suę pditionem  
 æquiori ferrēt animo? quippe proditiōnē  
 esse arbitrātur, si vera dicendo, dissentien-  
 dū sit iis, quib⁹ ea secta defenditur. Igitur  
 vt in præsētia turpem cōtentionē mani-  
 festē declarāt, sic etiam haud obscurē de-  
 mentiam suā produnt: cūm putant omnia  
 sua decreta turbari, si aliquādo vel in vno



*Variorum philosophorum placitorum enumeratio.* reprehendantur. Placitorum enim alia mutuam consequentiam coherent, alia inter se pugnant, alia neque consequuntur sese, neque pugnant necessario: ut in hac ipsa de principali animae potestate, quaestione: siue enim in corde, siue in capite sedem ei statueris, poteris de naturae elementis, quaecumque volueris eligere opinionem, cum priore sententia neque pugnam, neque consequens aliquod adducendo: haud secus de generatione quo- 10 que & corruptione, de animae essentia, de diis, de providentia, de fato: item genitus ne sit mundus, an ingenus, finitus, an infinitus: praeterea an plures sint mundi, numeroque; incomprehensibiles, an unus duntaxat. quippe nulli iam dictorum placitorum repugnat, neque ad ullum ipsorum sequitur, ea quae de animae ut principali habetur opinio, siue in corde, siue in cerebro eam contineri

*Sedes animae praecipua.* dixeris. Itaque universam suam sectam doctrinam 20 gnatici producit, qui huiusmodi scribunt curationes, cum de praecipua animi vi adeo manifeste sint demonstrationes, ut omnibus ferè hominibus nota sit pars in qua residet, solis Medicis summisque philosophis qui in corde eam collocant, non appareat. Demonstrationes vero ipsas, in commentariis quos de Hippocratis Platonisque decreveris edidi, iam dixi. Porro rationalem animam



animæ vim in cerebro, virilem verò atq;  
 irascibile in corde, cōcupiscibilem in ieco-  
 re sitam esse, nemini nō persuasum est. Id  
 quod quotidie dicētes audiendo, discere  
 licet. Quippe fatuū aiunt cerebrū nō ha-  
 bere: timido & pusillanimi, corde esse. Ti-  
 tyo verò iecur ab aquila erosum, nō solū  
 poëtæ, verū etia pictores sculptoresque  
 fingūt. Sed tēpus est vt ad propositū redea-  
 mus. Sanè in confesso est omnib<sup>9</sup> Medicis  
 si opera spectes quæ rationali potestate  
 affecta laborātes faciūt, caput propriā ra-  
 tionis esse sedē. proinde cōsiderem<sup>9</sup> oportet,  
 qualis sit in vnaquaq; affectione dispo-  
 sitio, de læsa memoria principiū faciētes:  
 siquidē de ipsa loqui statuimus, hæc autē  
 affecto cerebro nobis occurrit, vitiata si-  
 mul quodāmodo ratione. Quemadmodū  
 si ratio lædatur, memoriam quoque lædi  
 contingit, vtriusq; noxā ab eādē dispo-  
 sitione procedente, quæ vbi vehementius  
 intenditur, simul cū memoria ratio quo-  
 que deperditur: quæ affectio, stultitia no-  
 minatur. Sic in lethargo etiā, atq; omnib<sup>9</sup>  
 soporosis affectionib<sup>9</sup>, vtræque pereunt.  
 Atque dispositionem ipsam, secundū pri-  
 mum genus, similem esse necesse est, nepe  
 intemperiem. Iam enim explicauimus eā  
 similiarium partium, quæ primò operātur

*Tityus à  
vulture  
Verg.*

*Caput p-  
pria ra-  
tionis se-  
des.*

*Memoria  
læsa.*

*Stultitia.  
Sopor.  
Lethar-  
gus.*



*Anima-* communē esse dispositionē. Secundū ve-  
*lia laten-* rō alterū genus, frigida oīnō intēperies  
*tia.* est: hæc enim animales actiones torpidas  
 efficit q̄ animalia quæ per frigora late-  
 re cogūtur, haud obscure declarāt. Id etiā  
 in frigidis medicamētis videre est, ac fri-  
 gidis quoq; cibis: siquidē lactuca graues  
 inducit somnos, si multā ipsius quātitatē  
 quis ingesserit. Verūm etiā capitis graui-  
 tates quę videlicet sine mordaci infestāt i o  
 dolore, somnū, soporēq; afferūt, quibus a-  
 pophlegmatismi magnificē opitulari vi-  
 ri videntur. Ad hæc nō mediocri argumen-  
 to sunt, capitis & ardor & refrigeratio, si-  
 quidē ardor, vigilias: refrigeratio, soporē  
*Vigilia* inducit. Itē biliosi calidiq; morbi, vigilias  
*Sopor.* deliria, phrenitides: cōtrā pituitosi frigi-  
*Balnea.* diq; ignauia, soporēq; efficiūt. Quippe qđ  
 ad vigilias soporesq; p̄ morbos p̄rinet, ca-  
 lida frigidaq; intēperies primā sibi facul- 20  
 tatē vendicat: altera verō ab hac, ad humi-  
 ditatē ariditatēq; refertur. Nā balneę, eō  
 q̄ caput madefaciūt, soporiferę sunt. haud  
*Vini mo-* secus vini moderata potio, oēs cibi hume-  
*derata po-* ctantes: atq; ex ætatib<sup>9</sup> pueritia quidē, ob  
*tio.* humorem somnolenta est. Senes verō, ob  
 23. *Apho.* ariditatē, vigiliis vexantur. Igitur omnia  
 4. *in con-* hæc argumento esse possunt, ad animi  
*ment. gal.* ignauia inducendā, humiditatem præter  
 naturam



naturā, secundas partes obtinere: frigiditatem verò priores. Proinde ut humiditas abundās, vel sola, lōgos profundosq; somnos: ita & ariditas quoq; sola, vigilias efficit. de quib⁹ dispositionib⁹ ab Hippocrate dictū est: Somnus aut vigilia, si alterutrū modū excessit, malū est. Quòd si frigus cū humore vehemēter intēdatur, soporē, stuporemq; cōstituit: sine hoc verò, memorię nocet, stultitiāq; inducit. Quum itaq; nō solum in frigiditate humiditateq; verū etiam in ariditate, & calore, non parū, secundū magis & minus, sit discriminē: nihil mirum si multifarię inueniantur causę, quę animales actiōes lādere possint. Cæterū clarioris doctrinę gratia, rationalis animę actiones, principales: irrationalis verò, morales vocētur: sed has in præsentia silentio præterire decreuimus, non dū enim vel cordis, vel iecoris affect⁹ tractare pponimus. Igitur quēadmodū somnus, & vigilia, si modū excesserint, ille ob humiditatē, hæc verò ob intēperantiā fit aridam: ita & in his ipsis, & magis, & minus, tum in somnis, tum vigiliis, sequitur maiorē aut minorem, vel humiditatē vel siccitatem. Cumq; bifariā (ut iam declaratum est) fiant huiuscemodi intemperies, duplex quoq; erit vtriusque dispositionis

De senibus. 3. Apho. 3.

Actiones principales.

Actiones morales.



*Vigilans  
sopor.*

*Mixta  
dispositio-  
nes.*

*Qualis ty-  
phomania  
primo Pro-  
rhetic.*

modus: vnus quidem in humidis ficcisq;  
humoribus, alter verò in corporibus so-  
lidis, si aliquādo in easdem intēperies so-  
lidæ partes atque humidæ inciderint. Præ-  
tereā quamuis iam dictæ tēperies sint cō-  
trariæ, fit tamen ex ipsis mixtum quoddā  
temperamentum, vt in vigilanti sopore,  
quum pituitosus biliosusque humor abū-  
dauerit. Ita in calidi frigidiq; contrarieta-  
te, eosdem quoque modos inuenire licet, 10  
tum simplicibus intēperantiis, tū ex am-  
babus cōpositis. Pituitæ enim si bilis m-  
sceatur, flauam dico, mixta fit ex calido  
frigidoque dispositio. Quod si in solidis  
corporis partibus mixtā in contrariis di-  
spositionem fieri fateamur, tres ab ipsa  
prodibūt ex vtraq; contrarietate intempe-  
ries. Igitur huiusmodi affectus omnes ce-  
rebro aduenire solent, sed inter se differ-  
runt, nō solum mixtionis varietate, aut eo 20  
quod magis minúsve intendūtur, tum in  
simplicibus, tum mixtis dispositionibus:  
verū etiā quod vētriculi cerebri inter-  
dum afficiuntur huiusmodi intemperan-  
tiis, interdum vniuersa eius vasa, aut hu-  
miditas quæ per corpus cerebri dispersa  
est. Accedit ad hæc quartus quoque mo-  
dus, quum videlicet ipsummet corpus ce-  
rebri intemperatum redditur.

De



*De stultitia, sopore, lethargo, phrenitide, mania, & convulsione.*

CAPVT

V.

**Q**Vorum itaque vel memoria, vel intellectus perit, somnos obseruare oportet (quippe intellectus amissio stultitia est) vtrū vehementer, an modicè somnolēti sint, aut omninò nō somnolēti, sed quantū ad somnū pertinet, secundū naturā sese habeant. Sic enim vincentem inuenies intēperiem. Præterea cōsiderādū est, vtrū excernāt quippiā, vel ex naribus, vel ab ore, quod à capite defluat, an aridę huiusmodi partes sint: quippe ex iis dispositionē ipsam cōiecturā cōsequi poterim⁹. Quēadmodū in destillatione & grauedine vsu venit: siquidem in iis, & qualitas & quātitas excrementorū, atq; causarū quæ præcesserūt contēplatio, capitis dispositio nē declarar: siue calida fuerit, vt in vstione: siue frigida, vt in refrigeratione. Nisi enim omnia hæc discretè cognoueris, idoneam dispositioni curationem haudquāquam inuenies. Cū igitur vel perit, vel grauiter læsa est memoria, frigida omninò intēperies est: quocirca calefacere ipsā oportet: at verò exiccare, aut humectare, nō necessariū est: sed si humiditati copuletur, arefacere: si ariditati, madefacere. Cæterū

*In stultitia somnus obseruandus.*

*Destillatio.*

*Grauedo.*

*Amisssa memoria.*



terū si inter has mediū obtinet, ipsum cō-  
seruare oportet. Equidē noui quendā, qui  
ob laborem in studiis atq; vigiliis, memo-  
riam penē amiserat, lēsa etiā ratione. Item  
agricolam, qui ob labores quos vites colē  
do subierat, ac tenuē victū, eodem modo  
affectus est, atq; ij certū est quòd exiccan-  
tibus, calorificisq; lædebantur, madefaciē-  
tia verò, quæ calefaciendi quoque vim ha-  
berent, haud mediocri ipsis erāt præsidio. 10

*Lethar-  
gus.*

*Phrenitis.*

*Mania.*

*Melan-  
cholia.*

*Primoge-  
nius affe-  
ctus.*

*Affectus  
per con-  
sum.*

Itaq; læduntur etiam cū febris principa-  
les animæ functiones, vt in phrenitide, &  
lethargo: interdū sine febris vitiū est, vt in  
mania, & melancholia: id quod modò per  
cōsensum, modò primaria affectione cere-  
bro laborāte accidit. Quū igitur propriis  
accidētibus exactē discernūtur huiusmo-  
di vitia, & perpetua sunt, neq; aliis præce-  
dentibus superuenerunt, primogenia affe-  
ctione: quū verò propriis accidētibus dis- 20  
cerni nō possunt, neq; perpetuò permanēt,  
atq; ad alias affectiones cōsequuntur, per  
consensum ipsa constare dicimus. Neque  
latere nos debet vbi per cōsensum quis af-  
ficitur, fiatq; adhuc affectio, quòd deletis  
efficientibus ipsam causis, ipsa quoque si-  
mul deletur. Si verò consentientes partes  
permanentem iam habeant dispositionē,  
quamuis quiescat causa efficiens, ipsa ta-  
men



men permanebit affectio. Igitur quòd in cerebro cōsistāt omnes principaliū animę virium affectus, in confesso habēt omnes Medici, nisi quis vni fortasse sectæ addi-  
ctus, aliter in animo sentiat, aliter depro-  
mat ex ore. At qualis sit intēperies, nō sine negotio inuenitur, medicūq; requirit, non  
qui laboret quomodò antiquis cōtradicat  
de animę principatu, re adeò aperta, & per  
10 spicua, vt eā in cerebro esse, etiā inter pri-  
uatos cōueniat: sed qui laboriosus sit, & in-  
quirendo nō defatigetur. Sed philosophis  
fortasse, vtpote in angulo sedentibus, faci-  
lius pro hoc errore quis veniā dederit. Me-  
dicis verò, qui iā in operibus ad senectutē  
vsq; versati sunt, ignosci sua cōtendendi li-  
bido, vel dicam veriùs impudentia, nō de-  
bet: quippe qui vigilantibus, delirantibus,  
phreniticis, lethargicis, caput irrigare cō-  
20 sueuerunt. Nam & Archigenes quoq; vbi  
vitiata memoria medicanda est, aut stul-  
rum medicari aggreditur, capiti remedia  
adhibet. Quis vnquam exercitatus Medi-  
cus apoplexiā, morbū comitiale, opistho-  
tonon, emprosthotonon, tetanon, aliter  
curauit? quis denique mediam partē cor-  
poris resolutam? Nunquid verò vbi nerui  
conuulsione afficiūtur, omnes Medici vel  
experimēta etiā p̄fessi, summā curationis  
esse



esse cēsent, primis vertebris remedia adhibere: quemadmodū vbi media quoq; vniuersi corporis pars soluta est. Porro cerebrum quoque calfaciunt, quemadmodum apoplecticos quoq; curare consueuerunt. Sic etiā per morbum comitialē. At quum vel in stomacho, vel in alia quapiā parte affectio cōsistit, eam maximē & in primis curare prācipiunt. Cerebrum verò ita prēparāt, vt nō ita facilē afficiatur. Hęc itaq; 10 potissimū inquirēda sunt, non principa-

*Hic Ari*

*stote. se-*

*quuntur*

*lib. 3. cap.*

*5. de hist.*

*animal.*

*Nervo-*

*sum ge-*

*nus nō so-*

*lum ner-*

*uos pprie*

*appella-*

*tos, sed*

*et tendo-*

*nes et li-*

*gamenta,*

*et quicquid aliud ex angue membranosū me veteri usur-*

*patione comprehendit. 6. Epid.*

lis animę vis, quā nemo, nisi peruersa fuerit mente, nō apertissimē cognoscit. Neq; neruorum originem, diuinantium more, à diis petere, sed ab experto dissectore discere oportet. † Sunt enim nonnulli qui si bi iam persuaferunt, neruos à corde oriri, eo quòd nequeunt inter syndesum, neruumque discernere: quibus nō nihil etiam suffragari videtur ipsa homonymia: quippe copulę, à multis medicorū, colligantes nerui appellantur. Verū nulla vexabimur nominis inuidia, si modò non syndesmos ipsos, sed voluntarios (vt ipsi aiunt) neruos intelligāt, quos scilicet à cerebro initium accipere dicimus. Neq; enim illi, aut con-

20

uulsio



uulsiōe, aut paralyfin, ad syndesmos refe-  
runt: sed eorum neruorum qui voluntatis  
imperio obediūt, affectionem esse dicunt.

Conuulso enim vniuerso corpore, omnes *Cōuulsio.*  
quidem autumāt affici talem quampiam  
partem, quæ vt in arbore caudex ramorū,  
sic ipsa sit omnium neruorum communis  
origo: idq; veluti caudex, nō paucorum in  
vna parte, quemadmodum ramus, vt si vel  
10 crus, vel altera manus fortè fortuna cōue-  
latur, totius mēbri conuulsio, neruorū qui  
ad ipsum proueniūt, originē affectā fuisse  
declarat, rami cuiuspiā exēplo in arbore.  
Quod si vniuersum corpus afficiatur, com-  
munem originē omniū infra faciem ner-  
uorū, quæ arboris caudici proportionē re-  
spondet, affectam esse putandum est: quæ  
sunt primæ spinalis medullæ partes. Proin-  
de exercitissimi quiq; medici huic reme-  
20 dia adaptāt: cordis verò in hac affectione  
nullam omnino mentionē fecerunt. Si ve-  
rò simul cum vniuerso corpore, facies quo-  
que cōuulsa videatur: nō solū eam par-  
tem quæ ex spina procedit, verū etiā ce-  
rebrū ipsum curamus: etenim labra quo-  
que sæpenumero conuulsa videmus, item  
oculos, frontis cutē, totam mandibulā, si-  
militer & lingue radicē. At quia omnes iā  
dictas partes, à musculis ex cerebro ner-  
uos



uos suscipiētibus, moueri ex anatomicę di-  
dicimus, cerebrū, ipsis sic laborātibus, cre-  
dimus esse affectū: vbi verò ipsis illæsis, cę-  
teras partes cōuelli viderim⁹, spinę initiū  
affectū esse fatemur. Hęc igitur sunt quę  
prōptē discere, mox ipsorū dispositiones  
cōsiderare oportet. Sed sunt nōnulli medi-  
ci, qui dispositiones ipsas ne aggrediūtur  
†*Interp.* quidē [disquirere] sed certant super rebus  
manifestē apparentibus, iacturamq; tēpo-  
ris nos facere cogunt, quod non erat cōsu-  
mendum respōdēdo iis, qui recta medico-  
rum [veterū] decreta euertunt, sed inueniē-  
do potius ea, quę illi silentio pręterierūt:  
& vel haud quaquām res ipsas definierūt,  
auteas sine demōstratione aut sine idonea  
definitione, aut nō satis abūdē explicaue-  
runt. Quemadmodū Hippocrates, vbi ner-  
uorum conuulsionē, vel ob plenitudinem  
Lib. 6. vel vacuitatē fieri dicit. Etenim verus est 20  
Apho. 39 sermo eius, quibus verò rationibus fulcia-  
tur, vt fides ei adhibēda sit nō popularib⁹,  
sed doctis dūtaxat viris, & qui diligenter  
prima Medicinę rudimēta didicerūt, notū  
est. Hęc igitur quū didicissem, facilē mihi  
persuasi, cōuulsionem fieri ob eas causas,  
quę ab Hippocrate dictę sunt. quippe si  
omnis motus qui à volūtate procedit, at-  
tractis musculis in eas quibus innascūtur  
partes,



partes, fieri videtur, neq; possit fieri attractio, nisi ad suā originem retrahatur musculus: cōstat conuulsionē in cōuulsis partibus factā, hac sola ratione à motu naturali differre, quòd præter voluntatem [nostram] sit. Itaq; quemadmodum in eo, qui secundum naturā habet, voluntas in cerebro iuxta neruorū origenē ordinata, motionis principiū primis dat neruis, ac per ipsos musculis, ita si sine huiusmodi principio inuenerimus, quæ causa neruos cōuellere possit, modū quo cōuulsio fiat, nos iā scire nō temerè profitebimur. Etenim si videris aliquando neruosa corpora, vt lyræ chordas, ob ambiētis aëris immodicā intemperie, adeò vehementer, vt rūpantur, intentas, haud difficulter intelliges, idē in animantiū quoq; neruis posse cōtingere. Sed quomodò affecto aëre tēduntur chordæ vt rūpantur, si vel nimis aridus, vel admodum humidus sit? Nēpe humor madefacit ipsas, vt in tumorē præter naturā attollātur, qui mox eas extēdit: ac veluti sol tergora arefaciens contrahit, ita siccitas, chordas & trahit, & extēdit. Sic lora quoq; quum ad ignem exiccantur, contrahi tendiq; videntur. His ita præcognitis, haud difficile inuentu fuerit, vtrū ab ariditate, quæ est humide essentiæ defectus, & vacua

*Voluntas in cerebro, motionis principium neruis præbet.*

*Comparatio neruorum ad fides lyricas & lora.*

K



*Ariditas.* tione, an ab humoris plenitudine, quæ ege  
*Repletio.* statim aduersat, & ab Hippocrate repletio  
 nominata est, affectus ipse prodierit. quippe  
 quæ conuulsio fit vel à labore, vel vigiliis,  
 vel fame, vel sollicitudine, vel arida æstuā-  
 teq; febris, qualē in phreniticis videre est,  
 causam eius esse ariditatē, vacuationemq;  
 rectē putaueris. Si verò tumulto cuiuspiā  
 ac omnino pleno homini, qui videlicet in  
 otio degit, id euenire conspexeris: non abs-  
 re à contraria causa conuulsionem ortum  
 habuisse iudicabis. Atqui euacuationi cō-  
 traria est repletio. Atque morbus quoque  
 comitialis, conuulsio est omniū corporis  
 partiū nō perpetua, vt in emprosthotono,  
 & opisthotono: atq; tetano (id est, neruo-  
 rū rigore) videre est, sed quæ ex tēporum  
 accidit interuallis: neq; solū hac re, sed  
 mētis quoq;, ac sensuum oblesione, à iam  
 dictis conuulsionū generibus differt: vn-  
 de cōstat in supremis corporis partib⁹, ce-  
 rebro videlicet, hunc affectum consistere.  
 Cæterū velox eius discussio, crassum hu-  
 morem spiritus meatū in cerebri ventricu-  
 lis obstruentē, hunc maximē affectū pepe-  
 risse declarat, neruorū principio seipsum  
 quatiente, quo excutiat id quod noxium  
 est. Ac fortassis per morbum comitiale  
 conuulsio haud adsimilis est his quæ à spi-  
 nali



nali medulla incipiunt cōuulsionibus, singulorum nervorum irrigatis processibus. Verūm non ab ariditate vacuationeq; sed à crasso semper humore, hāc affectionem induci, argumēto est, quod & subito fit, & soluitur confestim: nam subitariam meatuum obstructionem, à crasso viscosoque humore fieri constat. Etenim brevi tempore fieri non potest, ut vel cerebrum, vel tenuior ipsius membrana, ad tātam perveniat ariditatem, ut corio simile quippiam pati videatur. Accedit ad hāc, ut is qui sic laborat, neque videat, neq; audiat, neque vilo sensu quicquam percipiat, ac ne consequi quidem possit, quid factum sit. Si quidem cum memorię viribus ratio quoque læditur. Ex his igitur omnibus planè constat, in cerebro hanc affectionē consistere, impediēte humore animalem spiritum qui in ventriculis eius cōtinetur, quo minus possit exire. Porro quamobrem hic spiritus vocetur animalis, aut quæ sit eius potentia, in eo commentario, quem de Hippocratis Platonisque placitis scripsimus, iam demonstratū est. Sanè quum ea, quæ per dissectiones apparere solent, accuratè consideraremus, rationi consonum videbatur, animā in cerebri corpore sedem obtinere, atque in ipso & rationis vim, &



sensibilium imaginum memoriã residere, ac primum ipsius instrumentũ, tum in sensibus actionibus omnibus, tũ in his quæ à consilio & voluntate prodeunt, spiritum esse qui in ipsius vetriculis maximeq; postremo, continetur, quamuis non contemnendus sit medius vetriculus, perinde quasi non valentissimus sit: multis enim rationibus inducimur, vt hũc amplectamur, duos verò anteriores deferamus. Verũ exacta<sup>10</sup> horum notitia ad curationis inuentionem nihil ferè conducit. Nã satisfuerit ad probè curandum, nosse sedẽ affectam esse cerebrum, atq; in eius ventriculis humorem crassum & viscidum comprehendi. Igitur quemadmodũ hæc ad curationes quarum gratiã, & affectas sedes, & earũ dispositiones inquirimus, sunt vtilia: sic crassorum quoq; humorũ differentia, vtrũ videlicet pituita, an atra bilis naturã habeãt, haud<sup>20</sup> mediocriter ad curationẽ conferre videntur. Si tamẽ in præsentia nõ obliuiscamur pituitosos quidem eos nominari, quũ simpliciter ita dicimus, in quibus humiditas frigiditasq; melancholicos verò in quibus siccitas atq; frigiditas dominatur, quamuis magnæ peculiareq; interim differentia, tum pituita, tũ atra bilis inueniatur. Pituita quidem vnũ genus est, quod quotidie

*Pituita.  
Atrabi-  
lin.*

*Pituita  
differen-  
tia*



ridie vel screādo, vel vomendo, vel emun-  
 gendo educitur, vaporoso scilicet spiritu  
 plenū, vt ne sensum quidē lateat, ipsum es-  
 se dissimulare. Alia verò pituita, similis  
 quidē videt, licet fortasse nō sit similis,  
 qualis est crudus humor qui in vrinis sub-  
 stat tū is qui à Praxagora vitreus appella- *Vitreus*  
 tur. Atq; ex hoc genere esse videtur saliuā, *humor.*  
 quę neq; fluida admodū est neq; aquosa. *Saliua.*  
 10 Verū saliuā nō vnica dūtaxat qualitate  
 gustū afficit, nedum vniuersa pituita. Sæ-  
 penumerò enim & acré & acidam, & †sal- *† Salsam,*  
 sam in ore saliuā, manifestè deprehendi- *vel à pu-*  
 mus, veluti cū sani degimus, nulla qualita- *tredine,*  
 te infecta, sed perinde quasi aquosa, saliuā *vel à sal-*  
 gustui offertur. Sic atra bilis quoq; secun- *se humi-*  
 dum substantiæ varietatem non obscuras *ditatis se-*  
 habet differentias. Nā alia est veluti fæx *rosa mi-*  
 sanguinis, quę admodū spissa est, fæcib⁹ vi- *xtione.*  
 20 ni haud absimilis. Alia verò, quā superior *Atræ bi-*  
 essentiæ est multo tenuioris, atq; vomēti- *lis disse-*  
 bus eā, & olfacientibus acida videtur, quę *rentia.*  
 etiam terrā radit, at tollit, & fermētat atq;  
 ampullas quales feruentibus iusculis su-  
 pernatatē videmus, excitat. Sed ea quam  
 crassā fæci similem esse dixi, in terrā effu-  
 sa, non inducit fermentationem, nisi fortè  
 in ardente febris ipsam præassari cōtingat,  
 neq; vlla etiā acida qualitate participat,



*Morbus  
comitia-  
lis ab a-  
tra bile.*

quandoquidē & ipsam nominare consue-  
ni melancholicum succū, aut melancholi-  
cum sanguinem. Hæc enim, meo quidē iu-  
dicio, non rectè atra bilis appellari potest.  
Prouenit autē huiusmodi humor in qui-  
busdam plurimus, vel à téperie ab initio  
cōparata, vel à cibis, qui (quū in venis con-  
coquūtur) in huiusmodi humorē transmu-  
tari solent. Igitur vt crassus pituitę succus,  
ita hic quoq; comitiales morbum solet  
efficere, vbi in meatibus ventriculorū ce-  
rebri retinetur, siue is medius sit, siue po-  
stremus. Vbi verò in ipso cerebri corpore  
abundat, eam insanix speciē, quam Græci  
melancholiā vocant, efficit. Quemadmo-  
dū alter atrę bilis succus, qui præassata fla-  
ua bile nascitur, ferina deliramenta indu-  
cit, modò sine febre, modò cū febre, in ce-  
rebri corpore abundās. Atq; hanc ob cau-  
sam phrenitis nonnūquā mitior est, quū  
videlicet à pallida bile ortū contraxit: in-  
terdum vehementior, quū flaua bilis eam  
peperit: atq; insuper alia nonnunquā de-  
mentia occurrit ferina & melācholica, fla-  
ua bile præassata. Deliria autē, quæ per fe-  
brium vigores accidunt, non propria cere-  
bri affectione, sed per consensum fiūt: pro-  
inde eos delirare & desipere, non solum  
Medici, sed priuati quoque dicere consue-  
uerunt.



uerunt. Verum ita affectos non nominant  
 phreniticos, eo quod phreniticorum in-  
 sania non quiescit, mitigato febrium vi-  
 gore. Igitur quemadmodum phreniticis,  
 febris vnum quoddam accidens disposi-  
 tionum cerebri censetur: sic (è conuerso)  
 in ardentium Febrium dementia, multis  
 elatis ad ipsum vaporibus. Haud secus fit  
 ea affectio quæ suffusioni in accidentibus  
 10 similatur, à ventriculi dispositionibus or-  
 tum trahens. Nam cerebrum ventriculo,  
 & ventriculus cerebro, suas affectiones  
 transmittit, idque propter neruorum à ce-  
 rebro ad os ventriculi descendantium ma-  
 gnitudinem, per quos etiam sensus huic  
 particulae, quam vlli reliquarum corporis  
 partium, acutior est. Quocirca capitis fra-  
 cturas, quum ad membranas vsque perue-  
 niunt, biliosus vomitus, ac interdum dolo-  
 res capitis quomodocunque fiant, nausea,  
 20 stomachique morsio comitatur. Hypo-  
 chondriacas verò & flatuosas vocatas af-  
 fectiones melancholica: tristitia sequitur,  
 haud secus quam acutam febrem demen-  
 tia, & quibusdam oris ventriculi disposi-  
 tiones, ea quæ in accidentibus suffusioni  
 similatur affectio. Sic neruosis partib<sup>9</sup> in-  
 flammatis, promptius quam reliquis, deli-  
 rium superuenire solet, idq; ascendente ad

*Suffusio.**Sympa-  
thia ven-  
triculi cū  
cerebro.**Capitis  
fractura.**Hypocho-  
ndriacæ  
affectio-  
nes.*



*Vapor.* caput interdum per continuas partes solo  
*Fumus.* calore, interdum verò spiritu vaporoso,  
*Fuligo.* vel fumoso, aut fuliginoso.

*Multa ac ferè omnia quæ hoc capite dicuntur, in opusculo de melancholia scripta sunt, quod alij Hippocrati, quidam Galeno: nonnulli Ruffo & Possidonio attribuerunt.*

## De melancholia.

## CAP. VI.

IC

*Crassi hu-  
mores in  
cerebro.*

*Hippoc.  
libro Epi-  
de. 6.  
par. 8.*

*Epilepti-  
ci.  
Melācho-  
lici.*

**P**ORRò quæadmodū hæ passiones, quibus caput per consensum afficitur, ita illæ quoq; q̄ primogeniæ ipsius affectiones sunt: non parum inter se differunt. Igitur crassi humores, qui in cerebri substantia abundāt, interdum ei vt instrumentali, interdum vt. similari parti nocent. Quum enim meatus obstruuntur, vt instrumētali: quum verò temperamentum alteratur, vt similari. Proinde totus hic sermo in fine 20  
 sexti libri de Vulgaribus morbis præscriptus est: Melancholici magna ex parte comitiali morbo afficiunt, & contrā morbo comitiali laborātes, efficiuntur melancholici. Arque horum vtrumlibet magis accidit, prout vel in hanc, vel in illā partē, infirmitas repit: si em̄ in corpus, epileptici: si verò in mentem, melancholici redduntur. Hoc sermone primū quidem declarauit quòd,



quod non semper, sed magna ex parte ho-  
 rum affectuū alter in alterū transit. Quip-  
 pe nō solum melancholicus succus, verū  
 etiam pituita morbum comitialē cōmit-  
 tit. Igitur ea quam melancholicus succus  
 constituit, in melancholiam transit: quæ  
 verò à pituita parta est, in aliam affectio-  
 nem, de qua paulò pōst dicturus sum, per-  
 mutatur, melācholiā verò haudquaquā  
 efficit. Altera verò Hippocratici sermonis  
 pars, non parū contemplandi locum de-  
 siderat. quippe quum anima sit aut tempe-  
 ramentum actiuarum qualitatum, aut ab  
 ipsarū temperamento permutetur: Bilem,  
 quū cerebro veluti parti instrumētali no-  
 cet, ad cerebri corpus cōverti ait, id quod  
 in obstructionibus fieri constat. Quum  
 verò temperamentum mutando, ei vt si-  
 milari nocet, ad mentem eam repere di-  
 cit. Verū hoc quod medici derelique-  
 runt, definire in primis necessarium esse  
 videtur. Nempe vt in manifestis corporis  
 partibus, interdum omnibus, eadem ap-  
 paret temperies, vt in morbo regio, & ele-  
 phante sic vocato, & aqua inter cutem, &  
 malo habitu, quæ à Græcis cachexia dici-  
 tur. Insuper in his quæ ab hepate, atque  
 splene pendent, colorum vitiis. Interdum  
 verò vnius duntaxat partis, quæ videlicet

*Anima.**Morbus  
regius.**Elephas.**Aqua in-  
ter cutem.**Cache-  
xia.**Coloris  
vitium.*



aut biliosum aut pituitosum [aut melancholicū] humorē suscipit, tēperies permu-  
tatur. Ita etiā cerebro accidit, vt nonnun-  
quā vniuerso in venis sanguine melan-  
cholico effecto, ob cōmune vitium, ipsum  
quoque lædatur. Nonnunquā verò, reli-  
qui corporis sanguine prorsus innocuo, so-  
lus is qui in cerebro cōtētus est, alteratur.  
idq; bifariam fit. Aut enim aliūde in ipm  
deriuat, aut in ipsomet melancholicus hu-  
mor genitus est, quū videlicet internus ca-  
lor aut flauam bilem, aut crassum atrūque  
sanguinem superassauit. At hæc distinctio  
non parū habet in curatione momentū:  
Sanguinis mis- siquidem vbi vniuersum corpus sanguinē  
sio in me- melancholicū continet, curationem a ve-  
lancholia. næ sectione incipere oportet. Vbi verò so-  
lum cerebrum, infirmus (quod ad hanc di-  
spositionē attinet) sanguinis detractio-  
ne non indiget, quamuis ob aliam quampiā  
causam sanguis mitti possit. Vtrum verò  
Melancholici sangui- an solū cerebrū occupet, ita discernendum  
nis nota. est. In primis vniuersi corporis habitum,  
qualis sit, cōsideres velim: meminerisque,  
quod mollēs, & cādidi, & obesi nequaquā  
humorē habēt melancholicum. Macri ve-  
rò, & nigri, & hirsuti, & qbus latæ sunt ve-  
næ, aptissimi sunt, vt huiusmodi i ipsi hu-  
mor



† ἐξ ἐπὶ τοῦ πρᾶν ῥιθμῶν, hic enim ἡ particula auget, Galeno interprete, atque hoc maximè si tristi & meticulosa natu-

mor cumuletur, fitque interdum ut † rufo non solum colore homines, affatim in melancholicā in melan-temperiem decidunt: atque post hos flavi, choliā incidunt, idque maximè, quādo & vigiliis, & multis sed ele-laboribus, & sollicitudine, & tenui victu phantia-fuerint educati. Quib⁹ hæ quoq; notæ cō- sin, quæ-ueniūt, an hemorrhōis aliqua restricta sit, tamen le-nior est. aut alia quæpiā cōsuetā sanguinis vacua- Cibi me-lancholi-tio, aut mulierū menstrua. Insuper quibus ci.

cibis quis fuerit vsus, vtrum iis qui suapte natura melancholicū sanguinē pariūt, an è diuerso. Porro qui melancholicū sangui- nē efficiunt, hi ferè sunt, caprina bubulāq; caro magisque hircinæ & taurinæ, sed ma- ximè asinorum camelorumque carnes, nam & his nonnulli vescuntur: item vulpi- nae caninæque carnes: atque magnam in huiusmodi sanguinis generatiōe vim ob- tinent ex lepore cibus, sed multo magis ex apris: ac limaces quoq; melancholicū san- guinem pariunt, si frequens sit eorū vsus: præterea omnes terrenorū animalium car- nes sale conditæ, aquatiliū quoq; carnes, ut thunni, balenæ, vituli marini, delphini, canis, atq; cetaceorū omnium. Ex oleribus autem, brāssica ferè sola, huiusmodi san- guinem

Lib. 3. ali-  
ment.



*Lentiscū  
gignit Ita  
lia, cuius  
resina ma  
stiche dici  
tur.*

guinem gignere consuevit, quē admodū  
& arborū germina, vbi vel muria, vel oxy-  
halme cōdiunt, præcipuē lentisci, terebin-  
thi, rubi, canirubi. Leguminū verò omniū  
maximē lentes, inter melācholicos cibos  
numerant, mox panis furfuraceus, & q̄ ex  
tipha, aque vitiatis seminibus factus est,  
quorū apud quasdā nationes vsus loco fru-  
menti habetur. Verū de iis in primo libro  
de Ciborum facultatibus iam dictum est. 10  
Præterea vina crassa nigraque aptissima  
sunt, vt ex ipsis melācholicus humor fiat,  
præsertim si q̄s abundē ipsa ingerēs, obla-  
ta occasione in multo corpus calore cōti-  
neat. Vetus denique caseus, vbi forte for-  
tuna in corpore fuerit supercalefactus, fa-  
cilē huiuscemodi parit humorē. Igitur si  
quis antea quā in morbū inciderit, huius-  
modi victus ratione fuerit educat⁹, maio-  
rē quandā inde licet facere cōiecturam. Si 20  
verò boni succi cibus vsus fuerit, cōsidera-  
re oportet exercitationes ipsius, mœstitiā,  
vigilias, sollicitudines. Sunt etiā nonnulli  
qui per febriles (vt dictū est) morbos me-  
lancholicum humorē contraxerunt: atque  
ad efficaciorē notitiā non parum confert  
anni tempus, ac præterita præsensque con-  
stitutio, item terra, ac laborantis ætas. His  
itaque omnibus præmeditatis, quū spera-  
ueris

*Melācho  
licus mor  
bus per fe  
briles mor  
bos cōtra-  
hitur.*



ueris in vniuersi corporis venis melācho-  
 licum sanguinem contineri, quo certiorē  
 habeas notitiam, cubiti venā seca, præci-  
 pueq; mediam, quæ cōmunis est, & ei quæ  
 humeralis nominatur, & ei quæ per axillā  
 ad manū ferrur. Quod si tū fluens sanguis  
 nō videat melancholicus, † statim suppri-  
 mat. Si verò talis appareat, vacua quātum  
 pro laborātis corporis habitu satis esse cō-  
 ieceris. Est prætereā tertiū melācholię ge-  
 nus, morbi comitialis exēplo, quū ortum  
 à vētriculo habuerit. Solētq; Medicorum  
 aliqui hanc dispositionē hypochondriacū  
 flatuosumq; morbū nominare. Verūm sa-  
 tis mihi fuerit ea accidētia pcurrere, quæ  
 à Diocle præscripta sunt illi asidere, in li-  
 bro cui titulus est, Affectio, causa, curatio  
 „ in quo Diocles ad verbū ita scripsit: Porro  
 „ alius oritur à vētriculo morbus, qui suprà,  
 20 propositis nō dissimilis est: nominaturq;  
 „ ab aliis melancholicus, ab aliis flatuosus,  
 „ quē sumpto cibo maximè coctu difficili,  
 „ & caustico, sputū humidum, idemq; mul-  
 „ rum comitatur: item ructus acidus, flatu-  
 „ ctus, in præcordiis fluctuatio nō illico, sed  
 „ quum retinuerint, interdū ventriculi quo-  
 „ que vehemētes dolores, qui nonnullis ad  
 „ dorsum vsque procedunt, cōcoctis deinde  
 „ cibis quiescunt, mox aliis ingestis eadem  
 rursus

*Vena me-  
 dia in me-  
 lācholicis  
 secanda.*

*† Statim  
 quidē, hoc  
 est detra-  
 ctis ferē  
 vncijs*

*duabus,  
 quia ali-  
 quādo ef-  
 fluit pri-  
 mum te-  
 nuis, sta-  
 timq; cras-  
 sior san-  
 guis conse-  
 quitur*

*Melācho-  
 lia à ven-  
 triculo  
 orta.*



rursus reuertitur accidētia, quę interdum “  
 ieiunos, interdū etiam à cœna molestant, “  
 atq; euomunt crudos cibos, & pituitā, vel “  
 subamaram, vel calidā, vel acidam: adeo “  
 vt nōnunquam dentes torpedine affician- “  
 tur. Atq; horum plurima ab ineūte statim “  
 ætate eueniunt. Vtcunq; tamē acciderint, “  
 omnibus in tempus producūtur. His præ- “  
 scriptis, Diocles mox causam subiungens,  
*Cause fla* ita scribit: Cæterum flatuosas vocatas su- 10  
*tuose me-* spicandum est, plus caloris quàm decet ha- “  
*lancholia.* bere in his venis, quæ alimentū à ventri- “  
 culo excipiūt, sanguinēq; in ipsis crassio- “  
 rem factum. quippe constat has venas esse “  
 obstructas, vel hoc argumento, quod ali- “  
 mentū corpori nō distribuitur, sed in ven- “  
 triculo manet incoctū, quum ipsum mea- “  
 rus antea susciperent, magnā ipsius partē “  
 in imum ventrem excernerent, tum quod “  
 postero die vomitu reiiciant, vtpote non 20  
 digestis per corpus cibis. Sed quod calor “  
 id quod secundū naturā est excedat, facil- “  
 limē intelliges, tum ab æstu, qui ipsis acci- “  
 dit, tum ab his quæ ingerūtur, siquidē iu- “  
 uari videtur à refrigeratibus cibis, qui vi- “  
 delicet calorē refrigerare extinguereq; so- “  
 lent. Deinde alia quoq; Diocles iam pro- “  
 positus in hoc sermone addidit: Aitunt au- “  
 tem nonnulli, os vētriculi quod intestinis “  
 con



„cōtinuātur, in huiusmodi passionibus in-  
 „flammari, ac ob inflammationē ipsam &  
 „obstrui & prohibere, ne alimenta statuto  
 „tēpore ad intestinū descēdant: quāobrem  
 „diutius quā decet, in ventriculo manen-  
 „tia, & tumores, & æstus, atq; reliqua quæ  
 „prædicta sunt efficiūt. Hæc sunt quæ Dio-  
 cles quidē literis prodidit. verū in hoc  
 symptomatū catalogo præcipua totius cō-  
 10 cursus accidētia silētio præteriit, quæ vi-  
 delicet & melancholiam, & flatuosam hy-  
 pochondriacamq; affectionē, tanquā cha-  
 ractere quodā designant. atqui omisit (ut  
 puto) huiuscemodi accidentia, eo quod ex  
 „morbi ipsius nomine manifestē declarant.  
 „Etenim ab Hipocrate didicimus: Si metus  
 „& inæstitia longo tēpore tenent, melan-  
 cholicus est huiusmodi affectus. Verū  
 haud absurda quæstio est, quare Diocles  
 20 quū causas aliorū accidētīū redderet, quā  
 ob causam mens lædatur, non scripsit: siue  
 enim venarum, quæ ventriculo contiguæ  
 sunt, calor exuperat, siue partes quæ iuxta  
 portā sunt (Græci pyloron vocāt) inflam-  
 matione laborāt, qd causæ sit, cur melan-  
 cholica comitentur accidētia derelictum  
 est. Etenim quod vter flatuoso spiritu im-  
 pleatur, ac deinde eructando ipsum leue-  
 tur, ac præter ea quæ dicta sunt, vomitione  
 quoque

*Hippocr.*  
*li. 6. apho.*  
*23. & 7.*  
*apho. 42*

*Pylorus.*



quoque iuuetur, vel nihil dicente Diocle,  
manifestum est. At propria melancholiæ  
accidētia simul cum dicta ventriculi dispo-  
sitione scribere, haud ita facile ei fuit. Id  
itaq; addere, ac simul qualis sit in huiusce  
modi affectibus ventriculi dispositio, ma-  
nifesta interpretatione enarrare aggredia-  
mur. Atq; videtur quidem in ipso inflam-  
matio esse. Sanguis autem in parte inflam-  
mata cōtentus, & crassior, & atræ bili ma- 10  
gis cōformis. Itaq; quemadmodum elata  
ex vētriculo ad oculos fuliginoso quodā  
aut fumoso halitu aut crassis quoq; vapo-  
ribus similia, vt in suffusione accidētia cō-  
tingūt: eadem ratione sublata ad cerebrū  
ab atra bile euaporatione veluti fuligino-  
sa fumosaq; melācholica eueniēt in men-  
te accidentia. Quinetiā quā frequentis-  
simē videmus, flaua in vētriculo bile con-  
tēta, caput dolore affici, mox ea pervomi- 20  
tum eiecta, illico dolorem mitigari. Atq;  
huiusmodi dolorū genera mordēdo exc-  
dēdoq; infestant, quēadmodum alia gra-  
uitate, alia tensione, alia cū mētis delatio-  
ne molestare vidētur. Atq; inter optimos  
medicos cōuenit, non solūm hæc acciden-  
tia, verūm etiam morbum comitalem ca-  
piri à vētriculo procedere. Igitur vt melā-  
cholicos timor nunquā deserit, ita præter  
natu



naturā eis per imaginationē visa, nō sem- *Melācho*  
 per eodem genere cōtinentur. Siquidem *licorū va-*  
 alius testam se factū putavit, atq; idcirco *riae imagi*  
 obuiatibus cedebat, ne collideretur: Alter *nes.*  
 gallos cātare audiēs, vt hi alarū ante can *Melācho*  
 tum, sic ille brachiorū plausu latera qua- *licorū dif-*  
 tiens, animantiū sonum imitatus est. Fuit *ferentia.*  
 item alter, timens ne Atlas, qui mundū su *Vt de Ar*  
 stinere dicitur, grauatus sub tanto onere *todoro A-*  
 10 ipsum à se excuteret, atq; ipse cū illo colli *pollonius,*  
 deretur, ac nos quoq; cū ipso periremus. *Et aliis a*  
 Sunt alia huiusmodi infinita eorum visa. *pud Aure*  
 differūt autē inter se melancholici. Nam *lianum in*  
 oēs timēt, mœrēt, vitam damnāt, odio ha- *chronicis,*  
 bent homines, sed nō oēs mori cupiūt. Et *et exem-*  
 enim hoc ipsum nonnullis melancholiæ *plaid ge-*  
 caput est, quod mortē pertimescūt. Quos *nus sepe*  
 dam etiā alieno admodum atq; extraneo *medicis oc*  
 videbis animo, vtpote qui simul & mortē *currunt.*  
 20 metuant, & tamen mortē sibi consciscāt. *Hippoc-*  
 Proinde rectē videtur Hippocrates om- *tes.*  
 nia ipsorū symptomata in duo hæc coē-  
 gisse, metū & mœstitiā. Mœstitia nimirū *† ηγεῖ τῶν*  
 eos inducit, vt odio prosequantur omnes *τελείων*  
 quotquot viderint, nunquā nō tristitiā *οἱ ἀπ’ αἰ-*  
 præ se ferentes, ac terrētur, vt in tenebris *αὐτοῖ.*  
 profundis pueri, † atq; ex adultis indocti. *Cur me-*  
 Sanè quemadmodum externæ tenebræ *lancholici*  
 omnib’ ferè hominibus pauorē inducūt, *timeant.*



*ἡ ψυχὴ* nisi vel audaces admodū† vel edocti fue-  
*ἀνθρώπων* rint, sic atræ bilis color mentis sedē tene-  
 bris similē reddens timorē efficit. Etenim  
 summis tum medicis tū philosophis in cō-  
 fesso est, & humores, & omninō corporis  
 temperaturam animæ actiones inaltera-  
 re seu mutare posse. id quod nos quoque  
 vnico cōmentario docuimus, quo demon-  
 stratum est, quōd animæ potētia corporis  
 temperaturā sequuntur. Quocirca humo- I O  
 rum vim ignorantes, in quorū numero &  
*Ερασίστρα* Erasistratus est, ne scribere quidē de me-  
*τὸς.* lancholia quicquam ausi sunt. Neq; indi-  
 gnum est admirari tum cōmunes homi-  
 nū sententias, tū plurima quoq; dogma-  
 ta, quæ & philosophi & medici per igno-  
 rantia præterierūt. Igitur ab omnib⁹ affe-  
 ctus ipse melancholia vocitatur, indicāte  
 nomine humorē q̄ ipsius causa est: quū-  
 que circa ventriculū prima inceperint ac- 20  
 cidētia, ipsisq; auctis melancholica seque-  
 tur affectio, deinde alui deiectione, & vō-  
 mitu, & proba cōcoctione, ructib⁹q; le-  
 uetur is qui laborat, hypochondriacū fla-  
 tuosumq; morbum ipsum nominabimus.  
 Accidētia verò ipsius dicemus, & mœsti-  
*Acciden-* tiam, & metū. Quum autē propria melan-  
*tia melan* choliæ accidentia auctiora videntur, cir-  
*choliæ.* ca ventriculum verò aut nulla aut parua  
 ad



admodū sunt, haud abs te existimaueris  
 primitiuam in cerebro affectionē cōsiste-  
 re, ob atram bilem in ipso congestā. Cæ-  
 terū quibus signis discernatur, utrū in  
 solo cerebro, an in vniuerso corpore hu-  
 iuscemodi humor contineatur, paulō an-  
 tē dictum est. Interim monendi sunt mihi  
 amici, qui me curantē viderūt, frequen-  
 tibus balneis, victuq; humido, boniq; suc-  
 ci, nullo alio adhibito præsidio huiusmo-  
 di me morbū curasse, vbi nondū ob lon-  
 gum temporis tractū nocuus humor mul-  
 tum vacuationi resisteret. quum enim diu-  
 turnus iā factus est morbus, fortiora præ-  
 dictis oportet adhibere remedia, sit autē  
 huiusmodi melancholiæ species, affecto  
 prius calidis dispositionibus cerebro, aut  
 æstuatione, aut inflammatione, aut phre-  
 nitide quoq; ipsum afficiente, interdum à  
 solitudine, inæstitia, vigiliis. verū sa-  
 tis fuerit hæc de melancholia dixisse.

*De morbo comitali.*

CAPVT VII.

**A**Tq; de morbo comitali deinceps di-  
 cendū est, quandoquidem hic quoq; *Morbi co-*  
 interdū ipsomet affecto, interdū aliis cō- *mitialis*  
 sentiente cerebro euenire solet. vt enim *differe-*  
 tria melancholiæ genera, ita hunc quoq; *tia & spe-*  
*cies.*



morbum tribus contentū differentiis omnes ferè Medici distinguere neglexerūt. Verū omnibus cōmune est, q̄ cerebrū afficitur, vel consistente in ipso affectu, id quod pluribus epilepticis accidit, aut à ventriculi ore (quod stomachū vocare solent Medici) ad cerebrū p cōsensum ascendente. Atq; hoc genus proportionē respōdet accidētibus, quę oculis à stomacho adueniunt, veluti in suffusionib⁹. Fit etiā sed rarò, tertia morbi comitialis species. Nec refert siue genus siue differentiam nominaueris, cū à parte aliqua cui id fortè fortuna accidit, incipit affectus, qui deinde sentiēte ægro ad cerebrū vsq; ascēdit. Hoc genus primū vidi in puero, qui decimūter tium ætatis annū agebat, quum equidem adolescens etiamdum cum optimis eius tēpestatis medicis cōuenissem, ad idoneā ipsius curationem inueniendam: audiui  
*Humoris ad caput in epilepsia ascendens.*  
 † Al. ilia. Cuidam à parte pedis superioris, quæ obvertitur plantæ, aura frigida ad os ventriculi euadebat: ubi ille epilepticus concidebat. Postea vehementer curuato in ventres corpore, doctus est aura cursum intercipere, atque ita sese casu liberare.

put



put perueniret, quod quum primū tan-  
geret, ipsum haudquaquā sibi constare.  
Interrogātibus autē medicis, quale esset  
id quod ferebatur ad caput, nihil habuit  
puer quod respōderet. Alius deinde ado-  
lescens cōpos mentis (quippe qui satis po-  
terat & sentire qđ fiebat, & alteri enarra-  
re) dicebat veluti frigidā quandā auram  
esse id quod ascēdebat. Vnde ex duob<sup>9</sup> al-  
io terū Pelopi praeceptorī placuit, aut qđ qua-  
litas quādā alteratis per cōtinuationem  
partibus, aut spiritalis quādā substantia  
transmitteretur. neq; mirandū esse dice-  
bat, tā validā vim esse humori, qui in af-  
fecta parte prāter naturā genitus fuisset,  
vt perniciosarū ferarū venenis possit cō-  
parari. Quis enim crederet vel à scorpio-  
nibus infixo aculeo, vel à phalangiorum  
ictibus totū corpus ingēti & inusitata mu-  
tatione affici? nisi saepenumero id accide-  
re videret. praesertim minimā quandā rē  
feris in ipsum demittētibus. Quum itaq; *Phalan-*  
*gium.*  
phalangiu aliquē momordit, quāuis par-  
uum sit animal, existimare tamē debem<sup>9</sup>, *Turtur*  
venenū ex ipsius ore in ictum corpus de- *marina*  
scendisse. Porro marinæ turturis, quēad- *venenosa*  
modū & terreni scorpionis aculeus in par *acuto fr-*  
tem extremam acutissimam illam quidē *mo q; acu-*  
finitur, vbi nullum foramen est, per quod *leo pūgit.*



*Scorpio.* venenū deiici possit: necesse tamen est, vt excogitemus substantiā quandā esse aut spiritalem, aut fluidā, quę vt mole minima, ita facultate q̄ maxima est. Etenim quū nuper ictus quidā esset à scorpione, videor mihi videre (inquit) quòd grādine percussus sim: eratq; omninò frigidus, sudore etiā frigido accedēte, sed tandē debitis adhibitis remedijs nō sine negotio seruatus est. Itaq; Pelops, nō impossibile est

*Causa morbi comitialis ex Pelopis sententia.*

(inquit) in corpore similē aliquā essentiā generari, nō accedēte causa extranea: quę vbi nervosam aliquā partē occupauerit, per cōtinuas partes vsq; ad nervorū principiū vim suā transmittit, siue id per alterationem (vt ipse dicebat) fiat, siue spiritali essentia, veluti aura, ad ipsum elata. Sæpenuerò enim infigēte aculeū scorpione, aut in nervū, aut in venā, aut arteriam manifestè videmus percussos, vehementissimis infestati accidētibus. Atqui scorpionis aculeus totā cutē penetrando ad profundū vsq; potest peruenire. Phalangiorū verò parviorū ictus solā afficit superficiē, vnde constat interdum à sola cute venenī vim ad totum corpus deferri, quippe tota cutis & continua est & nervosa: proinde haudquaquā impossibile est, quum ex icta parte per totā ipsam celeriter distributa



buta fuerit veneni vis, eam inde eodē rursus contactu in singulas subiectarū ei partiū recipi, mox ex illis in alias cōtinuas, atq; iterū ex his, quæ afficiūtur, in alias: quūque ad dominantīū partiū aliquam peruenerit, tum mortis periculū homini instare. Ad hanc rē in primi, cōferūt vincula superioribus partibus iniecta, ab iis enim præsenteū præsidiū expectatur: id quod in viperarū scorpionūq; ictib<sup>9</sup>, item aspidum quoque (quod propter imminēs subitariae mortis periculū, magis incredibile est) expertus sum. Etenim quum Alexandria essem, rusticus quidam nō longē ab vrbe in vno man<sup>9</sup> digitorū ictus eius, radicē apud palmā validissimo vinculo ligauit, accurrensq; ad urbē ad familiārē sibi medicū, totum digitum ab ipsa articuli iunctura ad palmam abscindendum præbuit, sperans inde nihil se mali passurum. Neque frustratus est sua spe, quippe nihil aliud faciens saluus euasit. Similiter aliū noui, qui epoto ex viperis medicamento, rescisso prius digito, à periculo liberatus est. Vidi prætereā rusticum, cuius totum digitū vipera momorderat, q̄ falce quā tūc fortē habebat (erat enim vinitor) ab vltimo articulo ictam partem rescās, deinde inducta visitatis pharmacis

*Vincula  
superiori-  
bus parti-  
bus inie-  
cta, vene-  
nis reme-  
diū præ-  
sentaneū  
adferunt.  
† Gracē  
enim est,  
diagbō-  
suis, quā-  
quam Co-  
pus videat  
tur: dia-  
suis legis-  
se, sed ma-  
le.  
Theriaca  
aduersus  
venena.*



*medicamē* in digito cicatrice, nullo sumpto medica-  
*cōtra mor* mine sanatus est. Sed puerū quoq;, cuius  
*bum comi* morbus comitialis à tibia oriri cōsueue-  
*tialem.* rat, medici qui tūc ad curationē eius con-  
 uenerāt, sanare sperabant, si in primis va-  
 cuato vniuerso corpore, medicamē ex ta-  
 pia aut sinapi parti adhiberent: ligato in  
 medio mēbro, supra eā videlicet partem,  
 quę primaria dispositiōe erat affecta, atq;  
 hoc pacto accessionē reuerti prohibuerūt, 10  
 quamuis antea quotidie puerū infestare  
 cōsueuisset. Verū hæc obiter, atq; ex abū-  
 dātia dicta sint, ne q̄s miretur, quo pacto  
 ab ignobili aliqua parte tātus morbus or-  
 tum cōtrahere possit. Superest vt causam  
 inuestigemus, quāobrē in huiusmodi per  
 consensum affectionib⁹ epilepticæ fiant  
*Quare in* cōuulsiones. Nā ne Pelops quidē vllā ad  
*comitali* hanc rē attulit p̄babilē persuasiōē. Neq;  
*morbo fiat* etiā alius quisquam, cū quo nobis aliqua 20  
*epileptice* fuerit cōsuetudo. Mihi verò per huiusmo-  
*conuulsio-* di consensum videnti aliquādo laboran-  
*nes.* tem sine vehementi cōuulsione cōcidere,  
 simul q̄ per interualla breuib⁹ quib⁹dā  
 motibus quateretur, probabile visum est,  
*Singultus* quemadmodum frequētissimē singultum  
*ex affecto* fieri cernimus affecto stomacho, ita hanc  
*stomacho.* quoque dispositionē euenire. Etenim me-  
 ipsum quoq; singultus illicō inuadere so-  
 let



let, si piperis aliquādo immodicā quātita-  
tem ingessero. Id quod aliis quibusdā nō  
paucis, quibus scilicet facilis erat oris vē- *Os vētri-*  
triculi sensus, accidisse meminim⁹. Atqui *culi stoma-*  
iam suprā memoratū est, id nō solū Me *chus.*  
dicis, verū etiā vniuersis hominibus sto-  
machum appellari. Itaq; quū cecidissent,  
qui non ex propria cerebri affectione sed  
per consensum comitali morbo labora-  
bāt, eos citra perpetuā cōuulsionē† veluti *οἷον πάλ-*  
palpitādo per intervalla concuti videbā. *μώδην τι-*  
Proinde existimaui, similē aliquē cerebro *πὰ καὶ δὲ νοσ-*  
motum euenire, qualis stomacho interdū  
à re quapiam molestato accidere solet.  
quippe quū à ciborū mole grauatur, aut  
vbi corruptis cibis mordicus infestat⁹, tū  
singultu affici conspicitur. Atq; acrē quo- *Acris hu-*  
que humorē, non singultū modò, verū *mor sin-*  
etiam conuulsionē per vniuersum corpus *gultū &*  
20 efficere sæpenumerò cōsideramus: deinde *cōuulsio-*  
vomitu eiecto eo, qđ mordicabar, illicò *nē afficit.*  
quiescere. Quo minus mirandū est, si ner-  
uorum principium huiuscemodi motu cō-  
cutiatur, vt à se expellat, quidquid fuerit,  
id, qđ à parte primò affecta ad ipsum ef-  
fertur. Ad hunc modū reliqua quoque ac-  
cidētia omnia quib⁹ nervosum genus cō-  
cutitur, fieri putauerim vbi verò deperdi-  
to sensu quis cōciderit, nō accidente mo-



Lethargus à vehementi frigore. Posteriori & medio ventriculo principatum visus est attribuisse, & intercepta via quæ ad spiritum non est, & tu, quo vel cõuelli, vel palpitare videatur, quæ hæc potest id à vehementi frigore ortum trahere censeo, quo in genere lethargus quoq; continetur. Apoplexiæ autem quæ subito eueniat, aut mittitur, frigidum, aut crassum, aut viscidum quidam epilepsias præcipiunt, quod principes cerebri ventriculos affatim implet, non totius substantiæ intemperamentum perire causam esse manifestum est: veluti scribit 6. lethargi, phrenitidis, mania, melancholiæ, stultitiæ, amissæ memoriæ, sensuum hebetationis, resoluti motus. Porro in omnibus his affectibus, in quorum numero apoplexia quoq; continetur, periculi magnitudinem ex anhelitu nocumeto conicere oportet. Sane quemadmodum dormientes spirant, quamuis nulla alia accidere actione, quæ à consilio prodeat, nimirum quum supini iaceant in cubili: ita in soporosis affectibus omnibus quamquam neque sentiat corpus, neque moueatur, tamen sola spiratio, quæ musculorum pectus mouentium munus est, saluatur. cuius rei firmam ac demonstratiua lege stabilitam habemus scientiam: quemadmodum quod musculis etiam omnibus Nervorum motus principium ab innatis ipsis nervis accedit. Atqui ex anatomice didicimus, nervos



uos omnes à cerebro primariū sumere initium, neq; simpliciter initium, sed primarium dixi, id quod spinalis medullę gratiā orationi adieci. Quāvis enim permulti ex ea nerui prodire videantur, vim tamen omnem quam habet, cerebrum ipsi suppetit. Quum itaq; spirationem vehementer impeditam difficulterq; procedentem videris, non parvam in cerebro morbidam dispositionem esse, conicere debes, idq; in soporiferis morbis quos nimirum omnes in cerebro fieri manifestum est.

*Spiratio  
impedita.*

*De vertiginosis. CAP. VIII.*

**A**ffectus autem qui scotomaticus ( id est vertiginosus ) vocatus est, ex ipsa appellatione, qualis sit, manifestatur, quippe à parua occasione † hebetantur hi qui sic laborant, adeo ut interdum cadant, maxime si aliquando in circum rotentur. siquidem ipsis ab vna rotatione euenit, id quod ceteris à plurib<sup>9</sup> accidere solet: proinde hebescent, siue alium quempiam, siue rotam, aut id genus aliud quidpiam, aut ipsos quoq; quos vocāt, in aquis vortices circumagi viderint. Id verò maximè, quū vel sub sole aestuauerint, vel aliam ob causam calefacto fuerint, capite. Nam quod aliis, quū in circo frequenter vertuntur, accidit,

*Scotomatici  
affectus  
notæ  
† Σκοτῶν  
ταί.*



cidit, hoc ipsis citra circuitiōē euenire videmus. Atqui vbi quis crebrò vertitur, in<sup>q</sup> qualem, & turbulentū, & inordinatū motum, tum humorū, tum spiritus in eo fieri in cōfesso est. Rationi igitur cōsonum est, huiusmodi accidētia vertigine affectis itidem euenire. Quāobrem nonnulli horum

*Arteria- rum sectio* ab arteriarum sectione præsidiū perierūt, totas arterias pone aures ad tantā scilicet *vertigi-* altitudinem secātes, vt medius inter duas *nos* partes locus cicatrice induceretur. Sed cō- *cta apud* stat non oēs huius auxiliij beneficio fuisse *antiquos.* curatos. Etenim aliæ arteriæ iis maiores ad cerebrū ex ipsius basi per retiformē plexum ascēdūt, per quas huiusmodi affectiōnem fieri rationi cōsentaneū est, elato per ipsas vaporoso calidoq; spiritu, atq; implete cerebrum. Atq; fieri etiam potest, vt inæquales cerebri intēperies huiusmodi spiritum producat. Igitur hanc affectiōē ad cerebrum pertinere ex ipso vertiginosorū *Origo ver* sensu manifestū est. Oritur verò interdū, *tiginosi* cerebro primogenio affectu laborante: in *affectus.* terdum verò, quū ori ventriculi cōsentit, id quod Archigenes quoq; fatetur, qui libro primo de Longarū affectionum notitia ita scribit: Porro ea bifariā oritur, aut enim in ipso capite, aut in his partib<sup>9</sup> quæ circa præcordia sunt. Mox genera eius distinguere



stinguere aggreditur. Nam ubi ex primaria cerebri affectione, vertigo dependet, aurium sonos, & capitis dolorem, gravitatemq; præcedere dicit: item olfactus, atq; alterius cuiusq; sensus inde prodeuntis oblationem (hoc enim sermoni illi adnexuit inde prodeuntis) eos sensus (ut equidem puto) significare volens, qui à capite initium sumunt. Vbi verò ab ore ventriculi<sup>10</sup> oritur, cordis morisionem, nauseamq; præsentiri. Verum ut iam antea sæpenumero monuimus, licet caput per alterius partis consensum afficiatur, affectio tamen nihilominus ipsi ascribenda est.

*De cephalæa & hemicrania.*

C A P. IX.

**A**Tque de ea quoque quæ cephalæa à *Cephalæa* medicis nominatur, nemo dubitavit *definitio*  
<sup>20</sup>rit quin cerebri sit morbus. Est enim (ut bre *& nota.* uiter quis dixerit) affectus hic, dolor capitis diuturnus, difficulterq; solubilis, qui à parua occasione vehemētes habet accessiones, ut neq; strepitū, neq; vocē vehemētiorem, neq; luminis splendore, neq; motum tolerare possit infirmus: sed tranquillitatem, obscurumq; cubiculum quærat, idq; ob doloris vehementiam. Quippe nonnulli veluti malleo se percuti arbitrātur: alij caput



*Cephalal-  
gia.*

*Dolorū ca-  
pitis diffe-  
rentie.*

put contundi distendiq; sentiunt: non pau-  
cis ad oculorū quoq; radices dolor exten-  
ditur. Quin huiusmodi accessiones veluti  
in morbo comitiali, intermissiones habēt:  
interceditq; tempus, quo perfectē liberari  
videtur. Igitur cōstat, q̄ sicut in cephalgia  
(id est capitis dolore) ita in hoc morbo ca-  
put facillimē afficitur: atq; hoc est ipsis cō-  
mune. verūm per cephalæā affectæ partes  
multo reddūtur, quā in cephalalgia, de-  
biliores. Cæterū inter capitis dolores nō-  
nihil discriminis inuenitur. nā sunt nōnul-  
li, quibus caput aptissimū est vt impleatur,  
ac vniuersi quoq; corporis habit⁹, ad ipsum  
implendū admodū idoneus: Alij omnes  
capitis partes aptas habēt vt afficiant: qui-  
bus, vbi vitioso victu vtūtur, accidit vt ce-  
phalæa arripiantur. Quo minus mirādum  
est, si horum aliis, membranę cerebrū con-  
tinētes, dolore afficiātur, aliis pericraniō, 20  
id est exterior caluariæ mēbrana. Discrimen  
autem ab oculorū radicibus sumitur,  
considerando vtrum veniat ad eas malū,  
necne: siquidem cōsentaneū est, vt quibus  
intra caluariam dispositio est, iis ad oculo-  
rum vsque fundamenta dolor extēdatur:  
eo quòd & à cerebro, & ab vtrāque mem-  
brana, atq; à vasis quæ in ipsis cōtinentur,  
veluti germina quædam deducuntur. Sed  
&



& eorū quibus dimidia capitis pars dolore infestatur (solent antē vocari hemisphærici) alij extra caluariā, alij in capitis intimis partibus dolorē sentiunt. At verò dextram capitis partem à sinistra distinguit futura per longitudinem ipsius protracta, sub qua intra capitis ossa, linea mediū cerebrum diuidens protenditur, ad quam etiam peruenit, anteriorū duorum ventriculorum septum. Porro ea corpora suapte natura idonea sunt, vt ipsis caput impleatur, in quibus vaporosus calidusq; spiritus generatur, aut quibus biliosa excrementa cumulantur in ore ventriculi. Atqui spiritus dolores inducunt tensiones, qui idcirco sic vocati sunt, quòd extensionis sensum inducunt. Biliosa excrementa dolore mordaci afficiunt. Dolores à plenitudine procedentes grauitatis sensum afferūt: quibus si rubor accedat atq; calor, calidos, sed sine iis, non calidos humores significant. Sunt quibus caput assidue dolet, vbi vel paulò liberalius vinū ingesserint, vel meracius, idq; magis, si suapte natura calidum fuerit. Præterea calidi odores omnes, vt styraeis, aut cypheos, atque in totum odorata omnia, capitis dolorem pariunt, adeò vt nonnulli ne thuris quidem odorem ferre possint. Neque verò absurdum est, vt quos

*Hemisphærica.*



*Sensus  
oris vëtri-  
culi ex-  
quisitus.*

quosdam ob sensus exuperantiã dolor in-  
festet, quẽadmodũ in ore stomachi acci-  
dit. Sunt enim nonnulli, in quibus id tam  
exactẽ sentit, vt neq; acre acetũ, neque si-  
napi, neq; aliud huiusmodi ferat. Alij verò  
cõtrã, ipsum penè insensile habet. quippe  
videtur aliqui vel ructare vel vomere quẽ  
dam vsq; adeò vitiosa qualitate infecta,  
vt nos ne odorem quidem sustinere possi-  
mus, quum tamen ipsi interea nullã alicu-  
ius momenti mordacitatẽ sentiant. Nihil  
igitur prohibet, quo min<sup>9</sup> in hominũ cere-  
bro similes notentur differẽtię, vt eosdem  
odores alioqui impunẽ sustineãt, perinde  
ac si omnino ab ipsis distarẽt, alij eos sine  
molestia ferre non possint. Igitur quod  
omnes huiusmodi affectiones ad cerebrũ  
pertineant iam manifestum esse videtur.

*De apoplexia, nervorum resolutione, &  
convulsione.*

20

## CAPVT X.

**A**T verò neruorũ resolutio, & per vni-  
uersum corpus eorum convulsio, in  
quo genere neruorum etiam rigor (Græci  
tetanon vocant) cõtinetur sensu vt prædi-  
ctæ affectiones cognosci non possunt, sed  
ratione quæ nos doceat, est opus. Itaq; si  
aliquando per totum corpus, neruorum  
actio vitiosa redditur, ipsorũ principium  
affe



affectum esse constat: id verò ex sola anatome dignosci potest. Quum igitur omnes pariter nervi tum sentiendi, tum mouendi vim amiserint, apoplexia huiusmodi affectio appellatur. Vbi verò alteri lateri, aut dextro aut sinistro id accidit, resolutio nominatur, eius scilicet partis in qua consistit affectus, interdum dextrę, interdum sinistrę.

*Apoplexia.*

*Paralysis.*

*Resolutio nervorum.*

Quòd si in aliquo membrorum idem evenierit, eiusdem membri resolutio esse diceretur.

Nam & tota manus & totum crus interdum resoluitur, atque solus in crure pes, & quę sub genu sunt. Sic etiā de tota manu similiter proportionem dicendum est. Cæterum ex anatomice didicimus, quòd omnes animantis partes sub ceruice positę, quę à consilio & voluntatis imperio moveri possunt,

*Spinalis*

nervos habet qui eas moueant, procedentes ex spinali vocata medulla. Atqui sæpenu-

*medulla nervus.*

merò audistis eam spinalem vocari medullam, additā scilicet medullę appellatione, interdum verò sine additione simpliciter spinam nuncupari. Vidistis etiā in corporis dissectione, nervos qui thoracem mouent, ex ea spinę parte quę in ceruice est, ortum deducere: ipsa verò ex transverso incisa, si rota fuerit dissecta, oēs quę sub ipsa sunt corporis partes, sensu, motuq; priuari utpote suscipiente spina à cerebro, vim tū sen-

M



*Sectiones in spinali medulla quam non tam adferant.* tiendi tum mouēdi pro arbitrio. Præterea in Anatomice vidistis, vbi per transversas spinæ incisiones ad mediū vsq; secundum longitudinem secaretur, non omnes suppositas corporis partes, sed eas dūtaxat, quæ è regione sectionis erāt, resolutas: dextras quidē dextra spinæ parte dissecta, sinistras verò, vbi reliqua pars esset incisa. Itaq; manifestum est, quòd circa primū spinæ processum factā aliqua dispositione per quā cerebrī facultas quo minus ad ipsam perveniat, prohibetur, omnia inferiora membra, dēpta facie, sensu motuq; priuabūtur: vbi verò media eius processus pars fuerit affecta, non oēs inferiores partes resolventur, sed vel sinistrae duntaxat, vel dextræ. Videntur autem huiusmodi resolutionum aliquæ faciem quoq; infestare: sed tum resolutum latus ad alterā faciei partem trahitur. Quumq; ex anatomice didiceritis, 20 nervos qui per faciei parte, sparsi sunt, à cerebro demitti, si earum aliqua simul cū toto corpore resoluta est, haudquaquam vos latere debet, resolutionis dispositionē in ipso cerebro cōsistere: vbi verò illæsa per manserint, spinę initiū affici sciendum est.

*Nervi faciei affecti.* Accidit verò nōnullis, vt faciei partes duntaxat afficiantur, quēadmodum & reliquarum quoque partium interdum aliquæ, vt

lin



lingua, oculus, mādibula, labrum. Etenim  
 nō omnibus abvno loco principiū influir,  
 vtpote quæ ex diuersis cerebri partib⁹ ner-  
 uos suscipiūt. Id quod in Anatomice haud  
 obscure cōspicitur. Igitur apoplexia omni  
 bus animalibus actionibus noxā inferēs,  
 cerebrum affectū esse manifestè declarat.  
 discernitur autem affectionis magnitudo  
 ex noxæ quam spirationi infert vehemen-  
 tia. quum enim naturalem ordinem pluri-  
 mū egreditur, magnam: quum verò pau-  
 lum impedimenti est, parua in cerebro no-  
 xam esse coniicere oportet. Sanè omnium  
 pessima spiratio putanda est, quæ & inter-  
 mittitur, & magna cū violentia trahitur.  
 Quippe vt mori cōtingit apoplecticos, ob  
 id quod spirare non possunt: sic homo qui  
 corporis partes mouere nequit, ad vitæ fun-  
 ctiones censeretur inutilis, quāuis huic subi-  
 te mortis periculum haudquaquam immi-  
 neat. Itaque vidimus quendā, qui reliquis  
 partibus omnibus resolutis, nullā quæ ad  
 faciei partes pertineret, actionē amisit, ser-  
 uata etiam spiratione: quomodo enim vi-  
 uere diuti⁹ potuisset, ipsa deperdita? In  
 quo affici putauimus illā spinæ partē, quæ  
 paulò inferior est, processu neruorum ad  
 septum transversum tendentium: quinetiā  
 & vrinam, & alui sedimina ipsum præter

*Apoplexiæ  
magnitu-  
do.*

*Pessimæ  
spiratio.*

*Resolutio  
nes varia.*

M 2



volūtatis imperium emisisse manifestum est. Insuper vidimus alium, cui propter casum omnes inferiores partes depris manibus resolutæ. Igitur quemadmodū corporis partes quæ sub facie cōstitutæ sunt, resoluūtur, faciei partibus illæsis, affectionē in spinæ initio esse certū est: ad eundē modum, si toti corpori cōuulsio acciderit, eūdem spinæ locum affectū esse declarat, faciei partib⁹ omnino seruatis illæsis. Quòd si hæ quoq; afficiantur, cerebro noxā iam illatā esse ostenditur. Vbi verò pars aliqua conuulsa est, neruum qui eius motioni deputatus est, aut musculū affici necesse est. Igitur si ex Anatomice neruorū ad singulas partes veniētium principia didiceris, per quā facilè earū & sensum & motum deperditū curabis. Verūm hæc indeterminata relictæ sunt & Erophilo & Eudemo, qui primi post Hippocratē neruorū anatomicen accurate scribentes, non mediocrē medicis dubitandi occasionē præbuerunt, quo pacto per neruorum resolutionem interdum sensus duntaxat, interdum motus, nonnunquam ambo simul pereant. Itaque neruorum resolutio potissimū dicitur, vbi motus deperditus est. Vbi verò partiū aliquarum sensus perit, eam partē sensus expertem esse resolutā verò nō adeò dicere con

*Neruorū  
resolutio.  
Paralysis*



consueuimus: quanquā sunt nonnulli, qui hanc affectionem sensus resolutionē vocitant. Nos verò semp iubemus vt cuiq; nominib<sup>9</sup> pro arbitrio vti liceat. etenim hoc nobis esto propositum, vt affectam scilicet sedem, simulq; dispositionē eius inueniamus. Nisi enim hæc accuratè cognouerimus, nequaquā eas partes, quibus vel sensu, vel motus vitiat<sup>9</sup> est, rectè curabimus.

- 10 Sanè Pausanias Syrus sophista quū Rōmā aliquādo venisset, secūdū duos minores sinistrae manus digitos, atq; medij partē mediā, sensum in primis quidē difficilē habebat: postea malè curatibus medicis, sensum omnino amisit. Quibus equidē cognitis, omnia quæ præcellerūt inuestigauit, atq; ipsum quū per viā duceretur, vehiculo excidisse, atq; in dorsi initio læsum, mox parre læsam breui quidē curatam, sed auctū in digitis sensus vitiū audiui. Igitur remedia quæ illi digitis adaptauerāt, læsæ parti adhibere iussi, atq; sic vir ille celeriter sanitati restitutus est. Etenim id q̄ in primis scire oportet, quòd videlicet nerui p<sup>er</sup> cutē manū vniuersæ manus cutē dispersi, quibus sentiēdi ad ipsam facultas defertur, proprias quasdā habeant radices, quòdq; neruorū musculos mouentiū sunt aliq; medici ignorāt. Verūm latius quā p<sup>ro</sup>posueramus, iam

*Pausanias  
curatio.*

*Nerui ad  
cutē manū  
peruenientes.*



nostra expatiata est oratio: proinde quiescere eā decet. quippe nostra intentio erat, ut hoc commentario omnes affectiones, quæ caput, maximè verò cerebrum infestare consueverunt, inueniremus. At quia ab ipso nerui originē ducunt, per consequentiam ad nervorum usque affectiones sermo peruenit: cui etiam finem imponēdo, passionēs quæ reliquis capitis partibus accidere solent, scribere aggrediamur, si prius hoc tantillum superioribus addiderimus.

*De olfactu.* CAP. XI.

*Olfaciendi vis læsa.*

*Ethmoidea ossa.*

**V**bi olfaciendi vis læditur, non eorum meatuum qui in naribus conspiciuntur, sed vel anteriorum cerebri ventriculorum, quum intemperantiā quadā afficiuntur, noxa est, aut eorū meatuum, qui in his ossibus sunt, quæ ethmoide (id est cola) vocantur, si aliquando obturantur, si quidem odoratorū sensus in prioribus cerebri finibus perficitur, elatis ad ipsos per coli foramina vaporibus, quemadmodum in eo libro quem de olfactus sensorio conscripsimus, iam declaratum est.

LIBRI TERTII

FINIS.

CL.



CL. GALENI DE  
AFFECTORVM LO-  
CORVM NOTITIA  
LIBER IIII.

\*

10 *Absoluit rationem cognoscendi morbos capitis & faciei: atq; hinc ad thoracē affectū descendit.*

**Q**UA via & ratione vniuersali affectas sedes scrutari cōueniat, primis libris duobus quarundā partium exemplis satis perstrinximus. Quoniam verò (vt iam diximus, atque in aliis libris demonstraui-  
mus) circa res particulares exercitari oportet eū, qui singula artis opera, quæ vniuersali via & ratione didicit, tutò & celeriter exercere voluerit: operæ precium me facturū mihi videre videor, si † rationales quasdam notiones omniū corporis particularum, quæ  
† λογικὰς δια-  
nὰς δια-  
γνώσκουσας, q̄  
cōcipiuntur  
mente, nec  
sensu perci-  
piuntur.

M 4



in non paucis affectuum generibus, via & ratione inducto exercitationis modo. Nā & de delirio tum phrenitidis proprio, tum eo quod citra febrem accidit, insaniam nominant: præterea de lethargo, sopore, morbo comitiali, melancholia, vertigine, cephalæa, hemicrania, apoplexia, & similibus ibi iam dictum est.

*De affectis partibus in oculorum morbis.*

CAPVT I.

**A**T in præsentī libro, qui huius cōmen-  
tarij quartus est, de faciei partibus,  
quæ intrinsecus afficiuntur, sermonem fa-  
ciemus, ab oculis incipiendo. Nam modò  
ipsorum sensus, modo motus, ac nonnun-  
quam tam sensus, quàm motus resoluitur:  
idq; interdum in altero, interdum in vtro-  
que accidit oculo. Nōnunquam solius pal-  
pebræ, nonnunquam etiam eius partis,  
quam propriè oculum vocamus, vel sen-  
sus, vel motus lēditur. Cū igitur nullo in  
oculis malo apparēte, cernendi sensus de-  
perditus est, descendēs à cerebro in ipsum  
neruus causam in se continet, cū vel in-  
flammatione, vel scirrho laborat, vel alio-  
qui ex humorum defluxione afficitur, aut  
aliter quomodolibet foramē ipsius obtu-  
ratur. Atque huiuscemodi affectus, oculo,  
ut instrumentali parti, accidere necesse est:  
qui

*Nervus  
visificus*



qui verò ei, vt simili, adueniūt, octo in-  
 temperantiæ generibus continentur. Præ-  
 terea aliud quoq; ipforum vitiū est, quum  
 vel nihil omnino, vel exiguū admodū vi-  
 sifici spiritus à principio, quod in cerebro  
 cōsistere putandū est, ad eos descēdit. Sive  
 rō vteruis oculorū, motum duntaxat ami-  
 ferit, secundæ copulæ neruū, qui à cerebro  
 oritur, molestari necesse est, ab aliquo vi-  
 10 delictet eorū affectuū quos alteri neruo, q  
 à prima cōiugatione nascitur, nuper acci-  
 dere diximus. Quoniā verò, vt ex anato-  
 mice didicimus, musculi oculū mouentes,  
 senario numero cōstant, ac præter eos, alij  
 quoque sunt, qui descendētis in ipsum  
 meatus (πρόρον Græci vocant, quo nomine  
 dissecutores primæ cōiugationis neruū eò  
 quod soli manifestū sit foramen nūcupa-  
 re consueuerunt) radicē amplectuntur. ac-  
 20 cidit interim quamuis ipse haudquaquā  
 afficiat, vt musculorū aliquis, aut in pro-  
 pria essentia, aut in neruo ad ipsum descē-  
 dente, ab aliquo nuper dictorū affectuum  
 infestetur: siquidē singulis horum muscu-  
 lorū, pars quædā nerui à secūda coniuga-  
 tione orti trāsmittitur, haud secus quā iis  
 quoq; musculis, qui meatum ipsum com-  
 prehēdūt, siue ij duo, siue tres, siue vn° dū-  
 taxat dicendus sit: id cū in præsentia non

*Spiritus  
visificus.*

*Oculorū  
motores  
nerui.*

*Oculorū  
musculi  
sex.*

M S



*Mun' mu* refert, modò nouerimus horum musculo-  
*sculorum* rem munus esse, vt & sursum trahant ocu-  
*culos mo-* lum, & firment, ne mollis ille neruus, quē  
*uentium.* & visificum & meatum nomināt, vllō pa-  
 cto in processu diuertatur. Quū itaq; sex  
 inueniantur oculum mouentes musculi, si  
 is quidem qui ipsum sursum attrahere so-  
 let, afficiatur, totus oculus delapsus vide-  
 bitur: si verò is qui ipsum detrahare po-  
 test, affectus est, oculus sursum attractus 10  
 apparebit. Ita etiam si minoris anguli mu-  
 sculus vitiatur, ad maiorem: si verò hic le-  
 sus est, ad illū oculus deflectitur. At si vol-  
 uentiū musculorum quispiam resoluitur,  
 obliqua erit totius oculi conuersio. Cæte-  
 rum quum alij prætereā sint musculi, mol-  
 lem neruum illū circundantes, scire licet,  
 ipsis resolutis totū oculum procedere, at-  
 que à sua sede moueri, tametsi plæriq; eo-  
 rum qui sic affecti sunt, sensim quidē intē 20  
 to molli neruo, sed nequaquam affecto, ci-  
 tra noxā cernere possunt: qui vbi quoquo-  
 modo afficitur, visum efficit obscuriorem.  
*Neruus* vbi verò adhuc magis malū ingrauescit,  
*opticus of-* cōstat eos qui sic afficiūtur, nihil omnino  
*sensus.* cernere posse. Porro quum oculi à sua sede  
*Aristote.* remouentur, si ad alterutrū angulum fiat  
*sect. 31.* cōuersio, innocua pmanebit cernēdi facul-  
*prob. 17.* tas: si verò aut sursum, aut deorsum, aut in  
*& Aphr.* obli  
*probl. 9.*  
*lib. 2.*



obliquum quoq; vertantur, quicquid ipsis  
 obieceris id omne duplū esse videbit. Mu- *Musculi*  
 sculiverò supernam palpebram mouentes *supernam*  
 (nam inferior immobilis est) quoniā per- *palpebrā*  
 quā parui sunt, adeò vt in maioribus quo- *mouentes.*  
 que animalib<sup>9</sup> vix manifestè perspicui pos-  
 sint, nihil mirū, si nerui ipsis innati difficul-  
 ter videātur. Nihilominus quemadmodū  
 in musculis, quorū iam suprā meminim<sup>9</sup>,  
 10 ita & in his quoq; euenire necesse est, vt  
 interdū musculi ipsi peculiari aliquo affe-  
 ctu, ex his quos ad musculos p̄tinere noui-  
 mus, interdū verò nerui ipsis innati infe-  
 stent. Igitur si musculus ipsam sursū at- *De electro-*  
 trahēs exoluit, laxam efficiet palpebram, *pio & la-*  
 adeò vt oculus aperiri non possit: si verò *gophthal-*  
 detrahēs (gemini em̄ sunt) resoluuntur, *mia Cel-*  
 oculū claudere non poterunt. Quorum si *sius libr. 7.*  
 alter duntaxat afficitur, ad oppositū mu- *& Graci-*  
 20 sculum palpebra deflectetur, vt fracta vi- *medici.*  
 deat, in fine videlicet circa mediā vtriusq;  
 lineā. quippe ea pars, quæ iuxta musculus  
 affectum est, sursū trahi, quæ verò iuxta  
 illæsum est, detrahi videt. Hi sunt partium  
 oculi peculiare affectus, qui latētib<sup>9</sup> locis  
 insident. Ac sunt prætereā alij, qui ex aliis  
 partibus ei per cōsensum adueniūt. Igitur  
 accidētia, suffusorum visis similia videtur *Suffusio.*  
 oculis nullā ppria affectione molestatis:  
 sed



sed aut oris vetriculi, aut cerebri cognatione, id accidere solet. Verū hæc ipsa, ab iis quæ à ventre oriuntur: distinguenda sunt. Primum quidē ex eo, quod vel alter duntaxat oculus, vel vterq;, similiter visis occupetur, siquidē in vniuersum visa ob humorū in ventriculo contentorum vitium oborta, vtrique oculo similiter accidunt. Quæ verò per suffusiones apparent, neq; incipiunt simul in vtroq;, neque similiter 10 apparent: deinde ex tempore quoq; distinguuntur. Si enim tribus, quatuorve aut etiā pluribus mēsis, suffusionis apparuerint ab accidentia, contemplatiq; tibi pupillam, ore vetriculi proceculi affectum procedere inuenies. Si verò dentium non ita multum temporis intercessit, querendum est in primis, vtrum ex quo incipit affectus, singulis diebus perpetuò huiusmodi apparitio perseuerauerit, nullo sci 20 licet interueniente die, qui omni reprehensione caruerit: an diebus quibusdā intermediis laboras exactè visus sit sibi conualluisse: Nam assiduitas suffusionē portendit: Intermisio verò, quod malū à ventriculo prodierit, suspicionē excitat: idq; magis, si perfectè quis concoquens, nullū sibi visum apparere fatetur: sed multo magis, si quū apparuerūt visa, mordic⁹ in ore vetriculi



triculi doluit: maxime verò si post hæc vo-  
 mēdo, eiecta re mordēte, mitigata fuerint  
 accidētia. Hæc sunt quæ primo statim die,  
 quū videris hominē, interrogando disce-  
 re debes, quādo (vt iam diximus) exq̄sitē  
 secundū naturam se habuerint oculi. Vbi  
 verò altera pupilla tenebrosior: aut turbi-  
 dior, aut (vt breuiter dicā) nō exactē pura  
 videtur, suffusionis esse initiū censendum  
 est. Si verò quispiā suapte natura pupillas  
 10 ip̄as nō admodū puras habuerit, confi-  
 dera num vtriusque similis sit affectus, ad  
 hæc, an non ita multum temporis à suffu-  
 sionis accidētibus præterierit [vt eas turbi-  
 diores reddere potuerit.] Quod si ita est,  
 impera, vt min⁹ cibi, quā p̄ cōsuetudi-  
 ne, ingerat, eūq; nihil mali succi habentē:  
 postero die vbi probē cōcoxerit, qualia ap-  
 paruerint visa interroga: si enim vel oīno  
 20 nulla, vel debiliora videātur, ad vētriculū  
 referēdū est accidens. At si similia perman-  
 serint, non per consensum, sed ex propria  
 dispositione, sciendū est huiusmodi acci-  
 dentia oculos infestare. Idque magis vbi  
 sumpto ex aloë medicamēto, nihil varia-  
 uerint. Voco autē medicamētum ex aloë,  
 quod alij hieram picrā, alij simpliciter pi-  
 cram appellāt. Quippe si à vētriculo pro-  
 uenerit accidēs, huiuscemodi medicamē-

*Vera suffu-  
 sionis  
 indicia ex  
 pupillæ  
 considera-  
 tione.*

*Di aloës.  
 Hiera pi-  
 cra.*



*Curat Ga-  
lenus suffu-  
sionis ac-  
cidētia per  
epistolas.*

ro potui dato, facillimè curatur, accedente  
simul bona cōcoctione, vt in idem conue-  
niant, & affectæ sedis notitia, & ipsius cu-  
ratio. Equidē quosdā sic affectos, quam-  
uis (vt scitis) nō viderem, quum in alienis  
essent terris, per literas curavi. Nam quū  
nonnulli ex Iberia, Celtica, Asia, Thracia,  
atq; aliis regionib<sup>9</sup>, per epistolas à me pe-  
terent etiā in suffusionis initio, nullo ad-  
huc vitio in pupilla apparente, vt probatū 10  
aliquod eis medicamentū trāsmitterem,  
volui prius certiozem me redderem, num  
ex multo tempore ita fuissent affecti. præ-  
tereā de aliis quoque, quorum paulo antè  
mentionem fecimus. Qui quum per epi-  
stolas responderent, sex menses aut annū  
iam exactum esse, vtrunque oculum simi-  
liter affici: quum probè concoxissent, me-  
lius sese habere: per cruditates, atq; vētri-  
culo mordic<sup>9</sup> dolēte, grauius irritari: edu- 20  
cta verò per vomitum bile, quiescere: nul-  
la facta de pupilla quæstione, satis efficaci-  
ter me cognoscere putavi, nō proprio affe-  
ctu, sed per vētriculi cōsensum oculos in-  
festari. Mittens itaq; picram, ipsos quidē  
in primis, atque præcipuè: per eos autem,  
alios quoq; multos ipsorum conterraneos  
sanaui, quū enim omnes quotquot episto-  
las meas acceperunt, docti essent, affecto-  
rum



rum locorum notas ex literis meis didicerunt: quib<sup>9</sup> deinde facile cognitis, eos amaro medicamēto curauerūt. At similia quoque suffusioni accidētia in quibusdā phrenitidis speciebus, affecto scilicet cerebro, sepe numero euenire solet. Nec refert, vtrū species an differētiās nominaueris. Nam simplices quidē duæ inueniūtur, ex quib<sup>9</sup> deinde tertia cōponit<sup>r</sup>. Quippe sunt phrenitici quidam, qui de iis quæ oculis offe-  
 10 runtur, rectē (quantum ad sensitivam notitiā pertinet) iudicant, cogitando verò, à naturali iudicio aberrant. Alij rursus cogitatione quidem falluntur minimè, sensibus tamen difformiter mouentur. Sunt prætereà q<sup>ui</sup> simul & sensus & cogitationis vitio laborant. Itaq; cuiusq; læsionis modum sic accipe. Quum Romæ quidam do-  
 20 mi, cum lanifici puero contineretur, surgens à cubili venit ad fenestrā, per quā & ipse videri, & prætereuntes videre potuit. Itaq; ex vitreis vasis singula ostendēs, interrogauit, imperarēntne vt ea proliceret: Illi verò ridētes, plaudētesq; vt ea proiiceret, rogabāt. tum ipse deinceps omnia arripies eiecit, at illi magnis acclamationib<sup>9</sup> riserunt. Postea, iuberent ne puerū quoq; proiici, quum eos interrogasset, atq; id illi iussissent: illico ipsum deiecit. quē ab alto  
 cadē

*Phrenitidis species tres.*

*Phreniticus vitreus  
vasa  
lanifici pro  
erum ex  
fenestra de  
ijcit.*



*Galenus  
adhuc  
pueri de-  
lirium.*

*Prænu-  
tiam futu-  
ram in se-  
ipso phre-  
nitidem.*

cadentē vidētes, suppresso statim risu, ac-  
currerunt, & confractū iam puerum sustu-  
lerunt. At contrariam affectionem non so-  
lū in aliis, verū in meipso, quum puer  
adhuc essem, expertus sum. Quū enim per  
æstatem ardente febri laborarem, & festu-  
cas atro colore ex cubili eminere, & floc-  
cos similiter in vestibis esse putabā, quos  
auferre tentans, nihilq; sub digitis eductū  
inueniēs, accuratius vehemētiusq; id effi-  
cere conatus sum. Audiens itaq; duos ex  
amicis, qui tum aderāt, dicentes: Vidēsne  
hūc iam & floccos euellere, & festucas col-  
ligere? statim intellexi, ipsum quod dice-  
bant, me fecisse. Quum verò sic animo cō-  
starem, vt rationalis in me facultas nō va-  
cillaret: rectē inquam dicitis: proinde ne  
phrenitis me arripiat, auxilio estote. Illi  
autē quū idoneis rigationibus caput foue-  
rent, tota die sequentiq; nocte, grauibus  
insomniis turbatus sum, vt interim & cla-  
mare, & exilire viderer: verū postero die  
mitigata sunt omnia accidētia. Igitur con-  
stat, quòd licet ab vna eademq; causa se-  
cundum speciem accidentia proueniant,  
nō tamē ab eadem sede quæ primario af-  
fecta sit, emergūt, & in iis qui ex cerebro,  
atq; illis qui per ventriculi consensum, vt  
dictum est, laborant. Quum enim in cere-  
bro



bro cuiuspiā biliosus succus abundat, acceditq; febris ardens, is afficietur perinde ac si ad ignē torreretur, oriturq; tū fumus veluti in lucernis ab oleo, q per vasa, quæ ad oculum tendunt, delapsus, visorum in ipsis causa censetur: siquidē in anatomice vidistis, quòd & arteriæ & venæ, ab his vasis ex quibus choroides mēbrana cōtexta est, simul cū nervis ad oculū descendunt.

*Biliosus  
succus in  
cerebro a-  
bundans,  
visorum  
causa.*

- 10 Verūm huic sermoni, utpote satis iā definito finem imponentes, de reliquis oculi partibus id in vniuersum dixerimus, nostri instituti nō esse, earū particularū quæ manifestē sensu percipiuntur, si à naturali cōstitutione aberrauerint, notas perscribere: sed illarū potius, quæ quum affectæ fuerint, sensum latēt. Nā quū pupilla manifestē videtur aut fracta, aut distorta, aut præter naturā vel aucta, vel imminuta,
- 20 haud difficile est affectam particulam cognoscere, at verò quæ sit dispositio huiusmodi faciēs affectū scire non sine negotio, à medica arte petendū est. verūm de iis in libro de causis accidentiū iam scriptum est. proinde nō opus esse videt, ut in hoc libro vel affectas sedes in oculis, quas sensus cōsequi potest, vel affect<sup>9</sup> ipsos declarare aggrediar. Quippe affectuū noīa vno paruo volumine, cui titulus est, Quo-

N



modò nascantur oculorū affectus perscri-  
pta sunt. Causas vt dixim<sup>9</sup> in libro de ac-  
cidentiū causis inuenies. Tēpus igitur est,  
vt ad linguam nostra cōuertatur oratio.

*De affectuum lingue notitia, item de so-  
pore, & morbo comitiali.*

## CAPVT II.

**A**Tque videmus interdum ipsius mo-  
tum, interdum gustandi sensum læ-  
di, atque nōnunquā cū eo tactū quoq;.

*Gustus.* Neque enim alio gustus atque alio tactus  
*Nervorū* neruo vtitur, vt in motu videre est. Nerui  
*tertia cere* enim à tertia coniugatione orti non so-  
*bri coniu-* lūm tangēdi, verūm etiam gustandi vim  
*gationis fa* obtinent. Verūm crebrius læditur gustan-  
*cultas.* di quā tangēdi facultas, quamuis iisdē

*Sensoria.* neruis vtraque vtatur. Nam ad gustū qui-  
dem exacto iudicio opus est: tangendi ve-  
rò sensorium, vt crassissimum, ita cernen-  
di, tenuissimum est. Auditus verò senso-  
rium, vt in tenuitate à visu, ita sensorium  
gustus in crassitudine, à tactu, secundum  
locum obtinet. Olfaciendi verò senso-  
rium, in illorum quatuor medio cōstitui-  
tur. Mouendi autem vis lingue aduenit,  
à septima nervorum à cerebro ortorum

*Motus lin-* coniugatione, non longè à spinalis me-  
*gue à qui* dullæ initio. Quūque hoc in loco vtra-  
*b<sup>9</sup> nervis.* que cerebri pars, tam dextra, quā fini-  
stra



stra afficitur, ne apoplexia hominem ra- *Apople-*  
 piat, periculum est: vbi verò altera tantū, *xia.*  
 in†paralysin finiri solet. Ea interdum al- *Paralys*  
 teram duntaxat linguæ medietatē à mo- *† Al. wæ*  
 tu prohibet: interdum partes sub capite *γαπλη-*  
 constitutas: & quidem modò has, modò *γίαμ*  
 illas infestat: nōnunquam alterum latus,  
 per vniuersum corpus vsque ad extremas  
 pedum partes afficit. Igitur ex faciei par-  
 tibus sola lingua sæpenumerò videtur  
 iam dictâ noxa molestari: quum nulla sit,  
 neque in tactu ipsius, neq; in gustu læsio.  
 Cuius rei causa haud obscura est, vobis *Nervi ad*  
 præcipuè, qui vidistis neruorū à cerebro *faciem.*  
 pcessum, ad faciē quidē à parte eius an-  
 teriore: ad partes verò toti⁹ animalis sub  
 facie omnes, ab altera parte nempe poste-  
 riore. A qua etiā eorum neruorum qui ad  
 linguæ musculos veniunt, cōiugatio pro-  
 cedit, quibus ipsa motū ab electione per-  
 ficit. Itaque non ab re quum anterior dū- *Anterior*  
 taxat cerebri pars afficit, sola linguę mo- *cerebri ps*  
 tio vitio carebit. Reliquæ verò faciei par *affecteda.*  
 tes omnes in altera parte, dextra aut fini-  
 stra, & sensum & motum ab electione  
 amittunt. Quòd si nanque aliquādo sola  
 anterior cerebri pars afficitur, supremum  
 ipsius ventrē ei consentire necesse est, at-  
 que cogitādi quoq; actiones vitari. Pro-



καρῶν  
sopor.

apoplexia  
succedit pa  
ralysis.  
† Al. wα-  
γαπάρια  
Morbus co  
mitialis in  
ter sopore  
et apople  
xiam me-  
dius.

Catale-  
psis.

Sopor vi-  
gilans.

inde qui ita affectus est, neq; sensus neq;  
motionis munere fungitur: spirandi tamen  
facultas haudquaquam læditur, vocatur-  
que hic affectus caros, id est, sopor. Si verò  
adeò vehemèter spiratione opprimat, ut  
quis vel magno conatu vix spirare possit,  
eorum exēplo qui per grauē somnū stertere  
solent, apoplexia nominatur. Atqui solutę  
apoplexię creberrimè succedere solet vo-  
cata ¶ paralysis. Sopore verò finito, bona 10  
valetudo magna ex parte subsequi cōsue-  
uit. Fit autē sopor, Hippocrate autore, mu-  
sculis temporū affectis, prætereā in acutis  
quoque morbis, ut idē Hippocrates scri-  
bit. Inter sopore verò & apoplexiā mor-  
bus comitialis medi⁹ est, cōuulsionē affe-  
rēs vniuerso corpori, sed in paralyfin non  
finitur. Horū trium morborū, frigidus ac  
crassus aut omninò viscidus humor, causa  
est. Verum & in sopore, & morbo comitia 20  
li, ventres magis, cerebri corpus minus: in  
apoplexia verò, corpus magis affici solet.  
Et in caro quidē anterior pars magis, in  
apoplexia & morbo comitali vtraq; affi-  
citur. In catalepsi verò & catoche dicta,  
posteriora cerebri potius afficiuntur. Quū  
autē osse quopiā terebra perforato, medi⁹  
vētricus fuerit cōtus, sopor hoīem oc-  
cupat, sed neq; cōuulsionē neque difficili  
facta



facta spiratione: hæc apoplexiæ, illa morbo comitiali peculiaris est: haud secus quæ catalepsi, soporiq; seruatür secundū naturā spiratio. Verūm vt per soporē palpebrę claudūtur, ita in catalepsi manent apertę. Quemadmodū autē inter perforandum, quum quis membranā negligenter, ac vltiā quā res expostulat, meningophylace (id est mēbranæ custode) premēdo violauerit sopor accidere solet. Ita vbi os calvariæ vehemēter attritū ipsius vētriculos comprimat, maximeq; mediū, sopor superuenire potest. Quinetiā ad vehementes dolores hic affectus sequitur, cōcidente videlicet robore spiritus animalis. Voco autem sic id quod est in cerebri ventriculis primū animę instrumentū, quo & sensum & motū in vniuersas corporis partes transmitti. Hos cerebri affectus, tū quā iam proposito sermoni familiaritate coniunguntur, tum etiā quod anteā nō satis declarati fuerunt operæpretiū duximus in præsentia definire. Sed ad linguę affectus redeundum nobis est: quorum alij quidē communes sunt per cerebri neruorumq; cōsensum, alij ipsius duntaxat proprii censentur. Igitur quod ad communicationē quam cum cerebro habet, pertinet, vt per septimam neruorum cōiugationem mo-

Sopor à ca

catalepsi

quid diffe

rat.

Meningo

phylax la-

mina a-

nea est, fir

ma paulū

resima ex

trema par

te, leuis,

subiicitur

ē parte q̄

scalpro ex

scindi de-

bet, nec vl

tra scal-

prum trās

ire patitur

Spiritus a

nimalis.

Communi

catio lin-

gua cū ce-

rebro per

neruos.



tus ipsius vitiatur. Ita sensus impediri po-  
*Neru' ter* test per tertiā, quem neruum dissectores  
*tie cōiuga* mollē appellant, descendente dispersum-  
*tionis mol* que (vt scitis) in tunicam quæ linguā com-  
*lis dictus.*prehendit, quemadmodū is, qui à septima  
 cōiugatione ortū habet, musculis ipsam  
 mouentibus distribuitur. Proprij autē so-  
 lius linguæ affectus, ex iis quæ iam suprā  
 de oculorū propriis affectibus diximus,  
 haud difficulter inueniētur. Quippe sicut  
*Similariū* musculorū ipsius aut similiariū intēperan-  
*e' instru* tiæ motū impediunt, ita ambientis ipsam  
*ment aliū* extrinsecus mēbranae intēperies, & tāgen-  
*partium* di & gustandi simul sensum vitiat. Instru-  
*affectiones.* mētalium verò affectionū speciē referūt  
 inflāmationes, scirrhī, œdemata, erysipe-  
 lata, suppuratiōes. de his verò, vtpote quæ  
 tū visu tū tactu discerni possūt, nihil aliud  
 in hisce cōmētariis dicemus. quippe eas  
 duntaxat affectas partes hoc in libro per-  
 sequi proposuimus, quæ neq; visu neque  
 tactu, sed demonstratiōe, atq; (vt summa-  
 rim dicam) rationali via inueniri possunt.

*De sensu auditus.*

CAPVT

III.

*Auditus.* **E**Adem quoq; ratione in sensu auditus  
 quicunque affectus in aurium oculis  
 obiecta cōcauitate oriūtur, rationali in-  
 uestigatione nō indigent. Illæso verò ap-  
 paren



parente aurium foramine, si audiendi facultas læditur, simili via & ratione inquirendæ sunt notæ. Vbi enim præter hanc nihil læsum est, neruum proprium affectum esse, haud absurdè coniecimus.

*De affectibus faciei. CAP. IIIL.*

**V**Bi verò reliquæ faciei particulæ simul cū ipsa læduntur, in cerebro dispositionē præter naturam esse existimamus, ipso vel vt similiari vel vt instrumentali parte affecto. Sed facies reliquis in locis omnib<sup>9</sup>, non solum motū, verum etiā sensum aut perdit omninò, aut viciatū habet: idq; interdū partibus quæ læsas habent actiones, proprio affectu laborantibus, interdū verò neruis qui ad eas à cerebro deferuntur: denique ipsomet interdū affecto cerebro: quorum discrimen per copulata ipsi accidentia facileprehenditur. Quippe si fortè fortuna vna quæpiam particula, aut in sentiendi, aut mouendi, aut vtrâque facultate lædatur, ea sola causam dispositionis continet: Idque aut suis ipsius partibus, aut neruis, qui ad ipsam ex tertia coniugatione feruntur, vel instrumentaliter, vel per intemperiem laborantibus. At vbi plurimæ simul affi-

*Quando facies sensum aut motum amittit.*



*Anatome  
neruorum  
ad tempora  
& nares  
ac labra  
pertinen-  
tium.* ciuntur particulæ, cōsiderare oportet, utrū  
ex vna neruorū origine, aut pluribus, sen-  
sum motūve, quum in naturali sunt ha-  
bitu, sortiātur. Subiiciamus enim ex arte  
secandi corpora, tēporū maxillarūq; mu-  
sculis, itē labris, & nariū pinnis, sensum &  
motū: linguæ verò, omnibūsq; oris parti-  
bus sensum dūtaxat, à tertia neruorū cōiu-  
gatione procedere: à secūda verò, vt ocu-  
lorū musculis motum, ita à prima oculis 10  
ipsis cernēdi sensum suppeditari. Igit̃ vbi  
particulæ quibus à tertia cōiugatione ner-  
ui adueniūt, & quidē omnes, sed in alter-  
utra dūtaxat parte læsæ videntur (nunquā  
autem huius præceptionis, vel nihil dicē-  
tibus nobis, obliuiscaris) neruū ipsum pri-  
mariò affectum esse putandū est. Si verò  
vtranq; simul partem lædi contigerit, non  
nerui proprius, sed in cerebro, loci cuius-  
piam, à quo nerui procedūt, primus affe- 20  
ctus est. Sanè affecto in vtrāque parte, tā  
dextra, quàm sinistra, cerebro, in eo vide-  
licet spatio, vnde tertia neruorū coniuga-  
tio prodit, oēs vicinæ partes simul affici  
consueuerūt: proinde & secundæ & primæ  
coniugationis nerui: vnde sequitur, vt ocu-  
lorū quoq; partes lædātur. Quòd si vnus  
partē de- duntaxat vel musculus, vel neruus quo-  
fleētitur. quo modo siue primariā affectiōe, siue p  
ccn



cōsensum fuerit affectus, pars ipsa in aduersum trahitur musculū. Nā resoluto musculo, qui dextrā labri partem mouet, ipsa ad sinistram deflectitur. At si is qui sinistram mouet resoluitur, ipsa trahitur ad dextram. Haud secus & totam mandibulam, & narium pinnas, & genas vtrasque quas à musculosa latitudine (id est, lato musculo) moueri didicistis, in aduersam 10 partē deflecti contingit. Id autem per nervos non à tertia cōiugatione, sed à cervicis vertebriis procedentes, efficitur. Nā hi per totam penē faciem spargūtur, exigua ipsius parte excepta, quæ à quinta coniu- *Nervi à spina in faciem.* gatione prodeuntes nervos suscipit, in summa videlicet lati musculi parte.

*De spinalis medullæ affectibus.*

## CAPVT

## V.

10 **S**ed iam tēpus est, vt spinalis medullæ affectus persequamur. Igitur spinalis medullæ affectus, quantū ad præsenti in- *Spinalis medulla.* quisiōne pertinet: cōpendiosam habent doctrinam: ea verò quæ ex actionibus habetur cognitio, non itē. Etenim nisi quis nervorum ab ipsa procedentium cōiugationes ita memoriā teneat, vt ad quā corporis partē singulæ perueniāt, cognoscat, discernere non poterit, secundum *† πέρσιν.* quam

N 5



vertebrā ipsa sit affecta: velut è contrariō  
 si illarum meminerit, facilis erit affectæ  
 sedis notitia. Quinetiā si reliquarū quoq;  
 partium omniū notitiā quæris: vt neruo-  
 rum qui à spinali medulla oriūtur, memi-  
 neris necesse est. Veluti vbi primæ verte-  
 brę afficiūtur, licet rarò euenire tamē in-  
*Angina.* terdū angina potest, idq; in pueris magis,  
 quā adultis, de qua Hippocrates libro  
 secundo de Morbis populariter vagātib<sup>9</sup> 10  
 in hunc modū scripsit: Erant anginae af-  
 fectiones huiusmodi, Cervicis vertebræ  
 ad interna conuersa sunt, aliis quidē plus,  
 aliis verò minus, atq; in partibus exterio-  
 ribus manifesta videbatur in ceruice con-  
 cauitas: dolorē laborās, quū tangeret, sen-  
 tiebat. Accidit etiā angina cuidā, sub ea  
 vertebrā cer-  
 uicis ro-  
 cauit Hip-  
 pocrates: Fauces autem, vt ea vertebra quæ dens di-  
 ppriè dēs-  
 dicitur: ab-  
 hac verte-  
 bra proces-  
 sus pyre-  
 nosides valido ligamento capiti alligatus, hinc annuimus  
 & abnuimus. Notæ anginam indicantes, nullo tamen exi-  
 stente in gutture proprio affectu.

guina



„ guina nullus dolor cruciabat, sed natura-  
 „ li potiùs habitu permanebant. Lingua  
 „ haud facilè cōuertebatur, atq; aucta ipsis  
 „ videbatur, atque exerta: venæ sub lingua  
 „ manifestæ: deglutire nisi magno cū labore  
 „ nequibant: at si vi quadam deuorare cona-  
 „ rentur, per nares effluebat id quod ingesse-  
 „ rant. Ex naribus loquebātur. Spiritus ipsis  
 „ non admodū elatus, nonnullis capitis, tem-  
 „ porum, atque ceruicis venæ attollebātur.  
 „ atque horū quibusdam, † quibus dolores  
 „ recrudescebant, tempora paululum cale- † *Al. admo*  
 „ bant, quamuis alioqui non febricitarent. *dum hor-*  
 „ Plurimi non angebantur, nisi quum vel *rendis* &  
 „ sputum vel aliud quippiam deglutire tēta *retribus.*  
 „ rent. Neque subsidebant oculi. Igitur qui-  
 „ bus tumor nō in alterutram partem defle-  
 „ xus, sed rectus erat, nequaquā paralyti-  
 „ ci euadebant. Horum si quempiam periis-  
 „ se mihi constaret, id referre grauarer mi-  
 „ nimè. nam quotquot memoria nunc con-  
 „ sequi possum, omnes superstites perman-  
 „ serunt. Atque alij quam celerrimè sanitati  
 „ sunt restituti: Alij non pauci quadragesi-  
 „ mum diem præterierunt. Insuper nonnul-  
 „ los, febris omninò non arripuit: Plurimis  
 „ etiam vsque in longum tempus, pars quæ-  
 „ dā tumoris protracta est, cuius rei signum  
 „ & à deglutione, & à voce sumi poterat:  
 „ Atque



*Paralytici  
ab angina.*

Atque eliquatæ quoque columellæ, quan-  
quam nihil mali habere videbãtur, malæ  
tamen significationis nuntium præstabãt.  
At verò quibus alterutra pars afficiebat, ij  
ea parte à qua vertebræ resoluebantur, pa-  
ralytici euadebãt, atque hæc ipsa versus  
alterã trahebantur. Porro huiusmodi ac-  
cidentia, tũ in facie, tum in ore, & septo  
quod gurgulionem distinguit, euidenter  
deprehendebãtur. Quinetiã inferiores ge-  
næ pro ratione mutabantur. Ceterum qui  
paralytici ab angina fiebant, iis non totũ  
corpus, vt in aliis fieri solet, resoluebatur:  
sed vsq; ad manus dũtaxat malũ procede-  
bat ab ea parte, quæ anginã vrgebatur.  
Atq; ij cõcocta quædã, eaq; exigua, & nõ  
sine molestia expuebant: prætereã quibus  
tumor in rectitudine consistebat, ij expue-  
re poterant. At ij quos febris quoq; infe-  
stabat, longè maiori cum difficultate spi-  
rabãt, ac inter loquendũ screabant, venæ  
ipsis attollebãtur, atq; pedes erant quàm  
frigidissimi. Horũ si aliqui nõ illicò mor-  
tui sunt, ij tamẽ erigere sese haudquaquã  
potuerunt. Verũ omnes quotquot equi-  
dem nouerim, mortem obierunt. Totam  
huius sermonis seriẽ in secũdo libro eius  
commentarij, quem in secundum librum  
de Morbis populariter vagãtib; perscri-  
psimus



pſimus, ad verbum ferè enarrauimus. Atq;  
 idcirco eam totā hic inferuimus, eo quòd  
 Hippocrates multis oſtēdit accidisse. angī  
 nā nobis rarò viſam, nullo exiſtēte in gut  
 ture proprio affectu. Quinetiam quod cir *Vertebra*  
 ca primas oritur vertebraſ, à quarū ſecun- *dēiformis*  
 da pars quædā dentiſormis vocata proce-  
 dit: vnde nonnulli ipſam totam vocauere  
 dentem. At nunc ſub hac quoque vertebra  
 10 (inquit) factam quidem anginam, ſed non  
 æquē acutam, vt ea quæ circa ſecundā fie-  
 ri ſolet. ſiquidem conſtat, quòd ſpinæ par-  
 tes quò fuerint altiores, eo ſunt præſtatio-  
 res proinde quò inferior primis duabus  
 vertebraſ fuerit diſpoſitio, eo minorē infe-  
 ret noxam. Nam ex arte ſecandi corpora *Nervi ſe-*  
 didicimus, ſepti trāſuerſi neruos ſub quar *pti tranſ-*  
 ta ac quinta vertebra emergere: præterea *uerſi.*  
 ex cōmētariis de ſpirationis cauſis edocti  
 20 ſumus, liberam ſpirationē à ſolo fieri ſe-  
 pto tranſuerſo, accedente ad hanc interco-  
 ſtalium quoq; muſculorū actione, vbi vi- *Muſculi*  
 delicet vehementiori opus eſt ſpiratione. *intercoſta-*  
 Quòd ſi vehemētiffimā ſpiratiōe indigue *les ſpira-*  
 rimus, ſuperiores etiā muſculos concurre *tionem ad*  
 re oportet. Verū nō ſolū ob magnam *iuuant.*  
 aut maximam ſpirationē horum muſculo-  
 rū actionē requirimus, ſed ob alias quoq;  
 cauſas, de quibus latius in libris de Dy-  
 ſpnœa



spncea (id est spirandi difficultate) iam dictū est. In præsentia verò satis fuerit, à præ-

*Hippocra* scripto Hippocratis sermone tantum acci-  
*tes lib. 3.* pere, quantum ad affectorum locorum no-  
*de articu-* titiam necessarium est. Si prius eius verbi,  
*lis subprin-* quod in libro de articulis à nobis explica-  
*cipium.* tū est, meminerimus, vbi inquit: Vertebra-  
*Lordosis* rum autem quæ in spina sunt, quæcunque  
*vertebra-* per morbos in gibbum trahuntur. Vult ni-  
*rum luxa-* mirum nō solum ad interna vertebrarum  
*tio ad in-* luxationem, quam lordosin (ideest excaua-  
*terna.* tionem) vocant, sed eam quoque, qua fo-  
 rās vertebræ labuntur, comitari tēiones,  
 quæ ad partes fiunt internas, trahentibus,  
 qui ibi præter naturam consistunt tumori-  
 bus nervosa corpora. Igitur vbi vnica dun-  
 taxat vertebra, aut etiam due, aut tres sese  
 deinceps cōsequentes distrahuntur, ea par-  
 te spinam cauari contingit. Vbi verò inter  
*Gibbus* distractas vertebrae, vel vna vel plures ille  
*quādo ac-* cidit. sæ permāserint, sic affectis gibbus accide-  
 re solet. At si in alterutrā partē, vel dextrā  
 vel sinistrā distrahatur, ibidē in obliquum  
 torquebitur spina. Atque in eo quē præmi-  
 simus sermone, vtriusque mentionem fe-  
 cit Hippocrates: excauationis quidem, cū  
 dixit: Quibus secundum rectitudinem tu-  
 mor incedit: oblique verò torsionis, dicēs:  
 Quibus verò alterutra pars afficiebat. Por-

rō



rò exactè admodū atque vtiliter nobis (si  
legerimus) hæc conscripsit. Per excuatio-  
nem quidem, neminem fieri paralyticum,  
quod fit vbi pars aliqua resoluitur. Per o- *Oblique*  
bliquā verò torsionem, malū ad manus vs *spina tor-*  
que procedere, significās ipsum ad infer- *sio.*  
nas partes, vt costas, lumbos, crura, nō pos-  
se descendere. In primis itaque hoc nobis  
sciendū est, alia quidē sequi accidētia, la-  
borāte spinalli medulla proprio affectu, si  
ue id ex sola intemperie fiat, siue simul hu-  
more quopiā affluēte, vt in erysipelate, in-  
flāmatione, atq; vlcere putri. Alia verò cō-  
tusa, q̄a vna vel plures vertebræ suo loco *Spina pro*  
cōmouentur. Quippe vbi proprio affectu *prio affe-*  
spina ipsa laborat, siue id in dextra, siue si- *ctu labo-*  
nistra parte eueniat, citra tamē vertebrarū *rans.*  
luxationē, & quidē si in altera parte dunta-  
xat afficiatur, omniū inferiorum corporis  
partium, quæ è regione nocumenti consti-  
tuuntur, tã sensus quàm motus læditur. Si  
verò vtraque pars affecta est, omnes parti-  
culæ tam in dextra quàm in sinistra parte,  
ei quæ læditur subiectæ, similiter resoluū-  
tur. At luxata vel ad gibbū vel ad concauū  
vertebra, fieri potest, vt nulla omnino par-  
tium inferiorū, vel in sentiēdi vel mouen-  
di facultate virium percipiat. Atque fieri  
etiā potest, vt lædatur eo videlicet modo,  
qui



*Angulosa  
spinae lu-  
xatio.*

*Luxatio  
spinae in  
obliquū.  
Forami-  
na verte-  
brarum,  
p qua ner-  
ui exeunt.*

qui ab Hippocrate in libro de articulorū affectibus definitus iā est. Quū igitur angulosa (vt ipse nominat) fit spinæ luxatio, id est, quū nō paulatim, sed affatim, p inde ac si frāgeretur, pars aliqua curuatur, subiectas partes oēs lēdi necesse est. Paulatim verò facta luxatione, atq; in orbē magis, nihil notatu dignū patiuntur partes, quæ cōmotæ vertebræ supponūtur. Sed in obli-

quum luxatio lædit omnino partes eas, ad 10 quas nerui ex luxatis vertebris procedētes perueniūt: idq; magis in cervice, in thorace minūs, sed multo minūs in lumbis accidere solet. Siquidē in cervice vertebræ inter se cōnexæ æqualiter vtræq; conferunt foramini, vnde neruus pcedit. In thorace aut superior magis, inferior minūs. Sed in lūbis totus neruus ex superiori excidit vertebra: vbi si trāsuerſa eueniat vertebrarū luxatio, eadem secum trahēs & spinam & 200 neruum, illæsum seruat ipsius secundū naturam ortū. In cervice verò, ex loco medio inter duas vertebrae procedētes nerui, per obliquas luxationes, in ea quidē parte, ad quam spina ipsa deflectitur, opprimuntur: in altera verò, tenduntur. Porro tensiones quidem, vbi ingens quoq; inflāmatio accesserit, conuulsio comitatur. Ad compressiones verò earum partiū, ad quas oppres-

sus



sus nervus pervenit, paralyſis, id eſt, reſolutio ſequitur. Igitur non ab re in ea angina cuius in præmiſſo ſermone hiſtoria narrata eſt, ad man<sup>9</sup> uſq; ſuperuenit reſolutio utpote procedētib; nervis ex ſine cervicis ad manus. Quippe ſub ceruice thorax eſt, à cuius vertebris emergētes nervi non ad manus, ſed ad ſpatia intercoſtalia trāmittūtur, paucis qui ex primis procedunt exceptis. Igitur per eas quas nuper dixim<sup>9</sup> 10 vertebrarū luxationes, reliquæ faciei partes omnes, neq; in ſenſu, neq; in motu noxam ſubeunt. Porro genæ duntaxat, ſine mandibula læduntur, ut quæ à muſculosa latitudine, id eſt lato muſculo mouentur. *Latus*  
Conſtat itaq; quod muſculi, quibus mouē *muſculus.*  
di vis aduenit per nervos, qui à cervicis vertebris orti in ipsis diſperguntur, noxam non euadunt, ſi & ſpinam, & provenientes 10 ab ipſa nervos affectus quiſpiā infeſtauerit. Verū qui & quod ſint huiusmodi muſculi, ex nervorū qui à ſpina oriuntur, diſſeſtione didiciſtis: veluti alia quoq; cognitu neceſſaria accidētia, quæ ſequuntur, ubi ſpinæ ipſius vertebrę vel in gibbū, vel cōcauum, vel etiā tranſuerſum luxantur, ex ſecunda particula cōmentariorū, quos in librum de Articulis edidimus, omnia cum propriis demonſtrationibus accuratè con

O



scripta habetis. Quorū summas in præsētia commemorasse operæ precium fuerit. Equidem nonnulla iam percurri. Superest itaque ut ea quæ nōdum tacta sunt, tractemus, ut nihil orationi nostræ deesse videatur. Porro scire debetis, vertebrae à suo positiu luxari, aut ob casum, aut ictum, aut tusionis causam morem præter naturam, nervosa corpora vertebris. ipsis atque spinæ insita, extēdētē. Horū duo sunt genera: aliud enim est, 10 partium quæ secundum naturam se habēt, aliud tumorum quorūdam qui præter naturam accidunt: quos Hippocrates vno vocabulo comprehendēs cruda tubera nominavit. Igitur manifestum est, quòd in præmissa conditione, quam libro secundo de vulgariis morbis descripsit, cervicis vertebrae adiacentes musculi afficiebantur: potuit etiā tuberosus aliquis tumor accedere, ob quē cōcocta nōnullos scire dicit, 20 facta videlicet tuberum concoctione. Cur igitur eos anginosos appellavit? an quia difficulter spirabant, nullo existente vel in pectore vel pulmone vitio? quippe hac in re differt anginae cōcursus à peripneumonia, & laterali morbo, atque ex eo quòd angustiae sensus in gutture est. Prætereà in præ-

*Vertebra*  
*rum luxa*  
*tionis cau*  
*sa.*

*Cruda tu-*  
*bera.*

*Anginosi*

*Anginae*  
*definitio.*

*Libro 3.*  
*Prog.*

sagiorū libro videtur anginae nomine appellare omnes affectus huic loco accēdētes,



tes, quos spirandi difficultas comitatur. In  
 „quit enim: Angina periculofissima est, cele  
 „riterq; enecat, si neque in faucibus, neq; in  
 „cervice quicquā apparet, si dolor vehemēs  
 „est, si† vix spiritus trahitur: etenim eodem †ὁμοπνο-  
 „die iugulat, licet interdum vsque ad alterū inu, qua  
 „aut tertiū aut etiam quartū protrahatur. voce non  
 „Quæ verò in reliquis nō minore quidem solum re-  
 „dolore afficit, extumescit autem, & in fau cta illa spi  
 „cibus ruborem mouet, superiori non mi- ratio, sed  
 „nus periculosa est: sed longius spatium ha qua omni  
 „bebit, † præcipuè si vehemēs fuerit rubor. no diffici-  
 „Sed tum præcipuè malum prolongatur, lis intelli-  
 „quum nō solum fauces sed ceruicem quo- gitur.  
 „que rubor occupat. Maximè verò potest †τὴν τὸ ἐπύ-  
 „ab ea secūda valetudo cōtingere, si rubor θυμὸν μέ-  
 „simul & ceruicē & pectus cōprehendat, ne γὰρ γίνεται  
 „que ad interna reuertatur erysipelas. Igi- quod ferè  
 „tur ex iis verbis haud dubia cōiectura est, non legi-  
 „omnes affectus qui huic loco accidūt, si spi tur in exē  
 „rationē quoquo modo reddant deteriore, pluribus  
 „ab ipso cynanchas (id est anginas) nomina Græci.  
 „ri. Nondum solitis medicis cynāchen per  
 „K, synanchen verò per s, nominare: tātum  
 „abest, vt vel paracynāchen vel parasynan-  
 „chen dicerent. Quippe tum primū homi Synāche,  
 „nes res ipsas neglexerunt, quū nimio stu- parasy-  
 „dio nomina quærere inciperēt. Itaque qua nanche.  
 „tuor inuētis nominibus, quatuor affectus



*Angina  
quatuor  
genera.*

*Cervicis a  
lius affe-  
ctus ang  
ne nō dis-  
similis.*

significari dicebant. Ac notas ipsorum scri-  
bētes, genus illud quod suprà tractauimus  
quum sermonē ex libro vulgariorū mor-  
borum secundo explicaremus, omnino de  
reliquerunt. Atq; hæc sunt quatuor eorum  
genera. Primum vbi fauces inflammātur,  
fauces voco internū oris locum, vbi simul  
cōueniunt & gulæ & gutturis partes extre-  
mæ. Alterum cū neq; fauces, neque reli-  
quæ oris partes, neque etiam externarum  
partium vlla inflammata videtur, laborās  
tamen suffocationis periculum in gutture  
sentit. Tertiū vbi extrinsecus circa fauces  
inflāmatio apparet. Quartū vbi gutturis  
partes tum externæ tū interiores similiter  
affectę sunt. At superest adhuc alius cervi-  
cis affectus, quē ipsi silētio præterierūt, vbi  
ad anteriores partes vertebræ luxantur: &  
quidem solis interdū musculis, qui cū ipsis  
communicant, tumore præter naturā affe-  
ctis, vel nato ibi tuberculo, interdum etiā  
gulā pariter vitiata: nonnunquā musculis  
quoq; qui gulam gutturi iungunt: quin-  
etiā propriis aliquando gutturis musculis,  
qui ipsum aperiunt oblæsis. Per omnes id  
genus affectus spirādi quidem difficultas  
oboritur, sed citra suffocationis periculū:  
laborātes difficulter deglutiunt, atq; dolo-  
re afficiuntur idq; præcipuē cum potus eis  
per



per nares resilit. Accidit etiam interdū, vt  
 excedēte inflāmatōne, & lingua & fauces  
 in tumorem attollantur, quēadmodū &  
 Hippocrates ipse tradidit. Verū huiusce  
 modi cognationū enarratio proposito no-  
 stro nihil conferre videtur. Nā lingua affe-  
 cta, aliæ quoque actiones deperduntur. At  
 vbi vnica duntaxat actio læsa est, & sedes  
 affectæ plures, tū nostri instituti est, vt ex  
 10 reliquorū accidentiū varietate eas discer-  
 nendo inueniamus. Quippe nullo spirita-  
 lium instrumētorum quoquo modo, neq;  
 primario, neq; per consensum affecto, fie-  
 ri minimè potest, vt spiratio lædatur. Quū  
 itaque multa sint spirandi instrumenta, ac  
 numerosa quoq; partium multitudo, qui-  
 bus ipsa consentire cōsueuerunt: nō ab re  
 multa discretione indiget is, qui & prima  
 riō affectas & cōsentientes sedes inuenire  
 20 conatur. Igitur ex sola spirādi specie, illico  
 nō nihil & de affecta sede, & de ipsa dispo-  
 sitione conicere licet. Quippe si videatur  
 laborans inter spirandū totū mouere tho-  
 racem, vt in parte quidē anteriore ad iugu-  
 lum, in vtroq; latere † ad ceruicē, in parte  
 posteriore ad scapulas vsq; motus ipsius  
 ascēdat, tres ex huiusmodi spiratiōe dispo-  
 sitiones significantur. Vna est, flammea in  
 pulmone atq; corde caliditas: Altera in ali

*Spiratio-  
 nis vitium.  
 Libro de  
 causis re-  
 spirat.*

† *ἡ ἀρχὴ  
 τῶν ἐν-  
 σπν.*



*Aestus  
signa.*

quo spiritaliū instrumentorum angustia. Tertia est facultatis musculos thoracis mouētis debilitas. Quūq; huiusmodi spirationē cōspexeris, in primis arteriæ pulsationē perpēdere oportet, hæc em̄ quantum sit calor indicat. Atq; de iis in libro De præfagiis à pulsu, iam scriptum est. Deinde spirationem ipsam cōsidera, an multa, an frequens, an exufflando fiat. Postremo thoracem in pectore tange, quem si ardentem inueneris, iam oēs copiosi caloris notas te habere nō dubita. Quibus ex abundantia accedit faciei oculorūq; rubor, capitis ardor, sitis vehemēs, lingua arida & salebrofa, dicēte infirmo ardere sese. Vbi verò incēdij signis modū seruātib<sup>9</sup> thorax

*Angustia  
in spirita-  
libus in-  
strumentis.*

vehementer dilatatur, angustia in spiritalibus instrumentis esse portendit. Itaq; cōsideres oportet, an guttur sit affectū, an pulmo, an thorax ipse humoribus impleatur, an tubercula in ipsis nata sint, quo in genere etiā abscessus numerant. Atq; gutturis affectus tum primarios, tum eos quib<sup>9</sup> per cōsensum infestatur, iam pcurrimus. Pulmonis aut thoracisq; vitia paulò post accuratiū psequemur. Nam in præsentia spinæ duntaxat affectus tractare pposuimus, tum alios, tū illos q; ei per imbecillitatem vocatam accidere solent. Porro so-  
les



let imbecillitas accidere, interdū cerebri vitio, vtpote à quo & sentiēdi & mouendi facultatem recipit. Interdum ipsa dūtaxat spina primario affectu laborante, idq; ob peculiare intemperiem, vel toti spinæ, vel diuersis ipsius partibus aduenientē, quam vulgarium medicorū mentes nequaquam comprehendere valent, quum tamen creberrimè videant laborantes quosdā adeò resolutos, vt vix digitos possint mouere, quāuis omnibus thoracis partib<sup>9</sup> spiritus trahatur, nullo ardente calore ad magnā spirationē ipsos cogēte. Id verò ob huiusmodi causas eis accidit. Nā dum quiescit animans, liberās spirationē solum septum trāsuersum modò valeāt vires, efficere solet. Vbi verò ob infirmitatē, spirandi munus perficere non valet, tum intercostaliū musculorum concurrit auxilium. Quòd si prætereà maiori animal spiratione egeat, tunc superni muscoli omnes, quorū maximi scapulas secū manifestè mouēt, ad spirandi actionem requirūtur. Quum itaq; hominē spirandi opus omnibus thoracis partibus perficere videris, nō fuerit tamē frequens spiratio, quantum thorax dilatur perpēde. Insuper & narium pinnas, et enim ipse quoque & dilatantur & contractantur. Dilatatur autem thorax quidem,

*Spina imbecillitas.*

*Libera sp<sup>o</sup> ratio.*

*Dilatatio thoracis in angustia spiritus.*



verum non similiter ut in ardentibus febribus, quum adhuc valent vires. Nam in iis magna ex parte totus thorax dilatari consuevit. Neque etiam ut in illis, quibus id evenit ob aliquam spiritalium instrumentorum angustiam, ut in agina, atque in dyspnoea, quam fluxio affatim descendens induxit. Neque quibus ab utraque causa pervenit, ut in peripneumonia. Quippe hoc morbo affecti, & maxima & frequentissima spiratione utuntur. 10  
 Ceterum quemadmodum ob virium infirmitatem, ita ob unius quoque particulæ particularē imbecillitatē, omnes thoracis partes dilatari coguntur. Igitur athleta Secundus nomine, qui satis quid pateretur intelligebat, sentire se manifeste in septo transverso dixit imbecillitatē. Atque idcirco cogebat intercostales musculos sine intermissione movere, atque nonnumquam superiores quoque, interdum autem zonam circum- 10  
 dans præcordiorum partibus, sola transversum septi motione, sufficere spirabat, quo tempore quiescebat. Verum an ad septi transversum musculum, an ad nervos qui ad ipsum perveniunt, aggregatum ex utrisque pertineat huiusmodi imbecillitas, mihi quidem explicatu perdifficile videtur. Idem spirationis genus etiam in alio quodam notaui, quem cum aliquando equus in præcordiorum

*Secundus athleta compresso spiritu laborans.*

*Spiratio laesi ob caliditatem equi in præcordiorum regione.*



rum regione calcitrasset, adeò atrociter,  
vt oborta in septo trāsverso inflāmatione,  
mortis periculū immineret. Is licet euase-  
rit à periculo tutus, ab imbecillitate tamē  
liberari nequiuit. In alio etiā, q̄ à vehemē-  
ti peripneumonia infestabatur, brachij tā  
† posteriores, quā internæ partes, à cubito  
ad summos vsq; digitos, sensus difficulta-  
te laborauerūt, atq; motus quoq; nonni-

† in τῶν  
ὀπίσθω.

10 hil læsus est. Huic prætereà nerui, q̄ in pri-  
mo atq; secūdo intercostali loco inueniū-  
tur, noxam subierunt, quorum primus non  
contemnendæ magnitudinis, per intimas  
partes abditus deferret, sed ei q̄ ipsum præ-  
cedit admixtus, atque multiphariam diui-  
sus, vt in arte secandi corpora videre est,  
cuius etiā partes aliquæ p̄ interiorē cu-  
biti regionem, vsq; ad digitorū extrema  
perueniunt. Alter verò nervus tenuis qui-

Neruoꝝ  
qui in pri-  
mo & se-  
cundo in-  
tercosta-  
li spatio  
sunt, pro-  
ductio vs-  
que ad  
manus.

20 dem, nulliq; admixtus, per axillā sub cute  
ad brachiū defertur, dispersus per cutis tā  
exteriores, quā internas partes. Huic ho-  
mini celeriter sanitas reddita est, adhibi-  
to medicamento ei loco, vnde nerui pro-  
deūt, iuxta primū, ac secundū intercostale  
spaciū. Iam sanati sunt quoque nonnulli,  
quibus vtrunque crus paululūm resolutū  
erat, adaptato lumbis medicamēto, in eo  
spinalis medullæ loco, vnde crurib⁹ nerui

Cruris re-  
solūti sa-  
natio.



adueniunt, nullū resolutis cruribus medicamen adhibendo. Neque enim ipsotum, sed medullæ p̄prius erat affect⁹. Vidimus *Difficul-* alium, cui magna oborta suppuratione in *tas motus* altera nate, iuxta cruris initiū, nervi eiusdem cruris per incisionem nudati sunt, sed *ex* *suppura-* *tione orta* ea parte sanata, toti mēbro mouendi *in* *altera* *nate.* *ficultas* accidit. Itaque coniciens durum quippiam, à priori inflammatione in nervo derelictū, quòd huiusmodi dispositionem induceret, affecto loco idoneū medicamē adhibēdo, hominē perfectè sanaui. Quod autem de partibus faciei dictū est, idēde reliquis quoq; omnibus est intelligendū. Quippe vnica duntaxat pereunte actione, solum musculū, qui ipsam efficere solet, aut neruū ipsius affectam esse putandum est. At vbi plures actiones vitiatę sunt, nō eodem in loco, accidit interdum, omnes eius musculos, à communi aliqua *20* causa lēdi. Fieri etiā potest, vt nervus aliquis qui musculis illis communis est, afficiatur. Prætereā piscator quidam, quū in fluuio pisces venaretur, adeò circa sedē & *Piscator* *circa sedē* vesicam infrigidatus est, vt ipso inuito effluerent, & alui excremēta, & vrina. Atque *et vesicā* hic quoq; p̄ calida remedia affectis musculis adhibita, celeriter sanus euasit. Itē alius *infrigida-* *tus.* *eisdem molestatus accidētibus, sine tamē* *manī*



manifesta causa, laxis circa os sacrū ner-  
uis, multo tēpore per multa præsidia, vix  
sanatus est. Igitur quod p̄tinus ab initio  
dicebā, illius nunc quoque mentionem fa-  
ciendo, ad alia me diuertam. Etenim si ex  
arte quæ corpora secare docet, ad quā par-  
ticulā descēdāt singuli nervi, à spina pro-  
deuntes cognoueris, affectas sedes quā fa-  
cillimè inuenies. Ex artis itaq; actionibus  
10 horum omnium examē re ipsa deprehen-  
dite. Nanque sæpenuerò vidistis ex hu-  
iusmodi notitia, manifestè iuuari laboran-  
tes. Quippe nō solū crura, & manus te-  
merè ac frustra vulgares medici, tota die  
noctūq; calidis medicamētis illinūt, præ-  
tereūtes locū, vbi vel spina, vel nervus ali-  
quis ex ipsa emergēs lædit. Verū etiā ca-  
put cuiusdā, nō ita pridē, impositis medica-  
mētis vehemēter calidis, vlcerauerūt, pu-  
tātes sensum ipsius grauiter lēsum, hoc pa-  
20 cto posse reuocari. Atque hunc ipsum sa-  
nauimus, inuenta sede affecta, tum ex reli-  
quis accidentibus, tum ex euidentibus cau-  
sis. Nam super singulis interrogauimus.  
Quarum vna huiusmodi erat: Quū sub  
multa pluuia acveto impetuoso ambulaf-  
set, palliū circa cervicē madefactum aie-  
bat, adeò vt vehemēti se frigore in ea pte  
affectū sentiret. Itaq; si sciueris ex primis  
spinæ

*Partes af-  
fectæ di-  
gnoscen-  
da, prius-  
quam ad-  
hibeantur  
remedia.*



*Nervi ex primis spinæ vertebris ad caput.* spinæ vertebris, quatuor nervos ad caput ascendere, à quibus pellis ipsum ambiens, sensum accipit, facile sedē affectam inuenies. Hac igitur sanata, capitis quoque pellis pariter sanata est, vtpotē quæ nulla primaria affectione laborabat. Medici verò neque huiusmodi nervos, neque eos qui per singulas cutis partes dispersi sunt, cognoscentes, quāvis præsentaneū sit eis remediū, quod minime particulæ iuxta nervi initium adhiberi deberet, ipsi partes illæsas multo negotio molestant. Ego verò sæpenumerò vos monui, alios quod in ipsa spina veluti radicem habere, alios verò ut ex magnis ramis, atque ipsis quoque ex spina exortis, procedentes, qui rursus diuisi distribuunt. Atque alij per valde multas cutis partes, alij per pauciores. Quo magis miror dissectiones ipsos, illos non cognoscere, quā in nervorum resolutione querunt, quā ob causam resolutarum partium non semper & motus & sensus pereat? videntes aliquando sensum duntaxat, aliquando & sensum & motum simul deperdi. Arbitratur namque nervorum, qui per musculos dispersi sunt, reliquias, ad cutem tendere: quumque diuisus per musculum nervus affectus est, si quidē vehemens fuerit vitium, & sensum & motum simul lēdi, sin læuius fuerit malū, seruari quidē sensum, vtpotē qui non tan-

*Sensus & motus deperditi.*



tum roboris desideret, motū verò, eò quòd robustis egeat viribus, perire. Interdū em̄ vnus musculus, vel totum crus, vel manū mouet, ac proinde virib⁹ indiget: qui si ita afficiat, vt munus suū perficere nequeat, membrum ipsum immobile relinquit, sentiendi verò facultas partiū affectiones discernēs, illæsa tūc permanet vt quæ nō ita validis egeat viribus, quippe nihil minus, 10 imò magis etiā, pati possunt partes, quàm debiles fuerint. efficit em̄ imbecillitas, vt facilius affectio à sensu dignoscat. Igit̄ ratio ipsorū in huiusmodi quidē neruorum resolutione p̄babilis esse potest. Vbi verò deperdita sentiēdi facultate, motus nō perit, nōnulli quidē adeò vanas adduxere rationes, vt satius fuisset eos cōticescere, nō nulli verò cognita huius quæstionis difficultate, nō grauati sunt dicere, huiuscemodi 20 di paralysis speciē, qua seruato motu sensus perderetur, neminē vnquā vidisse. Sanè qui arrogāter sibi sectæ alicuius principatū vsurpant, artis verò opera nunquā in exercitationis vsū duxerūt, iis nihil tā difficile videtur, quod nō intrepidē profiteātur. Verū magna ex parte mentiūtur, atq; vt scribunt nonnulla, perinde ac si frequenter conspexerint, quorum tamen ne somnia quidem vnquā viderunt: ita plurima

*Sensus amissus motu inco-*  
*lumi.*



rima nunquam videri aiunt, quamuis creberrimè conspexerint.

De sanguinis sputo. CAP. VI.

*Sanguis à capite ad fauces irrumpens.*  
**A**Tque conuenit quidem inter medicos, sanguinem è gula ventriculòq; vomitione, ex spiritalibus partibus tussi, ex faucibus & gurgulione sreatu, ex ore simplici expuitione expelli. Nos verò sanguinem, qui à capite, ad gurgulionis partes internas, vt ad fauces affatim descendebat, tussiendo educi sæpenumerò conspeximus: quippe subito gutturi irruens, tussim mouere potest. quare diligēter aduertere animum oportet, ne aliquādo huiusmodi sanguinem, ex spiritalibus instrumentis ascendisse putemus, exemplo illorum medicorum, quos equidem noui non rectè erroris accusare præstātissimos medicos, quum ipsimet errarent, credētes huiusmodi sanguinis eruptionem esse quàm periculosissimam: tanquàm pulmone vehementer affecto. Neq; enim par est exigua vena dirupta tantum effluere sanguinem. Cæterum cōtingit plærunque vt vel *Sanguis p* *erosa,* vel *exesa,* vel *utrunq;* nominare uolueris, vena, sanguis affatim tussiendo eiciat. Quū enim retroactis tēporibus, quis *tussim eie* *elus, vena* *erosa.* ex interuallis quotidie nō ita multū sanguis



guine tussiedo expuere cōsueuerit, superueniatq; ei postea multi sanguinis inter tussiedum eruptio, & quidem neq; ab alto cadenti, neque in certamine, neque palæstra grauitè vulnerato, neq; etiam sub vilo graui pondere oppresso thorace reliquum fuerit, vt coniiciamus, ob insignem erosionem, plurimum sanguinē inter tussendum fuisse reiectum. Atque non pauci sic affecti, pulmonis quasdā particulas simul cū sanguine eiecerunt. Quocirca diligēter cōsiderare oportet, an spumofum quippiā simul educatur. Id em̄ efficacissimū fuerit indicium, quòd ex pulmone facta sit excretio. Haud secus si bronchi pars quædam, aut arteriæ, aut venæ tunica, aut etiā pulmonis ipsius carūcula eiicit. Quippe nihil horū accidit iis, q̄ ex thorace sanguinem tussiendo producunt. Ac ne dolor quidē infestat eos, quibus à pulmone sanguis erumpit, vtpote qui duos nervos per quàm renues, à sexta neruorum à cerebro ortorum coniugatione recipit, extrinsecus per membranam ipsum continentem dispersos, & qui per visceris profunditatem non extenduntur. Verū thoraci (vt scitis) multi ab internis, multi etiam ab externis partibus adueniūt nervi, quib⁹ facile dolores percipi possūt. Præterea thorax muscu

*Pulmonis particula cum sanguine excreta.*

*Dolor nō infestat eos, quibus à pulmone sanguis erumpit.*



musculis, ossibusq; abundat, pulmo verò laxus est, atq; à compressione, aut cōtusione tutus. Proinde thoracis dolores, intēsiore sunt pulmonis, remissiores. Quū igitur dolente thoracis parte quapiā, sanguinem quis spuendo reiecerit, neque multum, neque rubrū, sed nigricantem, grumosūq;, huic thorax primaria affectione infestat. At sanguis affecto thorace, per pulmonem educit, vt in suppuratis affectib<sup>9</sup>, pus quod inter thoracem & pulmonem, sensus iudicio contineri percipitur: ad eundem modum in pleuriticis sputū coloratū emitti solet, quemadmodū in quinto huius commentationis libro vtcunq; dicemus. Consequēs est vt de vlceribus quæ sanguinis reiectioni superuenire cōsueuerunt, deinceps dicere aggrediamur. Ea in pulmone creberrimè fieri possunt, ac curationē (vt quibusdā videt<sup>r</sup>) nequaquā admittunt, aut (vt alij putant) difficulter admodū sanantur. At in thorace dirupta vasa, à quibus sanguis expuitur, magna ex parte cōglutinantur. Nunquā em huiuscemodi vlcera, vel diuturna, curationi omninò resistunt. Quæ verò in pulmone longo iam tempore permanferunt, quamuis aliquando curentur, relinquitur tamen in ipso res quædam callosa, fistulosaque, quæ tractu tempo

*Pulmonis  
vlcera.*

*Thoracis  
vlcera.*



temporis, à leui occasione expelli solet. Atque cū iis quæ inde expuuntur, miscen-  
 tur ramenta à medicis vocata, ac cruoris  
 exigua quædā guttula, qua in re, cū vlc-  
 ribus in aliis sedibus genitis, cōmunicāt.  
 Verūm ex gula vētriculoq; vomitu: ex re-  
 nibus & vesica, cū vrina: ex intestinis ve-  
 rò, deiectione excernūtur. Sed ex spirita-  
 libus instrumētis, nihil siue tussi expui po-  
 test. Quòd si plurib<sup>9</sup> deinceps diebus ali-  
 quis cruorē & screauerit, & emūxerit: idq;  
 citra capitis vel dolorē, vel grauitatē, si-  
 ue præsentem siue præteritam, neq; is ex  
 ictu pcedat, huius & totū per nares mea-  
 rum, atque eam oris partē, qua ad nares  
 foramē tendit, accuratē considerare opor-  
 tet. Nā fieri potest huiusmodi accidēs, hi-  
 rudine huic loco adhærere, quæ quidē in-  
 dies augeri solet: quāuis enim primis die-  
 02 bus, vipote exigua, sensum effugiat, tertio  
 tamē, quartove die, haud obscurē videri  
 potest. Eadē ratione ex vētriculo, quoq;  
 cruor epota sanguisuga euomitur. sed est  
 huiusmodi cruor tenuis, saniei q; speciem  
 refert, siue is ex vētriculo, siue narib<sup>9</sup>, siue  
 ex ore feratur. Igitur cū talem videris,  
 ac hominis cōsiderato habitu, super præte-  
 ritis eū interrogaueris, ex oībus rei ipsius  
 veritatē facillē coniicies. Equidem quūm

*Ephelcis.*  
*Ramētū.*

*Hirudo*  
*epota, vel*  
*naribus ad*  
*hærens ex*  
*puitionem*  
*& vomiti*  
*onem san-*  
*guinis ex-*  
*citāt.*

*Caue ne*  
*hic per sa-*  
*niem pus*  
*intelligas,*  
*sed id quod*  
*à Græcis*  
*ichor, à*  
*barbaris*  
*virulētia*  
*dicitur.*



viderem hominem, integra valetudine,  
 huiusmodi cruorē euomentē, interrogavi  
 qua victus ratione antea fuisset vsus: ille  
 verò inter alia quæ narrauit, hoc quoque  
 addidit, quòd cū nocte quadam sitiret,  
 misso puero qui aquā afferret, ex immu-  
 do fonte bibisset. Quibus audiris, sciscita-  
 tus sum, apparuissēntne aliquādo sangui-  
 suga in ipso fonte, qui quum id quoq; fa-  
 ceretur, epoto subinde idoneo pharmaco, 10  
 hirudinem vomitione reiecit. Porro quū  
 alius quispiam huiusmodi cruorē emun-  
 geret, & expueret: ipso narrante audiui,  
 eum rure æstatis tempore, in stagno quo-  
 dam, cū cæteris iuuenili ludo qualē ado-  
 lescentes in aqua ludere solent, exercita-  
 tum: tū ego sciens in eo stagno sanguisu-  
 gasse, duxi laborātem ad splendorem,  
 conuersoque directē ad solis radios na-  
 rium foramine, in eo meatu vbi nasus ad 20  
 oris regionē perforatur, hirudinis in mea-  
 tu latentis caudam conspexi. Has igitur  
 historias, vtpote perquā conducibiles,  
 vobis narrare operæpretium duxi.

*Quibus notis vitata voce, affecta sedes de-  
 prehendatur.*

## CAPVT VII.

QVòd in proposito sermone, lationē  
 putare oporteat, etiā si non penitus  
 tota



rota partis actio secundū naturā deperditur, sæpenumerò iam diximus. Nec ab re fuerit id in præsentia monuisse. Præterea (quāuis nō ignoretis) monitos vos velim, non eandē esse rem, vocē & sermonem. siquidē vox vocalium instrumentorū munus est: loquela verò, eorum quæ sermoni deputata sunt, inter quæ lingua principatū obtinet, cui nō parū conferūt, & nares, & labra, & dentes. Sic etiam vocis instrumenta sunt, guttur, & musculi ipsum mouentes atq; nerui, qui à cerebro ipsis vim deferunt. Igitur si vel claudētes, vel aperiētes guttur musculi, immobiles reddantur: qui sic afficitur, obmutescet. vbi verò, vel difficulter mouentur, vel palpitāt, aut tremūt, pro affectionis ipsius modo, vox ipsa lædetur. Similiter, si vel conuellendo, vel quatiēdo, mouētur, aut vbi imbecillæ sunt ipsis vires, siue ob suā ipsorū, siue ob neruorū ipsos mouentiū affectionē obscurem & paruum efficient vocem. Quòd si alius quispiam ex mouentibus guttur musculis quoquo modo afficitur lædetur quidem vox, sed paruum erit vitium, atque sic affectus, neque obmutescet omninò, neq; ita exiguā habebit vocē. Igitur vt ex musculis guttur mouētib; præcipui habentur ij, qui ipsum aperiūt, & claudunt: ita

*Vox.**Loquela.**Vocis instrumenta.**Obscura**& parua**vocis causa.*



*Nervi  
vales.*

vocalib<sup>9</sup> nervis, ij quos recurrētes vocāt, qui & ipsi sextæ coniugationis pars sunt nervorū, qui à cerebro oriuntur, quemadmodū & alij, qui quidē per ipsum dispersi differūt ab illis, eò quòd à nervis sextæ coniugationis non in ceruice, sed cū ad thoracis regionē peruenerint, separantur. Nullus itaque tam ineptus dissector est, qui sextā cōiugationē totū secet, inuitus, quāuis recurrentes nervi ob imperitiam nonnunquā diuellantur. Accidit verò interdum in magnis asperæ arteriæ vulneribus, vt vnā cū ipsa arteria, vel alter, vel vterq; incidatur. Porro per chirurgiā quoq; infrigidati, tārisper vocē impediēt, donec calefacti, naturalē temperiē recuperauerint. Quinetiam vitari vocē haud

*Recurrentium  
neruorum  
dissectio.*

*Vitiata  
vox à mu-  
sculis à mē-  
brana gut-  
turis, &  
destillati-  
onibus &  
vehemēti  
exclama-  
tione.*

obscurē cōtingit, quū vel acutior, vel maior redditur, ob id q̄ fauces à suis muscu-  
lis nequeant intendi. Itē grauissimē lædi-  
tur vox, vbi mēbrana, quæ faucib<sup>9</sup> & gut-  
turi cōmunis est, multa humiditate riga-  
tur. Quòd etiā destillationes eadem ra-  
tione vocē raucam efficere possint, nemo  
non intelligit. Vehemēs quoque exclama-  
tib, similiter vocē afficit, vtpote quæ simi-  
lem inflammationi circa iam dictā mem-  
branā, atque gutturis musculos, parit affe-  
ctum. Caterum quū gutturis interni mu-  
sculi



sculi inflammantur, eū affectum, anginā *Angina.*  
 esse constat, quæ simul & vocem, & spi-  
 rationem lædit. Ac idē quoque in vniuer-  
 sum facere solent omnes præter naturam  
 tumores, siue in spiritalibus viis exorian-  
 tur, siue extrinsecus ipsas comprimāt. Sic  
 enim gula quoque vbi inflāmatione af-  
 fecta est, vt cōprimat asperę arteriæ tūni-  
 cam, qua cartilaginū ipsius partes extre- *Cartilagi-*  
 mæ sigmoides vocatæ (id est, quæ sigma *nes sigmoides.*  
 literæ figurā referūt) coniungūtur, & spira-  
 tioni, & voci noxā afferre cōsuevit. Haud  
 absimile quoq; vitium inducit, vertebra-  
 rum cervicis in anteriorem partem luxa-  
 tio. sed de his iam antea dictum est. Igi-  
 tur omnes huiusmodi affectus voci adue-  
 niunt, propriis ipsius instrumētis familia-  
 ri aliquo vitio, siue primogenia affectio-  
 ne, siue per cōsensum laborātibus. Nā id  
 ad propositum sermonem nihil conducit.  
 Sunt prætereā alij affectus, cum peculiari  
 sua materia priuatur. Atq; in cōmentariis  
 de voce dictū iam est, quod propria huius  
 actionis materia, generatim quidē loquē-  
 do, est exspiratio: secundā speciē verò, at-  
 que propriā differentiam, exufflatio. quæ *Expira-*  
 quidē est, quū affatim spiritus foras effertur, *Exuffla-*  
 intercostalib<sup>9</sup> musculis ad hāc actio- *Exuffla-*  
 nem cōcurrentibus. Vnde fit, vt per vehemē- *tio.*



mentia thoracis vulnera, atq; oīnò ipsius in altera parte resolutionē, in primis quidem semispirās, ac mox animal semiuocale euadat: idq; per accidens. In apoplexia verò sopore, morbo comitiali, vigilāti sopore, cōmuni ratione earū actionum quæ ab impetu & voluntatis imperio procedunt, vocē lædi cōtingit, siue spinæ partēs primæ, siue simul cum iis cerebrū quoque afficiatur. His itaque quinq; inter se cōse-  
*Strepens* quentiā quadam conuenientibus, expira-  
*exufflatio* tione, exufflatione citra strepitū, strepenti exufflatione, voce, loquela: si earū prima lædatur, reliquas omnes lædi necesse est: vltima verò læsa, reliquæ haudquaquam læduntur. At cū secūda, tres reliquæ læduntur, cū tertia, duæ vltimæ: cū quarta verò, sola postrema læditur. Etenim si nihil oīnò spiret animal, vel ex vtrisq; thoracis partib⁹, vel ex altera parte dūtaxat, & qui-  
*Exuffla-* dem si ex vtrisq; celerrimè suffocabitur:  
*tio citra* si ex altera tantū, semispirās, atq; semi-  
*strepitū.* uocale reddet: perdetq; simul reliquarum deinceps duarū actionū partem dimidiā. Quarū alteram exufflationem citra strepitū, alteram verò, strepentem nominare cōsueuimus. Quòd si expiratione seruata, corrūpatur exufflatio, reliquæ tres actiones, strepens exufflatio, vox & loquela, si-  
mul



mul corrūpentur. Sicut voce pereunte lo-  
 quelā quoq; perire necesse est. Cum itaq;  
 dictarū actionū opifices musculos cogno-  
 ueritis: superest considerare, qui ex ipsis  
 proprio affectu laborent, & quorū actio  
 lædatur per accidens. Quodd si quidpiam  
 eorū, quæ ex corporū dissectione vidistis,  
 obliuioni tradideritis, admonebunt vos,  
 ij quos de respirationis causis, atq; devo-  
 10 ce perscripsimus, cōmentarij. Atq; de his  
 ipsis, in secundo libro de Viuorum disse-  
 ctione, etiā dictū est. Sanè expirationem  
 faciūt, vniuersi thoracē contrahentes mu-  
 sculi: Exufflationē (quæ vehemens expi-  
 ratio est) intercostales maximè: Strepē-  
 tem exufflationē, ij qui in faucibus sunt:  
 Vocem verò ipsam, gutturis musculi effi-  
 ciūt. Sed lingua articulatim vocē distin-  
 20 guēs, loquēdi vsum præstat: atq; nōnihil  
 ad hanc rē conferre vidētur dētes, labra,  
 nariū foramina, palatū, gurgulio: præter-  
 eā mediocri linguæ ipsius vinculū. Itaq;  
 balbis blæsisq;, atq; aliis q̄ impedita sunt  
 loquela, loquutionis instrumentorū ali-  
 quod, aut cū natura ipsum formaret, aut  
 postea, lædi certū est. Veluti quum vel po-  
 lypus, vel aliud quidpiā nariū foramina  
 obstruit, aut ex primis dentibus aliq; de-  
 perdit<sup>r</sup> est, aut vbi labia fuerint mutilata.

*Musculi  
 expiratio  
 nē et exuff  
 flationē effi-  
 cientes.  
 Loquendi  
 vsus.*

*Balbi.  
 Blæsi.  
 Lib. 6. a-  
 pho. 32.*



Verum quo pacto quidem tenuem obtineant vocem: ac præterea quomodo aliarum vocis, tum differentiarum, tum affectiones, fieri possint, ut rauca, resonans, tenuis, aspera, obscura, in commentariis de voce sufficienter diximus.

*Quibus notis sedis affecta in dyspnœa deprehendatur.* CAP. VIII.

**A**Tque de dyspnœa (id est difficili respiratione) iam antea, ubi spinarum passionibus percurramus, multa dicta sunt. Quibus nunc in memoriam reuocatis, quæ ac præsentem contemplationem supersunt, subiungam. Itaque in vniuersum expedite vos meminisse velim, musculorum thoracis mouentium, nervorumque, qui ad ipsos perueniunt, quos in corporum dissectione vidistis. igitur introeuntes ad hominem difficulter spirantem, in primis considerate, an omnes thoracis muscoli moueantur, an soli intercostales sine superioribus, atque an simul cum intercostalibus præcordia quoque moueantur. Quum itaque conspexeritis omnes moueri, vnam ex tribus, quas dicemus, causis, huiusmodi motionem efficere putandum est, ac deinde quæ sit illa, quæ nunc infestat, perpendere oportet. Quod si non omnes mouentur, aliter definire. Subiiciamus igitur aliquam

*Difficilis  
spiratio-  
nis causa.*



aliquē omnes simul mouere musculos, vt  
pectus vnā cum scapulis manifestē suble-  
uetur. In hoc opere ex trib⁹ vnū aliquod  
coniicere necesse est: Aut virium imbecil-  
litatem, aut viarum spiritus angustia, aut  
vehementē in corde & pulmone calorē.  
Quamuis interdū duæ, ac nonnunquā  
(licet rarò) tres quoq; ex iam dictis causis  
concurrere possint. Atqui tribus quidē si-  
mul conueniētibus, proximā mortem ti-  
mere oportet. vbi verò duæ fuerint, diffici-  
le est agrū seruare. Sed vnā duntaxat infe-  
stāte, peculiari opus est finitione, vt scia-  
tur, utrū ad sanitatē pueniat ager, an sub  
malo succūbat. Igitur vbi vires dūtaxat  
fuerint infirmæ, ad tria mouentiū muscu-  
lorum genera venire, eosq; omnes ad mo-  
tionē excitare solent, vno genere mouere  
pectus nequeūte. Quippe si septū transuer-  
sum solum, veluti quū secundū naturā se  
habet, sufficiēter mouere posset, neque in-  
tercostalibus, neque superioribus muscu-  
lis indigeret: quoniā verò imbecillū est,  
omnes sensim mouet, sed neque frequen-  
tem, neq; raram omninò facit actionem.  
His igitur adhibenda est mens, nā cætera  
haud difficulter per ea discernūtur. Sanē  
plurimū auctio in spiritalib⁹ instrumētis  
calore, oībus quidē thoracis musculis agit

*Vires in-  
firmæ in  
dyspnæa.*



animal, sed velox, frequēs, & vehemēs est eorum actio, quando videlicet citra viriū imbecillitatē, calor infestat. Ad viriū imbecillitatē, vbi flammeus calor nō accesserit, neq; velox, neq; frequēs omninō comitatur motus: proinde non ita multū, omnes thoracis partes delatare potest. Quippe hoc dyspnœe genus, cū ea quę ob nimia incensionem facta est, vnū commune habet, quod omnes thoracis muscoli per ipsam agere coguntur. Quinetiā vbi ob plurimū calorem spiratio difficilis est, prater magnitudinem, frequentiam, & celeritatē, hoc quoque accedit, quod calidus feruensque spiritus, exufflando produci-  
 10  
 tur. At in virium imbecillitate, nulla ab ore facta exufflatione spiritus, ex solis naribus emitti solet. Quod si per inspirationem cuiuspiam narium pinnę manifestē cōtrahi videantur, id verō efficax prostrati  
 20  
 roboris indicium est. Ob spiritalium verō instrumentorū angustiam, totus quidem thorax magna ex parte, & celeriter, & frequenter dilatatur: sed qui sic laborāt sine exufflatione spiritum reddunt. Si verō simul conueniunt in spiritalibus instrumētis, & calor, & angustia, vt in peripneumonia: tū neque maxima, neque frequētissima, neque etiam celerrima spiratio sufficere

*Narium pin-  
 na cōtra-  
 ctæ in dys-  
 pnœa.*



cere potest: sed surgere tentat sic laborantes: etenim sentiunt hoc pacto thoracē facilius dilatari, quippe qui decumbētibus in sese concidit, cō quod pectoris partes ad spinā declināt: quā erecta, thorax etiā simul fertur, nō amplius seipsum grauās.

Ac similiter quoq; respirare solēt, ij quibus asperæ pulmonis arteriæ plurima defluxione opplentur, aut vbi ex proximis

10 locis in ipsas aliquid deriuatū est, à superiorib<sup>9</sup> verò vnica duntaxat re differūt, q̄ neq; exufflant, neq; calidū spiritū emittunt. Sic etiā iis quibus inter thoracē pul-

monemq; magna puris quātitas collecta est, quos suppuratos vocant totus thorax attollitur: sed neque calidus est ipsorū spiritus, neq; etiā exufflādo emitti solet, nisi adurēs fortasse febris accesserit. Verūm ij celerimē suffocātur, tū ob affectū ipsum,

20 tū q̄ vires omnibus suppuratis ex necessitate imbecilliores reddūtur. Sed non necessario influxionibus quæ ad pulmonē irruunt, aut peripneumonia: aut asthma (id est, anhelatione) robur prostermitur.

Nā contrā per anhelantes affectus, crassus & viscosus humoribus pulmoni impactis vires robuste, cōstātesq; pmanere possūt.

Atq; si tuberculū, coctū difficile, aliquādo in ipso natū fuerit, thorax maxime q-

*Suppuratorum respiratione.*

*Fluxio in pulmonē.*

*Tuberculum in pulmone.*

dean



† πολὺν δὲ dem dilatabitur, † sed nō ita multum inspi-  
 ρισθῆναι- rabit aërē. † Ac licet continenter spirare co-  
 σθαι τὸν gatur, nō tamē exufflare solet, id enim au-  
 αἶρα, mul- cti caloris propriū est. In eādē dyspnœa  
 tum verò speciem, sed alia ratione, labūtur ij quoq;  
 aërem in- quos angina molestat, ob angustiam quæ  
 spirabit. non sit in cōcavitatibus, quæ inspirationē  
 hic autem suscipiūt, sed in iis quæ ipsam transmittūt.  
 aliū co- Quibus verò, & abscessus, & inflammatio,  
 dicem secu atq; humorum plenitudo, in thoracis aut  
 tus est, cui pulmonis cavernis consistit, nulla obstru-  
 ctione accidēte in gutturi atq; asperæ ar-  
 scribimus. teriæ concavitatibus, illis videlicet quæ in  
 † καὶ διὰ spiratū aërem suscipere solēt, si tūm angu-  
 τῶτο, ideo stia cōstringat, ex necessitate sequetur ma-  
 que. gna thoracis dilatatio, sed, nō ita multus  
 trahetur spiritus. Proinde laborantē & cele-  
 riter, & frequenter spirare necesse est. Præ-

*Magna  
 respiratio  
 nis diffe-  
 rentie.*

omnibus autē vos meminisse velim, ma-  
 gnæ respirationis geminas esse differētias. 20  
 fit enim interdū ob dilatationis à thorace  
 procedēis magnitudinē: interdū verò, ob  
 inspirati aëris multā essentiā. Scitis nimi-  
 rū quòd sæpenumerò vos admonere soleo  
 earū rerū, quæ à prioribus omissæ sunt. Nā  
 quas ipsi persecuti sunt, earū propter scri-  
 ptorū multitudinem, facilis atq; in prom-  
 ptu est memoria. Quæ verò ab Hippocrate  
 (quamvis accuratè de dyspnœa scripserit)  
 non



nō sunt definita, ea posteriorum nemo explicauit definiūtve. Idcirco necessariū esse putauī, creberrimē illorū vos admonere. Igitur quicunq; sine inflāmate, vel o-

mninō sine aliquo prāter naturā tumore aut angustia spiritaliū instrumentorū, per febres ardētes difficulter spirāt, iis inspira-  
 10 ti aëris quātitas, magnitudini dilatationis thoracis, proportionē responder. Quibus

*Dilatatio  
thoracis  
quādo ve  
hementior  
aut pericu-  
losior.*

verò, vel tumor, vel angustia, sine flāmeo calore in spiritalib<sup>9</sup> est, in his thoracis qui dē dilatatio maxima est. id verò quod in-

spiratur, nō solū dilatationē proportionē non assequitur, verū etiam minus quāni  
 20 secūdum naturā inspirari solet, attrahitur. At sine distinctione, vnam dispositionem ostēdit magna thoracis dilatatio si raritā-  
 tē simul acceperit. Verū animaduertere

oportet ne aliquando in hac decipiamini, putantes eam spirationem, quæ ob virium  
 imbecillitatē omnibus agētibus musculis efficitur, eandem esse cum magna. Quam  
 equidē quo clarior esset interpretatio, sub-  
 limen vocare volui: hīc q; mihi facilē fuit  
 intelligere. Hippocratem eū sublimen vo-  
 care spiritum, qui altioribus thoracis parti-  
 bus inspiratur. Quemadmodū quum in-  
 quit: Magnus spiritus & ex lōgis interual-  
 lis deliriū declarat: cōstat eum magnū pro-  
 multo.

*Spiratio  
ob virium  
imbecilli-  
tatem.  
Sublimis  
spiratio.  
Libro 1.  
prog. 27.*



multo dixisse. Is verò bifariâ fieri potest, vel sine superiorû musculorû actione, vel ipsa quoque concurrente. Nam plerunque intercostales muscoli, vnâ cum septo trãverso, ad multam thoracis eleuationẽ quâ multus spiritus aliciat, superiorû musculorum auxilio non indigent. Quòd verò huiusmodi eleuationis species, deliriũ porrendat, in commentariis de Dyspnœa iam ostēdimus, vbi etiam cuiuslibet difficultatis anhelitus dispositio, declarata est. Nūc verò, vt compendio quodam, hīc explicamus eos affectus, quos in aliis antea commētariis iā percurrimus: ita & de dyspnoeæ differentiis, partim quidē dictum est, partim verò in sequētib; dicemus. Nam magnarum respirationum, alia quidē crebra est, atque huic sunt differentiæ complures, quarum alia alias dispositiones indicant. Alia verò rara, vnicam indicans dispositio<sup>10</sup> nem. Sic etiā de exigua dicēdum est: quòd rara quidem, spiritalium instrumentorum frigiditatem: frequens verò non solum spiritalium, sed eorum quoque quæ cum ipsis mouentur, vt hepatis, lienis, ventriculi, gulæ, laborem portendit. Quum igitur plures sint dispositiones, quas per vehemētes motus dolor comitatur: ex aliis notis, & considerandum & definiendum est, siue inflammatio

*Dyspnœa  
rum differe  
rentia.*

*Varia di  
spostiones  
dolorē ex  
citantes.*



matio quædam, siue erysipelas, siue vlcus,  
 siue abscessus dolorē efficiat. Quinetiam  
 didicistis quòd inæquales intemperantiæ,  
 dolores excitare sæpenuerò solent. Simi-  
 liter spiritus crudi flatuosiq; copia, qui ar-  
 ctatus aliquândo, partes ipsum ambiētes di-  
 stendit, aliquândo verò violēter egreditur.  
 Præterea calidi & acris, aut frigidi: & lenti  
 humoris abundantia: si aliquando retētus  
 succus, ambiētia corpora distēdat, aut inde  
 violenter exeat, dolores efficere potest. q  
 si grauius affecta fuerint instrumēta, in q-  
 bus huiusmodi res continentur, dolēt, vel  
 nō mota: si verò leuior fuerit affectus, quā  
 do mouētur. Verum in libris de Dyspnœa, *Libro 2.*  
 causam explicauimus, cur exiguæ spiratio  
 nis, frequens quidem spiritus, motorū per *Frequens*  
 respirationem instrumentorum, laborem & *rarus*  
 significat. Rarus verò, vehementem refri- *spiritus*  
 gerationem, & quidem spiritalium dunta *quid indi-*  
 cat, præcipuè pulmonis, & cordis. Est etiā *cent.*  
 alia dyspnœæ species, quum veluti breui  
 quadam quiete, intercipitur opus thoracis  
 idq; nōnunquàm aspirando nonnunquàm  
 verò respirando, siue hoc accadat ob mu-  
 sculorum thoracis conuulsionem, siue ob  
 caloris copiam, cogentis laborantem cōti-  
 nēter vel aspirare, vel respirare. Est insuper  
 alius respirationis affectus, quē apnœam  
 (quasi



*Apnœa,* (quasi non spirationem dixeris) nominât,  
*nulla aut* nulla, vt aspiciētibus videtur, facta respira  
*abolita spi* tione. Verūm vt rei ipsius natura declarat,  
*ratio. Lib.* eā nō fieri incredibile est. Nā impossibile  
*de vsu par* videtur vt animal omni spiratione exactē  
*uium.* priuatum, in vita seruari possit, quāuis ea  
 animalia quæ in cauernis latere consueue  
 runt, thoracem mouere videātur minimē.  
 Proinde duorum alterum conicere oport  
 tet, aut adeò exiguam fieri spirationem, vt  
 sensum effugiat, aut huiusmodi animalia  
*Transpira* tūc spiratione omninò non indigere, sed  
*tio per vni* eam transpirationem, quæ per vniuersum  
*uersum* corpus fit, sufficere: quippe hāc cor ipsum  
*corpus ab* per arterias efficit. Respirationē verò, per  
*arteriis.* thoracē cerebrum efficere constat. At verò  
*Respiratio* dispositio, quæ apnœā facere potest, omni  
*fit per tho* bus animalis partibus cōmunis esse vide  
*racem.* tur, veluti in apoplexia, sopore, morbo co  
*Apnœa o* mitiali, catalepsi. Nā in his omnibus, nul  
*mnib' par* lus proprius affectus spiritalia instrumen  
*tibus com* ta præ cæteris infestat, nō magis quàm vo  
*munis.* cis, aut locutionis, aut progressionis instru  
 mēta: sed affecto principio, omnia quibus  
 vires suæ per quas reguntur ab ipso suppe  
 ditari consueuerunt, ei consentire necesse  
 est. verūm de apnœa iam & particulatim,  
 & per se diximus: quamobrem tempus est,  
 vt nunc ad alia transeamus.

De



## De pulmonis affectibus.

## CAP. IX.

**I**gitur quū exercitationis via, qua ad affe- *Exercita*  
 ctorum locorū notitiam peruenitur, du- *tionis via*  
 plex fit, altera quidē ab apparentibus acci- *ad affecto*  
 dētibus, altera verò à corporis partibus. si *rū locorū*  
 quis per vtrasque voluerit exercitari, eadē *notitiam.*  
 bis dicet, quamuis alio & alio modo, vt de *Pulmonis*  
 pulmonis cōfestim affectibus dictum est: *affectus.*  
 10 præterea etiam vbi de dolorū ratione, de  
 sanguinis reiectione, ac de dyspnœa dixi-  
 mus, atque in præsentia quoque dicemus.  
 Etenim vehementi dolore nunquam cru-  
 ciatur, verū & grauitatis sensum, & ali-  
 quādo extensionē quādam, vel ad pectus,  
 vel ad spinā peruenientē percipere potest.  
 ibi enim membranæ ipsum ambientes su-  
 spenduntur. Sæpenumerò etiam angustia  
 molestantur laborātes, atq; ob hoc crebrò  
 20 celeriterq; spirāt, ac thoracem vehemēter  
 attollunt, sed non ita multum aërem attra-  
 hūt. Hæc si citra febrem acciderint, aut tu-  
 berculū, aut lentorum, crassorūve, aut  
 quorundam aliorum humorum plenitudi-  
 nem in eo existere, aut pus, aut aliū quen-  
 dam humorem, vel lentū, vel crassum, vel  
 multum in ipsum effusum fuisse declarāt. *Tuberculi*  
 Verū ea inter se per prætērita accidētia *pulmonis*  
 discernere licebit. Nanque si quis per bo- *signa.*

Q



*Bronchio-  
rum pul-  
monis af-  
fectorum  
nota.*

*Bronchia  
quid vo-  
cantur.*

*Multi pu-  
ris in pul-  
monibus  
collecti  
nota.*

nam valetudinem, quum solitas actiones  
facere potest, sic difficulter spirare incepe-  
rit, augeaturq; accidens, neque inter respi-  
randum stertere videatur, crudi tubercu-  
li ortum suspicari oportet. Si verò sterten-  
do strepitum fecerit, lentorum, crassorum-  
que humorū pertinaciter impactorū mul-  
titudinem, pulmonis bronchia molestare  
indiciū est. Quòd si illico ab angustia sen-  
su quis difficulter spirauerit, fluxionē vel  
à cerebro, vel à vicinis sedibus in pulmo-  
nem irruentem portendit. Sed quum fluen-  
tibus in pulmonem, vel viscosis, vel crassis,  
vel multis humoribus, hominē difficulter  
spirare dico, in bronchiis eos contineri, in-  
telligas velim. Vt enim in totum viscus le-  
uis arteria diuiditur, ita etiam bronchio-  
rum essentia in totum pulmonem, ab aspe-  
ra arteria procedit. Vocantur autem à dis-  
sectoribus brōchia, asperæ arteriæ cartila-  
gines, sigma literæ figuram referentes. At  
vbi pleuritis præcessit, mox remissa febris  
vehementia, intra latera grauitas in imo  
thoracis derelicta sentitur, ac vbi quis affa-  
tim à decubitu trāsmutatur, idq; maximè  
si ab vno latere in aliud se cōuertēs defluc-  
re aliquid sentiat, puris multitudinem ibi  
contineri, haud dubia cōiectura est. Quin-  
etiam in his fluctuatio sæpenumerò haud  
obs



obscure auditur. Accedit ad iam propo-  
 sitas notas hoc quoque indicium, si vehemen-  
 ti progressa pleuritide nihil penè laboras  
 expuerit. Si verò citra febrim, serofus aut  
 pituitosus humor in thoracis spaciū subito  
 defluens, spirandi difficultatem excitaue-  
 rit, laborans, tenue sputum, idque ab initio *Sputi in*  
 quidem exiguum, sed cum vehemēti tussi: *pleuritide*  
 vbi verò concoctum est, plus atque cras- *aut pulmo-*  
 sius, & cū miriore tussi expuere solet. Quip *num dolo-*  
 pe bifariam accidere potest, vt vehemēter *re confide-*  
 tussiendo pauca quis expuat: alij enim ob- *ratio.*  
 lentum crassumue humorem, alij ob tenuē  
 id facere videntur: siquidem tenuis hu-  
 mor quum subleuatus est, inter tussien-  
 dum à spiritu diuisus refluit. Lentus verò  
 aut omnino crassus difficulter effertur: vt-  
 pote qui non tam facile à corporibus qui-  
 bus impactus est abstergi, neque etiam à  
 20 quauis occurrentis spiritus violētia impel-  
 li potest: nisi enim spiritus qui tussiendo ef-  
 fertur, & multus & vehemens fuerit, nihil  
 secum educet. Igitur sputum quod neque  
 liquidum aut aquosum admodum fuerit,  
 neque crassum etiam aut lentum, id facile  
 efferri solet, maximè vbi validæ fuerint vi-  
 res. Etenim sine vehementi thoracis cōtra *Valida*  
 ctione vehementer tussire nemo potest. At *tussis.*  
 sine valida tussi, crassos lentosque humo-

Q 2.



res efferri impossibile est. Igitur quādo cū spirandi difficultate, cui & angustia & grauitas cōiuncta est, acuta quoque febris inciderit, is affectus inflāmatio pulmonis est.

*Pulmonis inflāmatio.*

*Erysipelas pulmonis.*

*Intemperies æqualis, & in æqualis pulmonis.*

*Sanguinis emissio per tussim.*

At si intolerabile fuerit incendiū, angustię verò, grauitatisque sensus minor, erysipelas ipsum vexare cēsendū est. Extremis autē ita definitis, qd sit erysipelas phlegmonodes, aut inflāmatio erysipelatodes, haud difficulter deprehendetur. Sunt alij pulmonis affectus, vbi citra humorū affluentiam intēperies ipsum infestat, siue æqualis ea fuerit, siue inæqualis. Igitur inæqualis tussim excitat, æqualis verò, si moderata est, rhythmō immutat: at si vehemēs, idq; vincēte calore, frigidi aëris, atq; potionis cupiditatē inducit, ac tractu tēporis finitur in febrim: per frigidam autem intēperiem contraria euenire solēt, quippe si modum seruauerit, calidi aëris, ac calidæ potionis desiderium excitat: si verò modum excedit, replet viscus ipsum fluxionibus. Cæterum de ea tussis specie, quā sanguis ex ipso reicitur, vel exeso, vel rupto vase aliquo, vel ore alicuius venæ patefacto, antea vbi de sanguinis sputo mentionē fecimus, iā dīper tussim etum est, atque nunc quoq; pauca quēdam dicemus. Porro ruptiones in ipso deprehēdes, tum ex multi sanguinis fluxione, tū ex magna



magna notabiliq; aliqua causa quæ præ-  
cessit, si subitò aduenerit. Voco autē præce *Præceden*  
dētes causas, vt quū aliquis ex alto, vel in *tes cause*  
ludo, vel certamine ceciderit, aut quum al *vasis ru-*  
ter super alterū cadit, aut vbi ex inanima- *ptionē in*  
tis corporibus aliquod graue, vt vel lapis, *thorace*  
vel lignū, thoracē læsit. Nonnullis ira cum *aut pulmo*  
exclamatione præcessit. Quinetiam citha *ne efficien*  
rædis tragædisq; certantibus, aut acutave *tes.*  
hementiq; voce clamātibus, vasa interdū  
dirumpuntur: maximè vbi non præmissa  
pulmonis per præcedentes exclamations  
lenitione, violenter clamare conantur. Vt  
enim luctatoribus, si certamen aggredian-  
tur, musculis prius neque calefactis, neq;  
per frictiones aut moderatas motiones ex-  
planatis, partes quædam rumpuntur, atq;  
cōuelluntur, ita etiā pulmoni accidere so-  
let. Hunc quia frictionibus ad vehemētes  
motiones præparare nō licet per exclama-  
tiones, quæ frictionibus proportionē respō-  
dēt, id efficere studemus. Insuper nulla ma-  
nifesta extrinsecus adueniente causa, vt in *Cause' ru*  
cæteris corporis particulis, ita in pulmone *ptionis va-*  
quoq; vas aliquod ob sanguinis abūdan- *sis in pul-*  
tiam dirumpi potest: quū videlicet exten- *mone.*  
sioni resistit, aut ob frigus à vicinis parti- *Lib. Epi.*  
bus contractū, aut ob innatā intēperiem. *6. par. 3.*  
Ita Hippocrates venas (inquit) frāgit aqua *Aph. 10.*



frigida. Atqui ipsa per se rupturas non facit, sed quia venarū tunicas frigiditate sua duras, & extendi contumaces reddens, ut rumpantur paratiores efficit. Rruptionis vero causa est, aut vehemens motus, aut humorum abundancia, qui vel per se, vel una cum crudo & frigido & flatuoso spiritu venas extendunt. Verum fractionis ab huiusmodi haud obscurum indicium præbet, subita cumulati ac vniuersum fluentis sanguinis vacuatio. Quum verò venarū ora aperiuntur, non frigida, sed è contrario, calida dispositiones præcedunt, veluti ubi multis eisdemq; calidis balneis homo utitur, atque terram inhabitat calidam, fueritque anni tempus eiusmodi, similiter alimenta quoque, & poriones. At quæ eroso vase aliquo affatim accidunt sanguinis evacuationes, eas præcedere solent exigua sputa, atque acres in pulmonem à capite fluxiones. Nonnunquam verò & pulmonis aliqua pars, aut ramentum simul efferri videtur, ut neminem latere possit, ad pulmonem hunc affectum pertinere. Orto verò in aspera arteria ulcere, præter hoc quòd sputum purulentum apparet, dolorē quoque in loco affecto laborans sentire consuevit: ipsum verò per ea quæ screantur, quia exigua sunt, ab ulcere quod in pulmone

*Venarum ora quando aperiuntur.*

*Erosio vas in pulmone.*

*Ulcus in aspera arteria.*



mone natū est, discerni potest, quippe ab  
 vlceribus pulmonis plurimū sputi reiici-  
 tur. Atque vt ex pulmone educta particu- *Vlcus in*  
 la visceris ipsius vlcerationem significat, *pulmone.*  
 ita ex gutture videmus interdum corpu- *Ligula*  
 sculum aliquod à ligula (Græci epiglottida vocant) per vlcerationem excreari. Id *vlcus.*  
 verò non solum hoc indicio deprehendi-  
 tur, verum etiam ex eo, quòd in vlcerato  
 10 loco doloris sensu laborans infestatur, ve-  
 luti de aspera arteria dictum iam est. Et-  
 enim pulmonis vlcera dolor non comi-  
 tatur: ea verò quæ in iis sedibus oriuntur,  
 dolorem quidem inducunt, sed non vehe-  
 mentem, vt si alicui suapte natura hebes  
 fuerit sensus, ipsum planè non percipiat.  
 Igitur persæpe vidimus eos quos iam su-  
 prà proposuimus affectus, & qui pulmoni  
 & spacio thoracis, & asperæ arteriæ, & gut-  
 20 turi accedere possunt: quippe omnium ho-  
 rum sermonis communitate inducti men-  
 tionem fecimus. Qui verò deinceps dicen-  
 tur, nō ita crebrò nobis apparuerūt. Qui-  
 dam humorem repente expuit, liquidæ  
 bili in colore perquam similem: medium *Signa pul*  
 videlicet inter flauum ac pallidum, ac nul- *monis à pu*  
 la acredine infectum: atque ita quotidie *trifacien-*  
 magnam eius quantitatem expuit, deinde *te humore*  
 leui suborta febricula tabescere incepit *affecti.*



adeò vt purulenta sciret. Postea tractu  
temporis, quatuor videlicet mensium, exi-  
guum cum pure cruorem reiecit, atque sic  
aucta febre magis consumebatur: ac iterum  
atque iterum plus expuebat, adeò vt ma-  
gnam sputi quantitatē redderet: quocirca  
magis increfcēte febre, ac resolutis virib<sup>9</sup>,  
eorum qui tabe marcescunt exēplo mor-  
tem obiit. Deinde alium vidi, eodem ferè  
modo sex mensibus: ac alium quoque diu- 10  
tius laborantem. Igitur qui primus nobis  
occurrit, initio quidē nihil mali habere,  
sed tandē pessimè affici visus est. Alterum  
verò quū conspiceremus, ei statim ab ini-  
tio cognito malo, præsenti medicamento  
succurrere tētauimus: ac multo magis etiā  
tertio. At quāuis multo negotio vtrunq;  
liberare conaremur, nihilominus neq; ho-  
rum vllus, neque alius post eos seruari po-  
tuit. quū enim morti iam proximi essent, 20  
*Pulmonis* pulmonis ipsius putres quasdā partes ex-  
*frusta per* puebāt. Proinde facilè cognoui, haud ab-  
*sputū eie-* simili eos affectu laborare, qualem in ex-  
*cta.* ternis partibus videre solemus, quū à pu-  
trefaciente quopiam humore inficiuntur.  
verum has & abscindere & vrere possu-  
mus: pulmoni verò horū auxiliorum neu-  
trū adhibere licet. Quapropter omnes pe-  
rire necesse est. At verò postremum quum  
vide



viderē, ad visceris fortē exiccationē soli-  
 cito me animo conuerti, & quidem odori-  
 bus atq; potionibus ad id efficacibus Pro-  
 inde medicamentū quod hedychroum vo-  
 cāt, interdiu narib<sup>9</sup> ipsius iugiter adhibe-  
 re iussi; ad somnum verò sese conuertenti  
 præscripsi, vt narium foramina ex aliquo  
 precioso rū vnguētōrū illinerentur, qualia  
 videlicet Romæ præparari solent, vocant  
 10 verò ea & foliata & spicata. Atque dedi in  
 potu medicamenta, mithridaticam voca-  
 tam compositionem, ambrosiam, athana-  
 siam, theriacam. Itaque perpetuo anno sic  
 educatus, tandē similiter vt reliqui tabidi,  
 vitam finiuit: quam fortasse ob iam dictā  
 educationem longiori tempore protraxe-  
 rat. Prætereā alium huiusmodi affectū in  
 pulmone notauī. Quidam diuturna tussi  
 vexatus, & exigūū lentumq; pus expuens,  
 20 frustum quoddam paruo grandinis grano  
 haud absimile excreauit, ac deferens illud  
 mihi ostendit, atque rursus non ita multo  
 post aliud quoque attulit: vnde conieci,  
 lentum illum humorē, quē antea expue-  
 re solebat, siccātū indurātumq; , ad huius-  
 modi substantiā peruenisse: quamobrem  
 medicamentū ei in potu dedi, quod asthma-  
 ticis auxiliatur, atq; ita factum est, vt mi-  
 norem expueret grandinē, atque longiori

*Medica-  
tio pulmo-  
nis à pu-  
tre faciente  
humore af-  
fecti.*

*Hedychro-  
um medi-  
camentū.*

*Foliata et  
Spicata  
vnguēta.*

*Grado ex  
pulmonē.*

Q 5



*Mirū est* quā anteā intervallo, neq; plurib<sup>9</sup> dein-  
*quod qui* ceps annis adeō mitigari potuit affectus,  
*dam sub* quin tandem moreretur. Caterū grādi-  
*mortē sup* nes ipsā magna ex parte crui magnitudi-  
*pirationē* nē æquabāt, quāvis interdū maiores, in-  
*ad instar* terdū minores esse viderentur. Atq; alios  
*qui mēbra* quoq; similiter quidem spuerē, sed nihilo-  
*na clausā* minūs in multos annos vitā extendere vi-  
*per asperā* dimus. Quorum alij aliam ob causam, alij  
*arteriā re* verò ob spiritalium instrumētorum affe-<sup>10</sup>  
*iecit.* ctum mortui sunt, quamvis nihil cruoris

*Antipa* excrearent. Ea verò quæ Antipatro medi-  
*tri medici* co acciderūt, nemo est qui nesciat, utpote  
*morbus,* qui medicam artem publicē apud Roma-  
*quo extin* nos professus est. Agebat hic etatem sexa-  
*ctus est.* ginta quidē annis minorem, sed quinquā-  
 ginta iam annos excesserat. Is corrept<sup>9</sup> ali-  
 quando febre quadam ephemera, idq; ab  
 euidēti causa, declināte iam febre, ut quid  
 sibi facto opus esset intelligeret, pulsū<sup>20</sup>  
 ipse suū tangere aggressus est. Quum igitur  
 omne inæqualitatis genus in arteriarū  
 motione inueniret, in primis quidē terri-  
 tus est: deinde verò quum sese non febrile  
 planē sentiret, illicō balneū subiit. quippe  
 laboribus ac vigiliis corpus fatigauerat.  
 Atq; tenui quoq; victu, donec diē tertium  
 præterisset, usus est. quo quū nulla appa-  
 reret febris, ad solita negotia pertractan-  
 da



da prodit: atque arteriam in extrema brachij fui parte tangēs, admiratus est perseverantē in pulsibus inæqualitatē. Occurrens itaq; mihi, extendit manū ridens, iussitq; pulsū tāgēre. At ego subridēs, quid in quā portēdit hoc quod proponis ænigma? Ille iterum ridens obnixē oravit, ut tangerem. Igitur inter tangendum omnigenam in pulsu inueni inæqualitatem, nō solum in multarum pulsationū cumulo, quam systematicen) id est, congregatricem) vocant, verū etiam in vna arteriæ distinctione. proinde miratus quomodo [adhuc] viueret, quum talem haberet pulsū, interrogauī, num difficilis esset ei respiratio. illo verò nullam se sentire respondente, obseruauī equidem an aliquando mutaretur, quippe sex mensiū spacio assidue arteriam tangebam. Quumq; ab initio interrogaret, quamnam corporis dispositio mihi videretur posse huiusmodi pulsū efficere, atque per quem modum, idq; citra febrim, ad eam quæstionē respondi, in cōmentariis de Pulsibus iam declarasse me huiusmodi inæqualitatem. Nanq; ob magnarum in pulmone arteriarum angustiam id euenire putauī: angustię verò causam esse dixi, visceris inflammationē. At tibi hanc ob causam id nunc accidisse impos

*Systematicæ, multarū pulsationum cumulus.*



*Causa  
morbi An  
tipatri.*

impossibile est, quippe febre fuisses affectus: Relinquitur igitur vel obstructione ex liquidis, & crassis, & viscosis humoribus, vel crudi cuiuspiam tuberculi ortu, in huiusmodi te dispositione induxisse. Tum ille respondens, oportuisset (inquit) me suspiriosa orthopnoea laborare. At ego probabilia (inquam) ipsum dicere, sed a veritate aberrare: quippe fieri nonnunquam huiusmodi orthopnoeam ob eam quam diximus causam: id vero quum in asperis non in leuibus arteriis crassus & lentus humor cumulat. Proinde omnem ei victus rationem, atque medicamenta quoque haud aliter quam asthmaticis adhibere iussimus, deinde sex (ut dixi) mensibus elapsis, leui quadam spirandi difficultate affectus est: accedente simul cordis palpitatione, in primis quidem semel, deinde bis, atque ter, postea quater, ac saepius quoque, aucta simul spirandi difficultate ad quindecimum usque diem post quem difficillima derepente oborta spiratione, resolutus statim obiit, aliorum quorundam exemplo, qui cordis affectibus laborant, de quibus posthac sermonem faciemus.

*Cordis pal  
pitatio  
pulmonis  
affectu se  
quitur.*

FINIS LIBRI QUARTI.

CL.



CL. GALENI DE  
AFFECTORVM LO-  
CORVM NOTITIA  
LIBER V.

*Reliquos thoracis morbos & diaphragmatis,  
10 deinde etiam gulae, & ventriculi, postremo ie-  
coris eadem methodo describit.*



**N** præcedenti libro, quæ de pul-  
monis affectibus, ageremus, ser-  
monis communitate, & thora-  
cis, & cordis quodammodò me-  
minimus: pleniorē verò, absolutioremq;  
de ipsis sermonem in quintum hunc librū  
distulimus. Quoniā verò quartus liber in  
accidentibus quæ Antipatro medico eue-  
20 nerunt, finem sortitus est, læso in primis  
ipsius pulmone, deinde ad cor etiā trāseū-  
te affectu, operæ precium me facturum ar-  
bitror, si omnes eius affectus percurram.

*De cordis affectibus. CAP. I.*

**I**gitur quemadmodum de cæteris corpo-  
ris partibus, ita de corde quoq; definiē-  
dum est: quānā ipsi propriè, vel primario  
affecto, vel utcunq; nominare volueris, su-  
perueniant accidentia: quānam verò ipso  
cate



*Cor fons  
caloris.  
Principes  
partes cor  
poris.*

cæteris partibus consentiēte. Id autem ex  
iis intelligi potest, quæ prius in aliis libris  
demonstrauimus, vbi iam declaratum est,  
innati caloris cor velut fontem esse, neq;  
animal mori omnino posse, ni cor afficia-  
tur. Quum itaq; tres sint principes partes,  
quibus gubernatur animal (quippe præter  
cordis principatū ostensum est sensum &  
motū, vniuersis corporis partibus à cere-  
bro suppeditari: iecur verò nutricis facul-  
tatis esse principium) semper mors ad im-  
modicas sequitur cordis intemperantias: si-  
mul enim cum ipso omnes vitiantur par-  
tes. quum enim (vt ostendimus) ipse pecu-  
liari cordis temperie actiones suas perficiāt:  
hac pereūte, actiones quoq; ipsarum peri-  
re necesse est: ac proinde cerebri quoque  
& iecoris. Horum verò temperie deperdi-  
ta non oportet cordis simul actionē peri-  
re. Si enim neq; sentiendi, neque mouen-  
di ab electione facultatē animal habue-  
rit, neq; nutriet, veluti in latētibus euenit  
animalibus, nihilominus viuere ipm pos-  
se, quoad cor manserit illæsum, haudqua-  
quam negandū est. Quin videmus sæpe-  
numerò multis deinceps dieb<sup>9</sup> alios neq;  
intelligerē, neq; sentire, neq; etiā moueri,  
at nihilominus viuere: quæadmodum vbi  
quis ob virium hepatis imbecillitatē sine  
alimen



alimento permanens, diutiùs etiã suffice-  
re potest. At verò si cor respiratione priue-  
tur, hominẽ illico perire necesse est. Igitur  
qui ad spirandi functionem nihil cõferre  
thoracem putant, ij causam reddere ne-  
queunt, cur per vehementem apoplexiam, *Apople-*  
superno duntaxat principio vitiato, labo- *xia velle-*  
rantes subitò moriantur. At vobis eam in- *mens.*  
uenire haud difficile est, utpote quib⁹ effi-  
caciter persuasum est, musculos q̃ motio-  
nis principium à nervis in ipsos à spinali  
medulla, quæ in ceruice est, delatis susci-  
piūt, thoracẽ attollere, priuatis tũc muscu-  
lis mouēdi facultate, q̃ ex cerebro ipsis in-  
fluere solebat. Etenim nisi ad spirandi fun-  
ctionẽ ambo principia simul iũcta cõcur-  
rere oporteret, potuisset aliquis viuere, pri-  
uatus interdũ superno principio. Igitur ex  
quibus causis inuenimus, cur affecto cere-  
bro in vehementi apoplexia, cor quoq; læ-  
datur, ex iisdem ipsis, sed secundum alium  
modũ, causam quis inueniet, quam obrem  
in apoplexia minore, catalepsi, sopore,  
morbo comitiali, lethargo animal ita affe-  
ctũ non pereat. Nam si diligēter confide-  
raueris, inuenies per huiusmodi affectus,  
quomodò spirēt laborātes: qppe videbis  
& violentā & difficilē spirationem, perin-  
de ac si vinculo quodā constrictus thorax  
attolli



*Thoracis  
musculo-  
rum actio  
per somnū  
seruatur.*

attolli prohiberetur. Atq; huius rei suffi-  
cientē fecimus mentionē in libris de Mu-  
sculorū motione. Nāq; similis est hęc que-  
stio, ei qua de somno qdā hæsitant: quip-  
pe quum per somnum omnes musculorū  
actiones exoluant, sola actio quæ ad tho-  
racis musculos pertinet, seruat. Nunc verò  
ea dūtaxat dixisse satis fuerit, quæ in præ-  
sentia proposito nostro cōducere videbā-  
tur. Porro qua ratione homines p somnū  
spirāt, reliquis musculis omnibus quiescē-  
tibus, eadem quoq; ratione per minorem  
apoplexiā, atque alios ei vicinos affectus  
spirare possunt. Vbi verò vel apoplexia, vel  
alius quispiā affectus adeò vehemēter in-  
creuerit, vt musculorū thoracis actio om-  
nino deperdatur, perire simul respirationē  
necesse est. Vnde cordis quoque tempera-  
mentum soluitur: quo fit tandem, vt etiam  
animalis ipsius necessariò sequatur interi-  
tus. Atque hac ratione per vehementes su-  
perni principij læsiōes animalia perire vi-  
demus. Iam ex iocineris quoq; affectu mo-  
ri accidit, sed alia rōne, inedia scilicet: vñ  
lōgiore tēporis spatio in huiusmodi affe-  
ctibus vitam protelare possunt. Atq; mori  
contingit nōnullos per alium quoque mo-  
dū, vt in syncopa, stomachi vitio eueniē-  
te, & vehemēti dolore, & timore graui, &  
volu

*Syncopa  
stomachi  
vitio.*



voluptate maxima. Etenim quibus vitale robur infirmū est, animi verò affectiones ob imperitiā fortes, iis animę essentia facilè dissolui potest. Atq; horū aliqui ob mœstitiā interierūt, sed nō illicò, vt de superiorib⁹ diximus. At vir magnanimus neque ob mœstitiā, neque ob aliā aliquam animi ægritudinem mœstitiā fortiorē vnquā succubuit: vtpote cuius animi  
 10 mē robur validū est, affectus verò nō adeo vehementes. Cæterū proprio quoq; affectu cor laborare solet, vel ob simplicē intēperiē, siue inæqualis, siue æqualis ea fuerit: vel inflammationē, vel erysipelas, idq; dum fieri incipit. Illicò enim antea quàm augebātur huiusmodi affectus, animal corrumpitur. Atque hos affectus rursus cardiaca syncopa sequit̃: quēadmodū quæ stomachi vitio fiunt syncopæ, ad eos  
 20 affectus, quibus os ventriculi (stomachū nonnulli appellāt) infestatur, sequi solent. verū hæ consentiente corde eueniunt. Porro vtriusq; partis, tum oris vētriculi, tū cordis dispositiones, aut à forti duntaxat intēperie, aut venenoso humore, nonnunquā ab erysipelate, aut inflāmatione, aut alio quopiam præter naturā tumore fieri solent. Igitur exiguæ quidē cordis intemperantię, pulsus arteriarum, pro sua

*Animæ essentia dissolutio.*

*Proprii cordis affectus.*

*Syncopis cardiaca.*

R



quæque natura variât : de quibus in libro de Pulsibus, iam dictum est. Maiores verò per proprias quidem similariū partiū intemperies subitam mortem non inducunt: per eas verò quæ ad instrumentales partes pertinent, subito enecare possunt: sed præcedentibus prius signis quibusdā, quorum vnum ab Hippocrate dictum est:

*Hippo.li.* Qui sæpe & multum exoluuntur sine cau  
*2.aph. 41* sa manifesta, ij repente moriuntur. Est & 10  
*Palpita-* alius affectus, palpitatio videlicet cordis,  
*tio cordis.* aut per se eueniēs, aut cum significatione  
*Humor* quadam, q̄ in humore cor ipsum mouea-  
*in ambiē-* tur. Neq; enim mirū videri debet, tantam  
*te cor tuni* humoris multitudinē cumulari aliquādo  
*ca cōtētus* in ambiēte cor tunica, vt ipsum, ne attolla-  
 tur, impedire possit. Quippe in animalib⁹  
 dissectis vidimus plerumque plurimū hu-  
 moris vrinæ speciē referentis, in eo, qui  
 ipsum inuoluit, panniculo contineri. Et 20  
 enim simia quædā quum emaciari indies  
 videretur, eam tamen necessariis nostris  
 negotiis impediti secare in tempore non  
 potuimus, post mortem verò, reliquis  
 corporis partibus omnibus illæsis, inuen-  
 tus est in ambiente cor tunica, tumor præ-  
 ter naturam, humorem in se continens,  
 qualem pustulæ (Græci hydatidas vocāt)  
 emittere solent. Atque in gallo quoque  
 vidi



vidimus aliquando cordis tunicā huius-  
 modi scirrroso tumore affectam, perinde  
 ac si plures crassæ mēbranæ inuolutæ al-  
 tera alteri fuissent: verum in eo nihil hu-  
 moris cōtinebatur. vnde verisimilis cōie-  
 ctura elicitur, homines etiā similib⁹ pos-  
 se affectibus infestari. Inflammato autem *Cordis in-*  
 manifestè corde gladiatores vidim⁹, haud *flāmatio.*  
 aliter quā qui cardiaca syncopa, pereūt,  
 10 obiisse. Igitur si ad ventrem cordis vul- *Vulnus*  
 nus aliquando penetrauerit, protinus ma *cordis.*  
 gno cum sanguinis fluore hominē mori  
 necesse est: idque præcipuè, si sinistrae par-  
 tis venter fuerit vulneratus. Si verò nō ad  
 ventrē vsque pertingat, sed in cordis sub-  
 stantia consistat vulnus, ex ita affectis ali-  
 qui non solū ea die qua vulnerati fuerūt,  
 sed sequenti quoque nocte viuere potue-  
 runt: qui obortā deinde inflāmatione ex-  
 20 tincti sunt. Atque etiam ij quādiu vixe-  
 runt, mentis cōpotes inuēti sunt. vnde cui  
 dens sibi testimoniū sumere potest ea se-  
 cta, quæ negat rationalem animæ vim in  
 corde consistere. Palpitatio autē visceris  
 huius pluribus integra valetudine degen *Sanguinis*  
 tribus, tū ad adoleſcētibus, tū adultis subi- *detractio*  
 tō sine alio manifesto accidente euenire *in palpitatio-*  
 visa est. Atq; oēs eos sanguinis detractio *ne cor-*  
 iuuat. Atq; hoc accidēte planè liberati sūt, *dis utilis.*



qui post sanguinis missionē vñ sunt victu  
 & medicamentis, quibus esset extenuādi  
 facultas. Horum verò nonnulli, quos rur-  
 sus huiusmodi accidens infestabat, simili  
 curatione sospites euaserūt. Cæterum no-  
 ui quendā quotannis verno tēpore huius-  
 modi palpitationis accidente vexatū, qui  
 quū per tres annos à sanguinis detractio-  
 ne se adiutū intelligeret, anno quarto, an-  
 te à quàm accidēs ipsum inuaderet, sangui-  
 nem misit, idq; plurib<sup>9</sup> deinceps annis fa-  
 ciendo, idonea etiā post sanguinis detra-  
 ctionem medicamēta adhibuit. At nihilo  
 minus hic quoq; ante senectutem morte  
 preuētus est, sicut & reliqui omnes, quorū  
 alij quidē per acutas febres, alij verò cū  
 sani degerent, affatim syncopa intercepti  
 interierunt. Quamuis vnus vel duo citra  
 syncopā alia quadā† mortis specie perie-  
 rint. At verò sic affectorū magna pars æta-  
 tē agebat quinquaginta quidē annis infe-  
 riorē, sed quæ quadraginta annos excede-  
 ret. Porro panniculus cor ambiēs quomo-  
 docunq; affectus sit, nisi inflāmatione in-  
 festetur, inter ignobiles partes reputatur.  
 Quocirca ipsius dispositio per cōsensum  
 ad cor trāscūrit. Cū enim ipse solus affi-  
 citur, exemplo reliquarum omnium par-  
 tium, quæ ad custodiam & tegumentum  
 cæte

† Apople-  
 xia modo  
 inquit  
 Aegineta  
 in libr. 3.  
 hunc locū  
 trāsferēs.  
 Cordis pā  
 niculi affe-  
 ctus.

10

20



cæterarū nobiliorum factæ sunt, nullum  
affert periculum. Cæterum nulla à corde *Quæ diffi-*  
spirandi difficultas oritur, præter eas quas *cultas spi-*  
in priori libro diximus, cum de dyspnœa *randi oria-*  
sermonē haberemus. Etenim supercalfatur ab af-  
ctum spirationem efficit magnam & den- *fecto cor-*  
sam, atque celerem, ac calidum insuper *de.*  
spiritum refiat. Contrà refrigeratum, exi-  
guam reddit spirationem & raram.

IO. *De thoracis affectibus.*

CAP. II.

**A**tque huic quoque parti, vel prima-  
riò affectæ, vel alius consentienti,  
quemadmodū reliquis omnibus, affectus  
quidam superueniunt, quos respirationē  
lædere necesse est. quippe propriū respira-  
tionis organū eam esse, iam demonstratū  
est. Igitur ubi dolorificis affectibus mole-  
statur, exiguā densamque reddit spiratio-  
nē, veluti in cōmentationibus de difficul- *Et 1. pgn.*  
tate spirationis ostēdimus. Id verò & vici-  
nis quoq; partib⁹, & iis quæ simul mouen-  
tur affectis, euenire solet. Nam diximus  
anteà de spinæ affectibus, respirationem  
interdū lædi, thorace proprio affectu ne-  
quaquā laborāte, sed vel neruo quopiam  
à spina procedente, vel spina ipsa affecta.  
Eorū verò, qui propriè ad thoracem perti-  
nent, affectuum, quidā in ipsius musculis

R 3



quidam verò in membrana costas cingente cōsistunt. Nam de his affectibus qui vel in cute, vel in costarū ossibus consistunt, hic agere non proposuimus: in quibus locus affectus sensibus subiiciatur. Igitur quū ex musculis alij spatia intercostalia vocata repleant, alij verò extrinsecus extēdantur, dolorifice externorū musculorū dispositiones, ut ulcera, contusiones, abscessus, erysipelas, inflammatio, haud difficulter à medicis manuum adhibentibus discernuntur. At intercostalium musculorum inflammationes, eorum maximè, qui in prima parte cōsistunt (duo enim, ut scitis, sunt huiusmodi musculorū genera) tactu cōsequi non possumus: atque ij grauiori, quàm externi, dolore cruciantur: ac fluxionem, quæ inflammationē induxit, ad interna, per eā quæ costas cingit, membranam transmittunt, quam tunc pariter cum ipsis inflāmari necesse est. Veluti rursum ubi ipsa aliquādo primario affectu infestatur, intercostalium musculorum partes internæ, similiter ei cōsentiūt. Verūm exquisita pleuritis fit, ubi cingens costas mēbrana primario affectu laborat: proinde dolor, vel ad iugulum, vel ad præcordia peruenire potest: ad iugulum quidē, superioribus eius partibus affectis ad

*Inflamationes intercostalium.*

*Tip βάρει  
intimos intelligit.*

*Pleuritis exquisita.*

præcor



præcordia verò, vbi inferiores afficiuntur.

Atq; vehemens quoque febris huiusmo- *Cur febris*  
 di inflammationē perpetuò sequitur, q̃a *vehemens*  
 sedes affecta, & parum distat à corde, & *pleuritidē*  
 cum panniculo ipsum inuoluente, ac septo *sequatur.*  
 transuerso cognationem habet. Cæterum  
 afficiaturne magis cingēs membrana, an  
 muscoli ipsam contingētes, à pulsibus in-  
 diciū petere oportet. Nanque muscoli  
 10 minùs, cingens verò membrana magis &  
 tendit, & indurat arteriā. Vt in peripneu- *Peripneu-*  
 monia nulla penitus apparet huiusmodi *monia.*  
 durities. At effusa in spatium thoracis fa-  
 nies in asperas pulmonis arterias trāssu-  
 mitur, deinde tussiendo excreatur, qualis  
 sit, qui inflammationē fecit, humor, decla-  
 rās, an videlicet biliosus, aut melancholi-  
 cus, aut pituitosus, aut cruētus. Etenim si *Thoracis*  
 bilis abundat, pallidū, aut flauū: Si atra bi- *excreme-*  
 20 lis, nigrū: Si pituita, spumofum & candi- *ta spuēdo*  
 cans: Si sanguis, rubrū sputū reiecit. Quòd *reiecta hu*  
 verò tussiendo ex thoracis spatio aliquid *morem co*  
 interdū expuatur, facilè intelliget is, qui *lore qua-*  
 eas dispositiones cōsiderauerit, quib⁹ ab *lis sit indi*  
 exteriorib⁹ ab intima pectoris vlcus pe- *cant.*  
 netrare cōtingit, siue id ob vulnus nō con-  
 glutinatū eueniat, siue ob magnum ab-  
 cessum vtrinque ereptum, vel perinde di-  
 sectū ac si externas dūtaxat partes affice-



*Sphacelos  
in costâ.*

*Transsum  
ptio ex tho  
race in a-  
speram ar  
teriam.*

ret, facta deinde sectione, inueniatur cingens costas mēbrana erosa, aut costa ob sphacelū (id est, cariē) excisa, aut eò q̄ medici cingentem membranā, vtpote erosam, putrescentēq; seruare illāsam nō potuerunt. In omnibus iam propositis dispositionibus, si aqua mulsa in thoracis spatium infundatur, mox tussiendo expuitur, laborās ipse aquā mulsam esse, ex sapore deprehendit. Quo pacto autem hoc fieri 10 possit, atque per quos meatus ipsa in asperam arteriā ingrediatur, perpendere debet iis, qui errorem illum in quē multi in causæ inuestigatione inciderūt, effugere voluerit: ij nanque ex thoracis spatio in pulmonē quippiā recipi, impossibile esse iam sibi psuaserunt, fortasse ita se sentire simulātes, ne videantur de re quapiā dubitare. Ceterū credere oportet. huiusmodi fieri transsumptionē: quippe per vulnera 20 haud obscurē apparet. Deinde quo pacto ea fieri possit, inuestigare: vt quum inuenimus, animo simus quietiori. Sed inter quærendū, quādiu nihil nos inuenisse putauerimus, ruditatē potius nostrā accusare, quā veritatē ipsam negare debemus. Atque videmus etiā conglutinatiis cruentis vulnerib⁹, in sputo, notas quasdā fluentis ex vulnere cruoris, ad spatiū qđ inter pulmo



pulmonē est & thoracem. Præterea suppu-  
rati, in hoc ipso spatio pus continere, &  
ipsum expuere haud obscure vident. Atq;  
rationi consentaneū est, vt eodē modo tū  
cruor, tū pus ex thorace expuatur: Quo-  
rum viā inquirēs Erasistratus incredibi-  
lia quædā scripsit in eo libro, cui titulus  
de Sanguinis eductione est, sub hac ver-  
borū serie: Via autē per quā incedunt, ea  
10 quæ ab iis sedibus reiiciūtur, huiusmodi  
est: Ab ea arteria quæ spinæ adiacet, vasa  
quædā ad vtrunque latus, tam dextrum,  
quàm sinistrum, similiter procedūt, dein-  
de in loca vicina, multiplici diuisione di-  
persa, tandē adeò euadūt exigua, vt sen-  
sum lateāt. Quum itaq; sanguis in huius-  
modi arterias inciderit, nōnunquam per  
concauā arteriam, ad loca quæ circa pul-  
monē sunt, atq; ad eos nexus p quos pul-  
20 mo apud spinā arteriæ cōiungitur, ascen-  
dit, quippe ea quæ huc inciderint, hac via  
pulmonē ascēdere solet. Verūm quomo-  
do ex pulmone deinde reiiciantur antea  
dictū est. In his verbis manifestē declara-  
uit Erasistratus, eas arterias quæ à magna  
arteria ad singula intercostalia loca pro-  
cedunt, per ora quæ ad inflamatā partē  
perueniunt, sanguinē suscipere, ipsumque  
ad magnam arteriā, quæ à corde orta per

*Erasistra-  
tus.*



spinam extenditur, referre, atque ab ipsa  
rursus, ad ea loca quæ circa pulmonem  
sunt transitum fieri. Sed neque modum,  
quo huiusmodi transitus fiat, neque viam  
explicauit. Verùm deinceps scripsit, Atq;  
per eos nexus, per quos pulmo arteriæ cir-  
ca spinam adhæret: fit enim (inquit) hac  
quoque via, eorū quæ inciderunt in pul-  
monem, ascensus. At quomodo, & per quæ  
conceptacula id fieri possit, non ostendit. 10  
Proinde manet adhuc eadē quæstio, nihil  
planè ad ipsam dissoluendā afferente Era-  
sistrato. quamuis vt in cæteris libris om-  
nibus, ita in hoc ipso, de sanguinis edu-  
ctione, perspicuā pollicitus fuerit inter-  
pretationē. Quocirca multò magis vitio-  
sum quispiā huiusmodi sermonē reputa-  
uerit, vtpotè qui ipsi quoq; Erasistrato fue-  
rit suspectus. apparet itaq; ex industria eū  
voluisse obscuris vti sermonib⁹, vt aliqd 20  
dixisse videretur, quum nihil diceret. Atq;  
hoc in loco, quæstionis enarrationē dere-  
liquit. Nā quomodo sanguis ex lateribus  
quidē ad magnam arteriā perueniat, ma-  
nifestè declarat. At quomodo rursus ab  
hac, ad eas sedes, quæ circa pulmonē sunt,  
vt ipse dicebat, ascēdat, haudquaquā ex-  
posuit. Cōstat etiam ex eo quòd dixit, Lo-  
ca quæ circa pulmonem sunt, quū dicere  
pulmo



pulmonem potuisset, eum haud inuitum  
 sermonis obscuritatem affectasse, id quod  
 „ postea declarauit, dicens: Ex pulmone au-  
 „ tem quomodo ad educationē ascēdat, iam  
 „ antea dictum est. Perinde enim, ac si in pul-  
 monem, ex magna arteria sanguis iam de-  
 latus sit, quomodo inde reiiciatur, velle  
 nos admonere, videtur. Quod verò de ex-  
 puitiōe quæ ex pulmone fit, iā antea dictū  
 10 sit, nō ignoramus, ac perspicuam fuisse nar-  
 rationem testificamur. Verū optarem  
 ut de ea, quæ ex magna arteria in pulmo-  
 nem fit, transumptione dixisset. Quemad-  
 modum cum inquit, per eos quoq; nexus,  
 per quos pulmo arteriæ apud spinam con-  
 iūgitur, fieri circa pulmonem sanguinis re-  
 iectionē. Ne hic quidē, quos nexus dicat,  
 declarauit. Etenim si vel ex membranis,  
 vel fibris consistat, ad sanguinis in magna  
 20 arteria contenti, in pulmones delationem  
 nihil conferunt. quippe necesse est ex arte-  
 ria oriri vasa quædam, per quæ sanguis in  
 pulmonem transferatur, quemadmodum  
 Erasistrati secta hoc ipsum per arteriā pul-  
 moni substratū fieri autumat. Huius enim  
 arteriæ, extremæ partes, & quidem exi-  
 guæ, ad asperam arteriam trāsire vidētur.  
 Atqui ipsa quoq; ex magna arteria, antea  
 quam ad spinam perueniat, initium sumit.

*Vasa ex  
 magna ar-  
 teria, per  
 quæ san-  
 guis in pul-  
 monē trās-  
 fertur.*

Ita



Itaq; duplici quadam ratione, Erasistrato ab hac arteria auxiliū suppeditare conantur, sectæ ipsius professores. In præsentia quod ad sanguinis ex thorace educationē, alibi verò ad inflammationis in pulmone generationem. Nā & hāc obiiciūt eis, qui aliter sentiunt, utpote quā ita, ut Erasistratus docuit, fieri sit impossibile. Nanq; ubi docet quomodo fiat inflammatio, putat incidentem in arterias sanguinē, spiritui, qui à re corde defertur, obuium fieri, atq; sic ad extremas arteriarum partes repelli. Nisi ubi vulneratæ aliquādo quædā arteriæ, vacuato ex ipsis per vulnus spiritu, ex ea quæ ad vacuatū spiritū sit sequela, sanguinem suscipiunt. Hac itaque ratione nō posse fieri inflammationem in pulmonis arteriis dicunt: quippe si aliquando sanguis in eas inciderit, nulli ipsum spiritui obuiare, q̄ in solas pulmonis arterias, nullū à corde ferri spiritum, Erasistratus contendat, quāuis reliquas arterias omnes à corde spiritū suscipere fateatur. Verū ē contrario, ipsas cordi spiritum suppeditare, quem per inspirationē ab asperis leues arteriæ suscipiāt. Hāc igitur arteriam, quæ à maiori arteria spinę incumbenti, in pulmonem fertur, inflammationem in extremis partibus sustinere, atq; ut sanguis ex thorace reiciatur, effi



efficere dicunt Erasistrati sectatores. Sed in-  
 flammationis rationem hoc in loco tracta-  
 re non proposuimus. Cæterum quod ex ma-  
 gna arteria, in pulmonem sanguinis trans-  
 sumptionem fieri Erasistrati sectatores di-  
 cunt, à veritate deuiare videtur. In primis  
 enim sanguinē ex intercostalibus locis, in  
 magnam arteriā transferri impossibile est,  
 quippe à spiritu, qui à corde per magnā ar-  
 10 teriam ad hæc loca transmittitur, repulsus,  
 illicò reuertetur. Si concesserimus autem *Aduersus*  
 hoc ita fieri, ac demus in magnā ipsum ar- *Erasistra-*  
 teriam deferri, multò absurdior ex Eras- *tios, de*  
 straticæ sectæ fundamentis sermo euadet. *transsum-*  
 Etenim spiritum, saluātem incursionis im- *ptione san-*  
 petum, à corde in hanc arteriam expressum *guinis ex*  
 in totū deferri corpus, per ortas ab ipso ar- *magna ar-*  
 terias autumat, perinde ac si ex vna arte- *teria in*  
 rię constrictione spiritus ad extremas pe- *pulmonē.*  
 20 dū partes peruenire possit, veluti à vehemē-  
 tissimo vento, delatiōis celeritatē fieri pu-  
 tans. Quod verò tanta vehemētia, sangui-  
 nem in magna arteria cōtentum, ad quam  
 libet corporis partem non impellat, impos-  
 sibile est. Neque vlla ratione dici potest,  
 ipsum in vnam arteriam quæ in pulmonē  
 feratur cōpelli: ita enim is impetus mentis  
 sit particeps, atq; intelligat, qua via quā  
 facillimē vacuari possit. Id ipsum verò rur-  
 sus,



sus purgnare videtur cū præsenti sermone qui sanguinē quā celerrimē vacuari per asperam arteriam concedit. Nam si tā facilis est per extremas harum arteriarū partes transitus, vt incidens in eas sanguis, tā celeriter vacuetur, fieri nō potest vt impactus, inflammationem excitet: eo quōd impingi, & excidere, inter se sint contraria. Id verō multo maiori admiratione dignum

*De puris vacuatione in pleuriticis & suppuratis, aduersus Erasistratum.*

est, quōd quum Erasistratus quā diligenter 10  
tissimē deinceps de puris vacuatione conscribat, sine id in pleuriticis, siue in suppuratis cōtineatur, ipse pugnā hanc, qua videlicet sermones eius, tum nobis, tū reliquis hominibus omnibus inter se certare videtur, non intellexerit, ea facile deprehendetur, si sermonē eius, qui ad verbū sic se habet, hīc subscripserimus: Atque in his ipsis affectibus, plurimi interdū puris excretio 20  
fit: causa, venarum natura est, quā sic perpendere oportet: Magna quædam vena ex corde nascitur, adiacens spinæ, ac in eo loco, vbi à vertebra septum transversum nascitur, finē accipit. Ab hoc verō, venæ quæ ad latera extensæ sunt, atque arteriis adiacent, oriri videntur. Igitur quum vel vlcus, vel abscessus, in his locis euenit, multū puris congregans, id quidem haud facile, ad spatium quod inter latera & pulmonē est, effun-



„ effundi potest, quòd succingēs latera mem *Membra*  
 „ brana, neruosa est, & fortis, ac diuidi cōtu- *na costas*  
 „ max: proinde coërcetur ad vasa, mēbranæ *succingēs.*  
 „ intrinsecus subiecta. Quum itaque tenuis  
 „ magis, ac imbecillior vena sit quàm arte-  
 „ ria, hæc vasa prius diuiduntur quàm ipsæ  
 „ arteriæ atq; per has diuisiones, pus effundi  
 „ tur in venas: per inferiores verò sedes, pus  
 „ deiici non potest, quia ad eas venarū natu-  
 „ ra non peruenit, sed finē sortiūtur, vt dictū  
 „ est, circa septi transuersi ortū. Quū semper  
 „ autem continuæ sedes repleantur, vt per  
 „ superiores meatus exitū capiat necesse est.  
 „ Perpendēda igitur est actio, quam pulmo.  
 „ inter respirandum efficit, ac quomodo, tū.  
 „ spiritum tum humores, & attrahit, & expel-  
 „ lit, quippe eodem modo pus à lateribus ad  
 „ pulmonem ascendere solet. Sed quomodo  
 „ demum à pulmone reiciatur antea dictū  
 „ est. In hoc sermone quòd pus in venas trās-  
 „ sumptum, non possit ad loca septo trans-  
 „ uerso inferiora peruenire, rectè ab Eras-  
 „ strato dictum est, vtpotè venā, quæ octo *Vena ad*  
 „ inferioribus thoracis costis alimentum *costas de-*  
 „ præbet (non enim omnes alere potest) ad *lata.*  
 „ septum transuersum perueniēte: neq; enim  
 „ in præsentia contendere velim, an exigua  
 „ aliqua eius particula inde exiliat. At quo-  
 „ modo huiusmodi pus expuatur, neutiquā  
 „ dicere



dicere aggressus est: similiter nec sectatorū  
 eius quisquā. Neq; enim quemdmodū  
 arteria quandam à magna deductā in pul-  
 monē ferri affirmant, ita de vena dixerint,  
 etenim arteria, tametsi nō manifestē in vi-  
 scus ipsum ramis distribuitur, ei tamē sub-  
 sterni, atque ad asperam vsque arteriā ra-  
 musculos emittere videtur. Verū à magna  
 vena, quæ spinæ incūbit, venam aliquam  
 in pulmonē transire, neq; nos vnquam vi-  
 dimus, neque dissectorum quisquā scripsit:  
 ac ne Erasistratus quidē id affirmare ausus  
 est. Quippe inter omnes conuenit, quod à  
 dextro cordis ventriculo, per vnum dunta-  
 xat vas, pulmo sanguinē recipit. Oportet  
 igitur pus quod à costis, in eam venā, quæ  
 spinæ adiacet, in primis quidem peruenire  
 ad cor, deinde ad venam quæ ab hoc orta,  
 in pulmonem transit: postea ex hac in aspe-  
 ras arterias, quæ per ipsum dispersæ sunt, 20  
 trāssumi: postremò rursū indigere, quæ sci-  
 licet ipsum vsq; ad os efferre posset. Quo  
 autem pacto puris sanguini permixti, ab  
 ipso fiat secretio, tāquā exiguū quippiā,  
 ac vulgare, & quod ad vniuersam ipsius ra-  
 tionem firmandam parum conducatur, præ-  
 teriēs dicere neglexit. Neq; defendi etiam  
 potest, q̄ sanguis in venā, quæ circa spinam  
 est, cōtentus ad cor ipsum referatur. Nam  
 è con



è contrario, vena hæc à dextra cordis auri *Vena à*  
cula exorta, sanguinem secum defert, qui *dextra*  
omnibus thoracis partibus, quæ circa octo *cordis au*  
costas cōsistunt, alimentū præbeat. Etenim *ricula ad*  
superiores quatuor, nō ab iis, sed à vena ad *costas nu-*  
iugulum ascendente, quæ à medio loco in *triendas.*  
ter cor & iugulum exoritur nutrimentum  
suscipiunt. Præterea & hoc quoque nō mi-  
nus absurdū, ad Erasistrati verba sequitur.  
10 Nā pus quod à supernis quatuor thoracis  
costis, in concavam venam refertur, maxi-  
mè quidem ad eas venas ducetur, quæ ad  
cervicē, & scapulas, & caput, & manus, imò  
potius ad vniuersas animalis partes, perue-  
niunt. Hæc sunt ferè absurda quæ ad Eras-  
istrati scripta sequi videtur. Accedit ad hæc,  
quod causam in hac perpensione penitus  
non attigit: dicens enim, nō facilè pus ef-  
funditur in spaciū, quod inter costas est &  
10 pulmonem, quia succingēs costas mēbra-  
na, nervosa sit, & fortis, atque diuidi cōtu-  
max, pus aliquādo in hoc spaciū effundi  
posse, non negavit: quippe qui verbis suis,  
nō facilè addiderit. Debuit ergo dicere, id  
quanquā non facilè, tamen aliquādo fie-  
ri, deinde viam ostendere, qua suppurati,  
pus expuere possint. Vt enim ex iis nō pau-  
cos perire, ita & alios cōplures seruari vi-  
dimus. Quorum si quis per singulos dies,



reiectionis puris quantitatem collegerit, interdū sex, aut octo heminas, interdū decē, atq; interdum plures, totam summam æquare inueniet. Caterū id quod quā creberrimē dicere consueui, nunc quoq; dicā, quod multi Medici, rerū quæ manifestē vidētur causam reddere nequeūtes, eas esse omnino negāt. Quanquā (vt dixi) omnes quot *Vulnera-* quot in thorace vulnerati sunt, iniectionē per *si in tho-* vulnus aquā mulsam, illicō expuere solēt. *race.* Nonnulli etiā medēdi modo, & qui cruentis adhibetur, & glutinatorio dicto haud paucis perforationibus curati, in primis quidem diebus purulēta quædam expuūt, nisi rectē, ac exquisitē, vniuersus sanguis per vulnus (quatiendo videlicet hominem, qui sic vulneratus est) fuerit effusus. At verō *Membra* mēbrana costas succingēs, & valida est, & *na costas* neruosa, ac diuidi cōtumax. Sin autem vo *succingēs.* les, adde sermoni etiam membranā pulmo- *20* nem ambiētem, eādē cum illa naturam habentem: eoq; liquores in vacua thoracis infusos hæc quidem nō trāsmittit, illa non transsumit. Itaq; ad eundem modum dices cutem mēbranis esse multo fortiorē, atq; crassiorē in fracturis ossium callo obducendis sanguineum humorem, quo minùs per ipsum penetrando egrediatur, prohibere possit; hunc tamen in nonnullis vide- *mus*



mus adeò copiosè effundi, vt tota etiam li-  
gamēta possit irrigare. Quod quum ita fie-  
ri videamus, idē haud absurdè per tenues  
quoque membranas fieri fatendū est. Atq;  
satius fuisset Erasistratum nō de hac re du-  
bitare, sed id potius abūdanter intelligere,  
quomodo humor inter thoracē & pulmo-  
nē contentus, in asperas pulmonis arterias  
recipiatur, ad leues verò arterias, atque ad  
10 venas, peruenire non possit. Nam & ipso  
Erasistrato authore, tria hęc vasa simul ex- *Vasa ad*  
tenduntur, atque simul diuisa, terminātur *pulmonē*  
suo extremo quodlibet ore, in adiacētem *pertinētia*  
pulmoni membranam. Cū ergo tria hęc  
ora inter se proxima sint, cur in vnum dū-  
taxat fiat trāssumptio, quærere debuit Era-  
sistratus. Nam longè præstantius erat, ea  
quæ fiunt, quomodo fiant quærere, quàm  
quòd fiant negare. Quanquam neq; dubia  
20 neque inuētū difficilis mihi videtur, eorū  
quæ in thorace continentur, in pulmonem  
receptio, quæ quidē in asperæ arteriæ par-  
tibus extremis fieri potest, quippe quæ nō  
adeò angustæ sunt, vt leuiū arteriarum at-  
que venarum partes extremæ. Atque quòd  
magna ex parte asperarum arteriarū essen-  
tia, cartilago est, quæ concidere, atque con-  
cludi omnifariā nō potest: quòd etiam ea-  
rum, quàm duorū vasorū reliquorum, ora,



*Diuisio-* multò sunt ampliora. Cùm igitur ipsorum  
*nes vaso-* circa pulmonem diuisiones numero sint  
*rum circa* æquales: rationi consentaneum est, asperæ  
*pulmonē.* arteriæ veluti ramos, reliquorum duorum  
 generũ partes, proportionē superare. Id ve-  
 rò manifestè apparet per visceris ipsius dis-  
 sectionem, nam vicina quæque vasa eandē  
 inter se seruant in magnitudinis excessu  
 proportionē, quā ab initio maximè eorũ  
 partes habere conspiciuntur. Hæc sunt quæ<sup>10</sup>  
 dicere debuit Erasistrat<sup>9</sup> ac deinceps, utrũ  
 inspirationis, an expirationis, an quietis tẽ-  
 pore, pus ex thoracis spacio in pulmonem  
 recipiatur, explicare: ac deinde quum id,  
 neque per inspirationem, neque per quie-  
 tem fieri docuisset, ostendere ipsum expira-  
 tionis tempore recipi: id quod facillimum  
*Respira-* erat demonstrare, ei cui prius persuasum es-  
*tionis a-* set, respirationis actionem ad thoracem  
*ctio ad* pertinere, pulmone nullam propriam ha-<sup>20</sup>  
*thoracem* bente motionem: quippe qui per cõsequen-  
*pertinet.* tiā dilatato thorace, pariter attollitur: eo  
 verò constricto, ipse, spongiarum exẽplo,  
 quas manibus exprimimus, in sese residere  
 solet. Etenim hoc pacto per magna vulne-  
 ra fibra ipsius per vuln<sup>9</sup> procidere videt<sup>r</sup>:  
 verũ citra vulnus, thorax vehemẽter cõ-  
 strictus, humorem qui in eo spacio, quod  
 inter ipsum & pulmonē est, continetur, in  
 aspe



asperas ipsius arterias cōprimendo cogit;  
 Nec credas velim, huic orationi, vehemē-  
 ter, frustra fuisse insertum. Nisi enim ve-  
 hementer admodum thorax pulmonem  
 ex omni parte comprimat, humor in aspe-  
 rarum arteriarum ora recipi non poterit.  
 Quamobrem natura, quo robustior fieret  
 expressio, tussi vocata, donauit animalia.  
 Quæ cum naturale sit accidens, & sternu-  
 10 tamentum, & singultum, & nauseam, simi-  
 litudine quadam imitatur, de quibus in li-  
 bro de causis accidentiū satis dictum est.  
 Verū quia viribus opus est, quib⁹ huius-  
 modi accidens naturale exciteretur, contin-  
 git creberrimè p suppuratos affectus, mor-  
 ri laborantes, pstratis antea viribus, quod  
 à validissima thoracis constrictione, ea-  
 demq; celerrima, tussis excitat. Atq; vires  
 imbecillæ, neq; validè neq; celeriter age-  
 20 re possunt. Ergo de expuitione quæ ex spa-  
 cio thoracis procedit, satis fuerit hæc di-  
 xisse: redeamus igitur rursus ad eum quæ  
 ab initio proposuimus sermonē. Sanè quæ *Vnde fiat*  
 in succingente costas mēbrana, ac muscu- *pleuritis,*  
 lis illi cōtinuis, sunt inflāmationes, mor- *ant latera*  
 bū quæ lateralē vocāt, efficere solent. Hu- *lis morbus*  
 ius accidētia inseparabilia sunt: febris acu *Acciden-*  
 ta, dolor, perinde ac si locus vel intenda- *tia pleu-*  
 vel pungat: spiratio frequens, & exigua: *ritidis*



*Incocta  
pleuritis.*

*Dolor la-  
teralis si-  
milis pleu-  
ritidi.*

pulsus parvus, arteriā & durā & quodam modo tensam indicās: tussis magna ex parte cum sputis coloratis, nōnunquā verò sine his. Has incoctas pleuritides, nomināt quæ vel celeriter hominē rapiūt, vel longo temporis spatio finiuntur. Ac dolor, modò ad iugulū, modò ad præcordia peruenire videtur. Sunt præterea alij laterum cum febre dolores, per quos spirationem exiguam reddi necesse est, sed nullum red-  
ditur sputū, vt in ea re nihil à pleuritide sine sputo constāte, differre videatur. Verū hi facilē ab illis discerni possunt. In his enim nulla omnino tussis est: illi verò qui sine sputo pleuritide laborāt, sicca tussi molestantur: deinde quod neque tensionem, neque duritiem vllam, refert pulsus: postremò quòd non æquē acuta febre laborant, neque adeò difficulter spirant. Sūt etiam nonnulli, qui presso extrinsecus inflammato loco dolere sese fatentur. Atque ij per sputum non purgantur, quia ab initio nihil eius succi qui inflātionem excitauit, ad thoracis spacium peruenire solet. At concocta inflammatione, nisi prius discutiatur, ad cutem vsque attollitur, atque inciditur.

*De septi transuersi affectibus.*

C A P. III.

T e



**T**erminū quo thoracis pars inferior *Phrenæ*  
 finitur, antiqui phrenas (id est men- terminus  
 tem) appellauerūt: siue simpliciter de ipsis quo pars  
 in animum venerit, siue (vt aliqui putant) thoracis  
 quia eo inflammatione affecto, mens quo inferior fi-  
 que lædatur. A Platone autē diaphragma nitur.  
 vocari incepit: qui sanè & ipse aliis vete- diaphrag-  
 ribus similiter, phrenas appellauit. Putat ma.  
 autē hūc in animalibus vsum habere dia- *Vsus dia-*  
 10 phragma, vt irascibilē animæ vim in cor- phragma  
 de contentā abs appetitoria, quæ in ieco- tis ex *Pla*  
 re sedem habet, septo distinguat. Postea tonis sen-  
 Medici neglecto prisco nomine diaphrag- tentia.  
 ma ipsum appellare cōsueuerunt. Id quod  
 in dorsali quoq; medulla eos fecisse con- *Medulla*  
 stat. quippe huic quoque ob propriæ sub- dorsalis.  
 stantiæ nomen medulla est, quemadmo-  
 dum instrumentū cuius nunc mentionem  
 fecimus phrenes nuncupatur. Verū quo  
 20 clarior esset dignotio, illi dorsalis, quem-  
 admodum & cervicalis, & spinalis, atque  
 lumbaris, cognomenta addiderunt. Post-  
 eā ferē omnes simpliciter dorsalem ap-  
 pellare consueuerunt. Sic in præsentī quo-  
 que proposito, phrenum nomine reiecto,  
 diaphragma (id est septum transversum) *Septū trās*  
 nominare magis placuit. Aristoteles au- uersum.  
 tem hanc animalis particulam, succinctu- *Succin-*  
 rā appellat, nescius ipsam magnæ ac per- ctura.  
 sup



quàm necessariæ actioni, in animalibus  
esse deputatâ, quippe quæ spirationis sit in-  
strumētū. Igitur nō immeritō cū afficitur,  
spirationem lædit, ut suprà cū de spiradi  
difficultate ageremus, diximus: ubi pro-  
prios eius affectus vnâ cū his qui p con-  
sensum cū spina & neruis ab ea exortis in  
ipso fiunt tradidimus. At verò nūc eos af-  
fectus, qui superno cōsentient principio,  
ei adueniunt, perstringamus. Igitur antea 10

*Deliriū.*

quàm aliquid deliret, frequentem ac exi-  
guum: infestante verò iam delirio, multa  
varietate inæqualem spiritū reddit: ut in  
libris de Spiradi difficultate iam dictū est.  
Atque delirare etiam solent nonnulli, ob  
vitium quod in ore ventriculi consistit, &  
febris ardētibus, & pleuritide, & perip-  
neumonia. Sed quæ ob septi transversa af-  
fectum accidunt deliria, non multum di-  
stant à phrenitide. quippe per cæterarum 20  
partium affectus, atque per febres ardētes  
deliriū mitigari solet, quoties morb⁹ de-

*Phreniti-  
dis delirij  
nota.*

clinare videtur. At phrenitidis ppria, præ-  
cipuaque nota est, ne in declinatione qui-  
dem febrium, delirium quiescere. Neque  
enim per cōsensum dūtaxat, sed huiusmo-  
di morbo cerebrum afficitur, sed propria  
primariaq; affectione laborat, atque pro-  
inde paulatim accidere, quiescere verò ne-  
que



que subitò neq; affatim solet, vt in his par-  
 tibus quarū nuper mentionē fecimus, ac  
 antea quā inualescat, præcedunt ipsum  
 accidētia nō pauca. Eaquē omnia phreni-  
 ca indicia vocantur, quæ ab iis quoq; qui *Phreniti-*  
 me præcesserūt, cōscripta sunt. Nam inter- *ca indicia,*  
 dum vigilias præcedere, siue etiā somnū *per cerebri*  
 manifestis imaginibus turbatū, vt & cla- *affectum.*  
 mēt nōnulli, & exiliāt, videre est. Interdū *Irrationa-*  
 10 verò irrationalis accedit obliuio, vt labo- *lis obli-*  
 rātes aliqui quū matellā petiuisent, meie *uio.*  
 re tamē neglexerint. Aut quū lotiū emit-  
 tērēt, matellam ipsam prodere haudqua-  
 quā meminērunt. Interdū maiori cū tu-  
 multu, aut temeritate respondēt, p̄sertim  
 vbi aliquis antea fuerit mansuetus. Atq; ij  
 omnes exiguo vruntur potu. Spiratio ipsis  
 rara est & magna, pulsus minores, magisq;  
 neruosos habent. Nōnunquā occiput do-  
 20 lor infestat. Quum verò iam proximē ad  
 phrenitidē accedunt, oculi eius vehemen-  
 ter euadunt squalidi, aut ex altero ipsorū  
 acris lachryma effundit, ac deinde lippitu-  
 do innatat, & venæ ipsorū sanguine plenę  
 videntur, & sanguis stillat è naribus. Quo  
 tempore nihil quod exactē ad prudentiā  
 pertineat, respondēt, & floccos auellunt, &  
 festucas carpunt, atque aridiorē febrī, cui  
 non ita magnę in alterutrā partem muta-



tiones accedunt, torquentur, quemadmodum in aliis quibusdā febribus videre est, quæ per vigorem quidē grauissimè instant, inclinationes verò habent mitiores.

Ad hæc lingua quoq; salebrosa est, nōnulli interdū audiēdo falli videntur, ac interdum mœsti iacent, vix quicquā respondentes, atq; dispositione dolorifica affecti, vel acrius premente aliquo, eā haudquaquā sentiunt. Ergo hoc modo per cerebri affectū, paulatim phrenitis euenire solet. Ab

*Deliriū à septo transuerso.*

*mētē quare phrenas appellauerint antiqui.*

aliarum verò partium nulla perpetuū delirium procedit, dempto solo septo transuerso, cuius vitio excitatū deliriū, parum à continuo distat, adeò vt veteres putauerint, hac parte inflammatione affectā, homines phreniticos euadere. atque ob eandem suspicionem, phrenas (id est mētē) eam appellauerunt, tanquā sapiēti parti conferat quippiā. Verū, delirium quod huiusmodi vitio accidit, à phrenitide distinguit, & ex oculorū accidentib; & sanguinis à naribus stillis, atq; spirationis specie. quippe phreniticorum spiratio magna est, & ex longis semper interuallis. Cōtrā, vbi à septo delirium oritur, inæqualis, vt modò exigua sit atq; frequens, modò magna & angustiosa. Nam incipiente septi transuersi inflammatione, priusquā delirant



rent laborantes exiguū ac frequentē reddunt spiritum: contrā, iis qui ob affectum cerebrū delirant, magna prodit raraq; spiratio. Atq; vt summatim dicam, veluti eorum accidentium, quæ phrenitidem antecedere diximus, aut nullum apparet, aut si apparuerit aliquod, id perexiguum est, in his quibus septum transuersum inflammatione laborare incipit: ita rursus sursum reuelli hypochondrion septi trāsuerſi, illi-  
 10 cō ab initio affecti, propriū indicatiū est, id quod affecto cerebro posterius accidit, nō incipiente videlicet affectu, sed quū factus iam fuerit. Atq; calor quoque circa caput & faciem vehementior est iis, qui ob cerebri vitiū delirant. Reliqui septi transuersi affectus, siue primarij sint, siue per consensum illi eueniant, partim quidem ab hoc nostro proposito sunt alieni (nempe qui  
 20 manifestē apparent: vt sunt tūm alia accidentia, tūm abscessus in ipso exorti) partim verò iam antea dicti sunt.

*De gula affectibus.*

## CAP. IIII.

**E**Am partem quę inter fauces & os vetriculi media est, quam veteres œsophagon nominabant, qui post Aristote-  
 lis seculum scripserunt, stomachon, nos  
 gulam dicimus, appellare consueuerunt.

Quāuis Aristoteles prisco semp vocabulo

Oesopha-

gus.

Gula.

Stoma-

chus.

hanc



*Oesophagi* duplex est usus: vnus quòd veluti via est  
 eorū quæ deuorant: alter quòd circa vtrā-  
 que viā actionem quandam efficere vide-  
 tur, tūm deuorādo ea quæ ab ore ad ven-  
 triculū deferuntur, tūm reiiciendo ea quæ  
 ab hoc ad os eleuantur. cū enim geminæ  
 sint ei partes (quas dissectorum tunicas ap-  
 pellāt) altera ad cibi potusq; deglutitionē  
 vtitur: altera ad eā, quæ vomendo fit, expul-  
 sionem. Proinde rationi consentaneū est,  
 duo esse affectuū ipsius genera: vnum vt  
 viæ eorū quæ ingeruntur, alterum vt in-  
 strumentū eorū tūm quæ euomuntur, tūm  
 quæ deuorantur. Constat verò, duorum iam  
 memoratorū vsuū, alterum quidem sem-  
 per esse necessarium, alterū verò propter  
 occasiones quasdā. Igitur eorum acciden-  
 tium quæ ipsum tanquā viam infestāt,  
 genus vnū est, quū ob tumore aliquem  
 præter naturā angustior fit ipsius meatus.  
 Alterū quū proprias actiones perficere  
 nequit. Porro iam antea, vbi de angina q̄  
 ad vertebrarū in ceruice luxationē sequi-  
 tur, sermo habebat, diximus quòd acqui-  
 siticia ei angustia accidit, vbi à vertebra  
 ipsis cōprimi, cuius rei nūc quoq; admo-  
 nitū te esse velim. Nec obliuioni tradas tu-  
 mores eorū musculorū qui gulam ipsam  
 inuol



inuoluunt, quomodocunq; fiant: nam de omnibus in libro de Tumorib<sup>9</sup> præter naturam dictū iam est. Cæterum in iis omnibus commune est, quod tāta sæpenumerò inter deuorādū infestat angustia, vt potus ad nares remittatur. Quū verò inflāma *Gula inflama-* tione affecta gula, familiari ppriaq; angustia, nō à vicinis partib<sup>9</sup> acquisita, torquetur: tū grauissimus inter deglutiendū dolor infestat, accedēte quoq; per quā difficili transitu: præsertim si supinus, q; laborat, iacens trāsglutire quippiam conetur: quocirca sic affecti habitū transformare, atq; erigere sese studēt, ex accidente ipso edocti, faciliorem ita fieri deglutationē, adeò vt haud parū habitus hic, ad ciborū in decliues partes delationē, conferre videatur, vtpote quæ possit sæpenumerò vel sola fieri, si prius ex ore vsq; ad gulæ initiū *† κατὰ μὲν τὰς ἐν γυῖας* facta fuerit expressio. At supino decubitu nullū speratur auxiliū, quo facilius ad infernas partes ferantur alimenta, q;ppe quòd tū à sola gulæ actione deuorandi munus p̄fici potest. Neq; verò latet vos, quòd partiū inflāmatione affectarū nulla non doler, † quū suo munere fungit. Contrà vbi quieuerit, dolor mitigari solet. Ergo quū gula sentiēdi facultate sit prædita, eo ipso quoq; vti licebit quasi auctario ptis vnde passiones



*Interrogā-  
dus e-  
grotus de  
suo affe-  
ctu.*

passiones eius dinoscantur. Id quod à labo-  
rante, inter respondendū deprehendere li-  
cet, nisi adeo fuerit saxeus, ut qd ipm læ-  
dat, narrare nō possit. Quod si eiusmodi  
est qui possit animi sensa interpretari, gulæ  
sensus maximū præstabit corollarium, ad  
affectuū ipsius dinotionē. Etenim imbecil-  
litatē nōnunquam percipere se dicunt la-  
borantes, ut longo vix temporis spacio p-  
gulam transeant, ea quæ ingesta sunt: quæ  
aliquādo ad primum impetum facile de-  
scendūt, deinde rursus arcentur, ut videan-  
tur impacta, demūm per residuum spaciū  
facile labūtur. Horū primum actionis in-  
firmitatem, alterū particulæ cuiuspiā an-  
gustiā indicat. Verūm utriusque differen-  
tias, ex reliquis accidētibus intelligere li-  
cet. Nā in imbecillitate quæ à sola intēpe-  
rie, citra tumore præter naturā fit, ingesto-  
rum in trāsitu tarditas æqualis est, & sine

*Gulæ im-  
becillitas.*

dolore, & in supino decubitu augetur: ere-  
cta verò cernice mitigat, neq; vllus acce-  
dit angustię sensus. Vbi verò cū tumore est  
imbecillitas, vnā quāpiam particulam an-  
gustiorē cæteris efficit, atque per eam tar-  
dior erit transitus. Quod si tumor inflāma-  
tionis fuerit particeps aut erysipelatis, ac-  
cedit ei pariter & dolor, & fitis, & multi ca-  
loris sensus, & febris nō admodū ardens,

*Gulæ tu-  
mor cum  
imbecilli-  
tate.*

*Gulæ tu-  
mor cum  
inflamma-  
tione.*

quæ



quæ etiam siti proportionē haudquaquā  
 responderet. Si verò tumor aliquis ex nō ita  
 calidis fuerit: tūc citra febrim, & calorē,  
 & sitim, deglutitionis inæqualitas eue-  
 niret, retētis in pte quapiā alimētis, præfer-  
 tim si maiusculum, atque solidū fuerit id  
 quod deuoratur: acceditq; dolor aliq; sed  
 exiguus. Ergo quum aliquando huiusce-  
 modi accidentia longo tēporis tractu no-  
 bis apparuissent, accedente nonnunquā  
 ephemera febre, nōnunquā etiā horro-  
 re, coniecturam faceremus abscessum con-  
 coctū difficilē esse in gula: accidit proce-  
 dēte tempore, vt laborans ruptionis sen-  
 sum perciperet, ac subinde pus euomeret:  
 idque non solum eodem, sed postero quo-  
 que die, atq; itidē tertio, deinde succede-  
 bāt ei deinceps omnia vlceratæ gulæ indi-  
 cia. q̄ppe siue acria, siue acida, siue salsa, si-  
 ue acerba deuoraret, aut vellicationē, aut  
 constrictionē sentiebat: dolebatq; hac in  
 parte, vel nihil deglutiēdo, sed moderat⁹.  
 Vehementiorē verò dolorem excitabant  
 ea, quibus mordēdi, aut constringendi vis  
 erat. Hic ergo longo temporis spacio vix  
 seruatus est, fretus scilicet ætatis benefi-  
 cio. etem̄ natu maiores, ferē omnes perie-  
 runt. Sanē quotquot dolorificum quem-  
 piā in gula habēt affectū, omnes ex dorsi  
 quo

*Abscessus  
in gula.*

*Vlceratæ  
gulæ in-  
dicia.*

*Dorsi do-  
lor gulæ  
affectum  
indicat.*



*Vena ero-  
se aut ru-  
pte accide-  
tia.*

*Vlcus in  
gula.  
Os vetriculi.*

*Os vetriculi cor ab  
antiquis  
nomina-  
tum.*

quoque dolore ipsum significanter decla-  
rant. cuius rei causa haud obscura est, iis  
qui gulā spinæ incubentē viderunt. Quin  
etiam constat, quod ex gulæ vasis, haud se-  
cus quàm ex reliquis omnib<sup>9</sup> sanguis vo-  
mendo reiici potest. Id si ob ruptū vas ac-  
ciderit, dolor ibi percipit<sup>r</sup>: ac locū, vbi ali-  
quid ruptū est, indicat. Haud secus vbi ve-  
na fuerit erosa, siue diabrosin, siue anabro-  
sin, siue aliter quomodolibet nominare <sup>10</sup>  
volueris, locus affect<sup>9</sup> dephēdi potest. Aper-  
to autē vasis alicuius ore, nullus omnino  
dolor sentitur. atq; hac re à reliquis distin-  
guirur, ac prētereā quod neque ictus, neq;  
casus hanc profusionem prēcessit, id quod  
rupto vase videre est. Quanquā ob solam  
sanguinis plenitudinē, nulla adueniēte ex-  
trinsecus causa, vasa interdū dirumpi pos-  
sunt. At venæ erosionē, vlcus præcedere so-  
let. Fit autē vlcus, vel rupto vase, vel vicio- <sup>20</sup>  
forum humorum influentiā, id quod in cu-  
te quoq; sæpenumerò accidere vidimus.

*De oris ventriculi affectibus.*

CAPUT V.

**V**Eteres os vetriculi cor nominabant,  
ab accidentibus quæ inducere vide-  
tur hanc (vt aiunt) deducētes appellatio-  
nē. Neq; enim vt cardiacis syncopis: ita &  
sto



stomachicis, nonnulli corripiuntur: sed etiā  
 conuulsionibus, sopore, morbo comitiali, *Affectus*  
 & melancholia, necnon accidētibus qua *stomachi-*  
 lia per suffusiones infestant, vt iā antea *ci.*  
 quū de oculis loqueremur, dictū est. Atq;  
 omnes ij affectus, consentientibus ei cæ-  
 teris partib⁹, in ipso fieri dicuntur. Nam ad  
 propriā eius rationē pertinet, & appeten-  
 tiā prohibere, & natātes cibos corrumpere,  
 10 *o* quemadmodū id haudquaquam fieri so-  
 let, quū cibi in ventriculi fundo firmantur,  
 præcipuē si suapte natura nō ita facilē cor-  
 rumpantur. Igitur exactē animū aduertere  
 oportet, vt discernantur affect⁹, qui in ipso  
 per consensum eueniūt ab iis q̄ huiusmo-  
 di particulis, quarū actionibus nocere cō-  
 suevit os ventriculi affectū (quod vt vete-  
 res omnes cor appellabāt, ita nostra tēpe *Stomachū*  
 state stomachus vocatur) primario accide *vocabat*  
 20 re cēsentur. Sed hæc inter se discernere fa- *Gal. tēpe*  
 cilē poterit is q̄ assidua exercitatione cir- *stas os ve-*  
 ca notiones versatus, ea quæ præcesserūt, *triculi.*  
 diligēter cōsiderauerit. Sunt enim pprie-  
 tates quædā ineffabiles, sed quæ accidēti-  
 bus quæ narrari possunt, succedūt, quibus  
 certiores stabiliorēsque euadunt affectarū  
 partiū notæ, sed has vnulquisq; per se in-  
 uenire poterit. Quæ verò tāquā fundamē-  
 ta vniuersæ dignotionis existunt atq; ex

T



quibus studiosissimi quique, ineffabiles  
 accidētū proprietates ediscunt, deinceps  
 explicare aggredior. Igitur Grāmaticus  
*Grāmati* quidā iuuenis, quoties vel nimis vehemē  
*cus quidā* rex doceret, aut cogitaret, aut inediā susti-  
*iuuenis ex* neret, aut irasceret, comitiali morbo cor-  
*vehementi* ripiebatur. Perpendi quidē in hoc, os ven-  
*in docēdo* triculi (utpote qđ faciliē sentiret) affectū  
*labore,* esse: ac deinde per cōsensum & totū cere-  
*comitali* brū, & corpus vniuersum cōuulsione con- 10  
*morbo cor* cuti, cui probā concoctionē accuratē pro-  
*reptus.* curare, ac tertia vel quarta hora panem  
 optimē pręparatum exhibere iussi, atque  
 hunc quidē solū, si nō sitiret: si verō siti  
 cruciaretur, ex vino diluto, & quidē albo,

*Addit Aē* atq; modicē stringente. Nam huiusmodi  
*tius atiq.* vinum vt ventriculū robustū efficit, ita  
*Vinum al* haudquaquā tentat caput: id quod facere  
*bum modi* solent ea quę vehementes vires optinēt,  
*cē astri-* Quum igitur hac victus ratione vtens nō 20  
*gēs, caput* vt antē afficeretur: exactam iam notitiā  
*non tētat.* me habere arbitratus sum eorū quę prius  
 solā coniectura conseq̄uebar. Itaq; quoli-  
 bet anno bis, aut etiā ter medicamentum  
 amarū ex aloē ei exhibui: totū enim ven-  
 trē purgat, viresq; reparat: atq; ita vir ille  
 viginti annis, quib⁹ postea superstes per-  
 māsit, integra inculpataq; valetudine vitā  
 exegit. Quod si aliquando ob ingruentia  
 nego



negotia diutius à cibo abstinere cogere-  
 tur, exigua quadā cōuulsione vexabatur. *Conuulsio*  
 Iam alios quoq; vidimus cōuulsione co- *comitialis*  
 mitiali vbi oris stomachi vitiū correptos: ob vitiū  
 quū aut nō probè cōcoxissent, aut vini & oris stom-  
 quidē meracioris plurimū potassent, aut *chi.*  
 vbi veneri imodicè operā dedissent. Quin  
 etiā per febres quosdam conspeximus de-  
 repente cōuulsione prehendi, nullo (quod  
 10 eā praelagiret) precedente indicio: qui bi- *Biliofus*  
 liofo superueniente vomitu, protinus ab o- *vomitus*  
 mni noxa liberati fuerūt: atq; hoc modo *conuulsio-*  
 affectorū nonnulli res quasdā fuscas vo- *nē solues.*  
 mendo reiecerunt, alij humorē porri suc-  
 co similem: quidam etiā vitiolis grauati  
 cibis, soporosi permanserūt donec ea quæ  
 os ventriculi opprimebant, oīa euomuis-  
 sent. Atqui horum accidentium vix vllū  
 crederes à ventriculi ore procedere, quæ  
 20 admodū ne syncopas quoq; nisi tam cre-  
 brò ita euenire viderētur. Quāquā enim *Nervi ad*  
 nō pauci ad ipsum ex cerebro nervi per- *os ventri-*  
 ueniūt, non tamē tot esse videntur, vt per *culi perti-*  
 eos tantus sit principij cum ore vētriculi *nentes con-*  
 cōsensus, vt inde conuulsio inferri possit. *uulsionem*  
 tantum abest, vt quis credat, cor ipsum tā *non infe-*  
 vehementer ori ventriculi consentire, vt *rant.*  
 acuta protinus sequatur syncopa. Por-  
 rò multos non solum insomnia, & somni



rumultuosi molestant, sed amentia quoque, propter vitiosum humorem in ore  
*Flatusus* ventriculi aceruatū. De flatuoso verò vo-  
*et hypo-* cato & hypochōdriaco morbo nemo non  
*chondria-* dixit, quomodo tristitiā, desperationem,  
*eius mor-* mcestitiam inducat: atque, vt summam  
*bns.* dicam, ad melancholiæ accidentia nihil reliqui facit. Quippe laborantes huiusmo-  
 di morbo, post cruditates dictis acciden-  
 tibus multò vehemētius infestant: ac qui-  
 dā ex ipsis splenici quoque fiunt. quocirca  
 coniiciendum est, ex hoc etiā viscere vi-  
 tiosam saniē in ventriculū irruere. Ergo  
 ea accidentia quæ vel cerebrū, vel oculos  
 afficiunt, vitiosorū humorum vaporatio-  
 nem sequuntur. At syncopa quæ stomachi  
*Syncopa* vitio solet evenire, ob dolorū ipsius pro-  
*stomachi* prietatem exolutionem inducit: eius quo-  
*vitio eve-* que intemperie ad cor fortasse perueniē-  
*niens.* te. Quemadmodū vbi cor vehemēter in-  
*Citta.* temperatum est, vires agminatim cadere  
*Pica.* necesse est. Atq; constat etiā, q̄ *κίττα* (id  
*Appeten-* est, *pica*) vocatæ mulieribus accidunt, vbi  
*tia canina* hæc particula affecta est. Quæ enim aut  
*Nausea.* canū more, aut nihil omninò, aut malos  
*Cordis do-* cibos cupiūt, iis appetētiæ instrumentum  
*lor.* læsum esse certū est: id verò os ventriculi  
*Singul-* esse demonstratū iā est. Sic etiā nausea cor-  
*tus.* dis dolores, singultus, inter huiusce ptis  
 affect.



affectus numerari debent. Verum omnium harum affectionum causas in libro de Accidentium causis, iam diximus, ut nihil nunc opus sit, in earum explicatione temporis instanturam facere. Etenim quæ per intemperantiam ei veluti simili corpori morborum differentia adueniunt, iam ibi enarratae sunt. Instrumentales vero morbi qui ei accidere solent, adeo manifestas habent notitas, ut latere possint neminem, qui communes significationes: quæ & in his antea commetariis, & in aliis quibusdam præscriptæ sunt, memoriâ tenuerit. Neque enim abscessus, neque inflammatio, neque erysipelas, neque ulcera huius loci in obscuro sunt, utpote, quorum communes sunt notæ cum iis quæ supra de gulæ affectionibus, dictæ sunt: atque illis eò manifestiores, quò facilior huic parti sensus est, ac clarâ quoque, prom-  
 20 pramque notionem habet. Similiter ubi ex hac parte sanguis reicitur, indiciorum proprietas communis est cum illis, quæ de gula iam diximus: verum cognitio longè manifestior euadit. Atque par esse videtur, totum ventriculi spatium simili dispositione affici, quales sunt illæ quas in ipso ore fieri diximus, atque similia quoque ei aduenire accidentia. Quod verò longè maiorem inferunt violentiâ ea, quæ in ipsius

*Instrumentales morbi oris ventriculi.*



ore contingunt: idcirco Medici ea quæ in parte ventriculi inferiore eueniunt, perinde ac si omnino non fierent, & despicere & cõtemnere solent. At quia coctionis opus in partibus ab ore inferioribus fieri nemo negat, necesse est hanc ipsam partem, quum malè disposita fuerit, cruditatum esse causam. quum videlicet vel ob inordinatam alimenterum ingestionem, aut multitudinem, aut qualitatem homo cõcoquere nequit. 10

Morbi verò cæteris partibus omnibus cõmunes, siue instrumentales sint, siue per solam intemperiem infestent, quorum sedes affectæ manifestæ sunt, ad hanc præsentem cõmentationem propriè non pertinent. quippe eas duntaxat partes, quæ sensus iudiciũ effugiunt, considerare propositum est. Sed de sanguine qui ex ipso vomendo reicitur, non conuenit inter Medicos. Etenim sunt qui putent nequaquam fieri posse, ut san- 20

guis vel ab hepate vel à liene effluens per ipsum euacuetur: similiter de pure quoque ab ipsis erumpente existimant. verum enim uerò per artis exercitationem utranque opinionem examinari mihi, visa est per ipsum fieri euacuatio ex dictis visceribus. Cæterum differre volumus huius rei doctrinam in eum locum, ubi de ipsis sermonem faciemus: quippe deinceps & iecinoris & lienis affe

*Sanguis à  
vêtriculo  
reiectus.*



affectus percurrere propositum est.

*De iecinoris affectibus.* CAP. VI.

**H**ic parti, quemadmodum & cæteris  
 omnibus duplex morborum genus  
 accidit: vnum à sola intēperie, citra tumo-  
 rem præter naturam. Alterum vbi vnà cū  
 intēperie tumor quoq; infestat, vt inflam-  
 matio, erysipelas, scirrhus, id est tumor  
 durus: obstructions à crassis & viscosis  
 humoribus, spirituosæ, seu flatulētæ distē-  
 tiones, idque in extremis vasorū partibus  
 quæ ex venæ ipsius portis exoriūtur. Has *Obstru-*  
 quidem obstructions sequitur grauitatis *ctionū ie-*  
 sensus, quæ dextro-hypochondrio incum- *coris si-*  
 bat. Quod si halituosus quoque spiritus, *gna.*  
 cui non pateat exitus, ibi concludatur: nō  
 solum grauitas, sed tēisionis etiam sensus  
 10 sequetur. Inflammationes verò quæ in hoc *Inflam-*  
 viscere citra ipsius imbecillitatē nascun- *matio gib-*  
 tur, si quidem in gibba parte consistent, *barum ie-*  
 præcipuè si grandes fuerint, perfacilè vel *coris par-*  
 solo tactu dignosci possunt. At simarum *tium.*  
 partiū inflammationes per alia potius acci-  
 dentia, quàm per tactū inuestigare oport-  
 ter. Incipiam igitur ab his quæ in parte  
 gibba oriuntur: si prius vos admonuero  
 eorū quos in corporum dissectione con-  
 spexistis musculorū, q̄ sub cute tendūtur.



*Musculo-  
rum epi-  
gastrij  
dissectio.* Sunt verò octo numero, quatuor cōtenti  
coniugationibus. Quarū prima ex muscu-  
lis constat rectis, per totum carneis, à lo-  
cis quæ circa sternon sunt, ad pubis ossa,  
ita enim vocāt dissectores, descendētibz.  
At reliquarū trium coniugationum mu-  
sculi, vsque ad rectorū contactum, carnea  
quidem parte constant: vbi verò primum  
illos attigerūt, in nervosas mēbranas de-  
generare vidētur. Horū itaque musculorū  
vna cōiugatio, quæ quidē reliquis omni-  
bus exterior est, à thorace obliqua dedu-  
citur, in anteriores partes & deorsum de-  
scendens. Altera huic cōtraria ab infernis  
exorta partibz, obliqua ad anteriores & su-  
periores ascendit. Huic tertia musculorū  
cōiugatio subiicitur, qui transuersum ha-  
bēt positū: atq; peritonæo, id est, mēbranæ  
quæ intestina cōtinet, innituntur. Recto-  
rum autē musculorū tumores præter na- 20  
turam oblongi, atq; per mediū totius ven-  
tris extensi videntur: vmbilicū veluti ipsi  
quoque muscoli, cōprehendētes, quapro-  
pter haud obscura est eorū dignotio, vt-  
pote quos & positus, & figura declarat.  
accedente ad hæc qd ipsi à nullo exteriori  
musculo contegūtur. Hæc autem obliquis  
quoque musculis, qui à thorace descen-  
dūt, sunt cōmunia. At multò difficilior est  
noti



notitia musculorū q̄ iis subiecti sunt: dif-  
 ficillima verò tranſuerſorū. Conſtat au- *Iecoris po-*  
 tem iecur intra hos ſub peritoneo eſſe po *ſitio exte-*  
 ſitū, quod quū tribus contegatur muscu- *rior.*  
 lis fieri, non poteſt, vt tactus aliquā ipſius  
 notitiā præſtet, niſi vel magna in ipſo o-  
 riatuſ inſlāmatio, vel incūbētes ei muscu-  
 li extenuentur. Sed iecur affici declarāt, in *Iecoris af-*  
 dextra præcordiorū parte grauitas, dolor *fecti notæ.*  
 10 tota præcordia retrahens, atq; ipſius vſq;  
 ad iugulū extenſio (nam & hoc nonnun-  
 quā euenire ſolet) exigua tuſſis, linguę co-  
 lor in primis quidē ruber, deinde verò ni-  
 ger, ingēs faſtidiū, ſitis inexhauſta, vom-  
 itus tū ſynceræ bilis, tum eius quæ ouorū  
 vitellis ſimilatur, quæ poſtea æruginis ali-  
 quādo colorem referre cōſpicitur. Aluus  
 quoq; adſtringitur, niſi vnā cū viſceris hu-  
 ius imbecillitate inſlāmationem excitari  
 20 cōtingat. Eryſipelatis autē accidentia his *Eryſipe-*  
 ferē ſimilia ſunt, & inſuper febris quoque *las in ie-*  
 cū vehemētiffima ſiti laborantes cruciat. *core.*  
 eas enim febres quas ardētes antiq̄ voca-  
 bāt, magna ex parte aduenire videmus, ie *Febres ar-*  
 coris aut vētriculi flāmeis diſpoſitionib⁹, *dentes.*  
 atq; in pulmonis inſlāmatione eryſipela- *Phlegmo-*  
 tis particeps (Græci φλεγμονήν, ἐρυσιπελαῖώδην *ne eryſipe-*  
 appellāt) ardētes febres excitātur. quēad- *latodes.*  
 modū vbi in vniuerſo quoq; corpore bi-



*In lib. de  
marcore.  
Simarū ie  
coris par-  
tium inflā  
matio.*

liosi humores ad immoderatū feruorem  
perueniunt. Verūm hæ quæ aut iecoris,  
aut ventriculi occasione eueniūt, omniū  
sunt vehementissimæ. Quibus particulis  
ita laborātibus febres magna ex parte in  
marcorē trāsmutātur. Sed de hac alibi se-  
orsum scriptū est. Quæ in finis iecinoris  
partibus eueniūt inflāmationes, vt magis  
quām illæ quæ in eius gibbo sūt, fastidiū,  
nauseam, vomitū biliosum, sitim ingentē 10  
inducunt: sic econtrariō hæ maiori quām  
illæ, inter spirandū dolore (vt dictū est) la-  
borantem afficiūt, magisque tussim exci-  
tant, atque dolorem vsque ad dextræ par-  
tis iugulum, adeō vt detrahi videatur, ex-  
tēdūt. porrō vtriq; parti quū dolor adest,  
nothæ costæ nonnūquam cōsentiunt. Ita-  
que eis commune est, non omnibus: pro-  
pte reā quòd iecur per membranas non o-  
mnibus cōiungitur: id quod non solū in 20  
simiis, sed in aliis quoq; animalib<sup>9</sup> vide-  
re est. Etenim aliis quidē cōiungitur, aliis  
minimē. Igitur quemadmodū interdum  
in gibbis dūtaxat, ita & in finis huius vi-  
sceris partibus inflammatio oritur: quā-  
uis in neutra partium exquisitē distincta  
possit consistere. Nam omnium eius par-  
tium carnes inter sese continuantur. Cæ-  
terū quibus naturā, abdomen gracile est,  
quando



quando morbo gracilius efficitur, in iis facile est videre ingentē iecinoris inflammationem, quæ propriam hanc à musculis incumbētibz sortitur differentiam: quòd moles sub manibus ad coaceruatā circumscriptionē definit. At musculus quilibet, quum totus sibi continuus sit, inflammationis ipsius moles sensim diminui consuevit. quippe soli iecinori proprium est, vt tumoris cumulum comprehensim habeat circūscriptum. Vnde manifestum est, quòd durus in ipso tumor (Græci scirrhus vocant) multo euidentius dignosci potest, eo quòd durior sit scirrhi ipsius, quàm inflammationis moles, quodq; in huiusmodi dispositiōe extenuata sint corpora, quæ ei incūbunt. At verò tractu temporis quāuis magis increseat scirrhi tumor, nō tamē æquē faciliē fuerit, per tactū  
10 ipsum cognoscere, intercipientē scilicet iudicium aqua inter cutem, quæ illico scirrhum sequi consuevit. Quippe nisi hepar afficiatur, haudquaquā fieri potest huiusmodi affectus, nō tamē semper ob primariā eius affectionē excitatur, quāuis hoc sit quàm frequentissimum. Etenim quia ipsum, eius facultatis, quæ sanguinem gignit, instrumentū est, cōsequens est, vt vitiato hoc viscere, actio quoq; ei⁹ vitietur.

*Scirrhus  
hepatis.*

Acci



Accidit autem (vt dixi) quum aliâs aliam partem frigida admodû intemperies afficit, vt hepar quoque refrigeretur. Igitur si vel lienis causa, vel ventriculi, vel intestinorum vniuersorû, maximè ieiuni, mesentericæ venæ[omnes] habituali intemperie afficiantur, facilè etiâ vnâ refrigera re possunt omnes simarû iecoris partium venas: quò fit vt ad hepatis quoq; corpus intemperies ipsa perueniat. Si verò vel pul-  
monis, vel septi transuersi, vel renû occa-  
sione id accadat, in primis venæ, quæ in vi-  
sceris huius partibus gibbis cōsistunt, per  
consensum afficiuntur: deinde tractu tem-  
poris totum hepar quoque eâdem disposi-  
tione infestatur. Ergo quæ hucusque dixi-  
mus, sic se habere nemo inficiabit, nisi for-  
tè q̄s aut suapte natura cōtētiosus, aut o-  
mnino fuerit indoct⁹. De obstructione ve-  
rò, nō æquè certæ habētur cōiecturæ. Et-  
enim quòd simarum partium venæ, ab ea  
quæ in porta exoritur, in tenuissimas ex-  
tremitates finiâtur, haud obscurè apparet.  
Atque quòd ad eundē locum aliæ quoque  
venarum extremities à concaua vena, in  
gibbas visceris partes distributarû perue-  
niant, similiter cōstat. licet quomodo per  
sua ora ipsæ inter se cōiungantur, videre  
nequaquam possimus. Neque enim dubi-  
tat

*Hepatis  
obstru-  
ctio.*



rat aliquis, sed omnes ferè Medici ex vno ore enuntiant, quòd cibus vniuerso corpori distributus ex omnibus sinarū partium venis exiēs, ad gibbas partes per dictas extremitates tràssumitur. Quòd si fateamur sanguinis transitum, ob tumoris venarum quæ inflammatione & scirrho occupātur, molem constringi: rationi consentaneum esse videtur (vt nonnullis placuit) vt pars 10 quæ in sanguine magis tenuis atque aquosa est, tràssumatur, atq; vehatur per vniuersum corpus: syncerus autem sanguis, qui propter sui crassitudinē in caua visceris parte permanet, ei morborum qui ex plenitudine fieri solent, causa esse censeatur. Per-  
scrutantibus verò nobis huius sectæ placita, videntur partim cum iis quæ iam suprà dicta sunt, cōsentire: partim verò nonnihil ab iis, quæ apparere solent, differre. Quòd 20 enim aquosa sanguinis pars transumpta in venā concauam vsquequaque per corpus dispergatur, consequi videtur ad ea, quæ iam in confesso esse diximus. Quemadmodum crassiorem sanguinem in visceris venis præ angustia earum retentum ad intestinum ieium & tenue, & colon, & cæcū atque rectum deferri, & (vt quispiam dixerit) in ventrem fortasse, nemo tamen id accidisse vidit: neque in hepatis præter natu.



*Anasar-  
ca.*

*Hyposar-  
ca.*

*Ascites.*

*Tympania.*

*Hydropi-  
corum af-  
fectus.*

*Aquæ fri-  
gidæ potio*

naturam tumoribus, neque etiã obturatio-  
nibus. Verùm in omnibus corporis parti-  
bus, tũ supernis, tum inferioribus pituito-  
sus sanguis contineri cõspicitur in iis mor-  
bis, quos Græci & anasarcas & leucophleg-  
marias nominare cõsueverunt. Per aliuũ au-  
tem nihil cruetum, neque in iis, neque in  
ascite, neq; in tympania secerni solet. Sed  
spacium quod inter peritonæum & partes  
ei subiacentes est, aquoso humore imple-  
tur. Proinde rationi magis cõsentaneũ est,  
ut ob visceris refrigerationẽ cibis qui reli-  
quis partibus distribuitur, in sanguinẽ trãs-  
mutari non possit, quin etiam refrigeratur  
cum ipso vniuersi corporis venæ, idq; ma-  
ximè, vbi nullo plerumque tumore in ieci-  
nore apparente, laborãs aqua inter cutem  
molestari videtur: vitio existente vel in lie-  
ne, vel ieiuno aut tenui intestino, aut me-  
senterio, vel pulmone, vel renibus, aut etiã  
vbi plurimus per hæmorrhoidas sanguis ex-  
cernitur, aut ob muliebri profluuium, aut  
quũ retinentur mēstrua, aut ob aliã ingen-  
tem vteri dispositionẽ. Nam per omnes hu-  
iuscemodi affectus aquã inter cutem homi-  
nemi vexari contingit, vel nullo existẽte in  
hepate præter naturã tumore. Id verò præ-  
cipuè intelligitur ab iis, qui didicerũt quo  
modò ex intempestiua aquæ frigidæ pota-  
tione



tione iecur affatim refrigeratū, statim a-  
quam inter cutem inducit, antequam scili-  
cet in durum tumorem attollatur. Verūm  
sic affecti vehementi ciborum desiderio te-  
nentur, nec mirum, quippe ob refrigeratū  
os ventriculi, huiusmodi cupiditates inua-  
lescere, iā antē didicimus. Sed de aqua in-  
ter cutem, quantum ad præsens attinet pro-  
positum, hæc dixisse satis est.

IO

*De morbo regio.*

CAP. VII.

**P**ORRò vtrum semper in morbo regio lo *Morbi re*  
cus affectus sit hepar, an alia prætereà *gij causa*  
dispositio hunc affectum efficere possit, de *et indi-*  
inceps percurrento scrutemur: siquidem vi *cia.*  
demus nōnunquā iecinore nequaquā  
affecto per morbi iudicationē, effundi ad  
cutem bilem pallidā, quomodō humorum  
in aliquam partem decubitus quoque ali-  
20 qui interdum euenire consueuerunt. Vide-  
mus etiam aliquando citra morbi iudica-  
tionem sanguinem ab extranea quadam  
corruptione in bilem verti: qualis ferarum  
morsu fieri solet. Etenim Imperialiū serui  
torū quidam, qui viperarum venationi de *Impera-*  
putatus erat, quum à vipera morsus esset, *toris ser-*  
aliquanto tempore medicamenta quibus *uus quidā*  
vri cōsueuerat, potabat: cumq; vniuersi cor à *vipera*  
poris color mutaretur, adeo vt porri co- *morsus.*  
lorem



lorem referret, accedēs singula nobis enar-  
 ravit, cui epota theriaca, quā celerrimē co-  
 lor secundū naturam restitutus est. Solent  
 autē Medici inuestigare, an assumpti vene-  
 ni propria extēt signa, eo quōd sæpenumē-  
 rō videant, citra letalis veneni portionē hu-  
 mores similiter vt epoto veneno corrūpi.  
 Verūm non mirum est, si sic aliquādo mu-  
 tentur humores, vt vniuersum corpus auri-  
 ginosum euadat. Quāquā fieri etiam po-  
 test, vt iecinoris secundū naturam tempe-  
 ries mutata, humores huiuscemodi vitio  
 afficiātur, & quidem citra obstructionem,  
 aut inflātionem, aut scirrū. Quinetiā  
 manifestē quādoque videmus, vniuersum  
 corpus herbis candenti pallore infectis si-  
 milari: interdum plumbeū, aut etiam ma-  
 gis fuscum referre colorē: interdum etiam  
 alias quasdam ineffabiles colorū proprie-  
 tates, quæ iecinore suo munere non rectē  
 fungente, sine tumoribus præter naturam  
 accidere solent. Sic ob splenis quoq; vitia,  
 huiusmodi colores eueniunt, sed multo ni-  
 griores quā ab hepate. Quos vt clara in-  
 terpretatione enarrare difficillimū, ita co-  
 gnoscere facillimum, iis præsertim qui il-  
 los sæpenumērō cōspexerint. Etenim Ste-  
 fianus quum Medicorum iudiciū subiisset,  
 nescio quo pacto eorum non pauci absces-  
 sum.

Stefianus  
 abscessu  
 in muscu-  
 lis epiga-  
 stris labo-  
 rans.



sum in ipsius hepate cōsistere crediderint. Sed postea quā longo temporis spacio nihil se in melius p̄ficere sentiret, me quoque vocauit. Igitur simulatque domum, vbi iacebat, fuissem ingressus, aspiciēs eū, hoc inquam scias velim, nullū tibi esse in viscere vitium: sed quid aliud te molester, nudatis prācordiis declarare conabor. Inueni ergo in p̄fundis musculis abscessum, 10 contracto iam pure, in medio spacio eorum musculorum, qui per transuersum incedunt, atque illorū qui obliquē ab infernis sursum tendunt, qui (vt nouistis) medij sunt inter eos qui transuersi peritonēo incumbūt, & eos qui sub externa cute obliqui deorsum feruntur. Sic etiam alios complures scitis me notasse, per colorem declarādo modō iecur, modō splenem esse affectum: nullā audita prāteritorum acciden- 20 tium narratione, neque etiam per tactum inuestigato viscerum affectu. Proinde sæpenuerō audiuiſtis me malē imprecantem iis, qui medicæ quidē professionis (q̄ ad spectatiuā pertinet) principes se esse iactabant, nullius verō ægri volebant aggredi curationem. De quorū numero plurimi fuerunt tum empirici, tum methodici: quibus si quis dixerit, fieri posse, vt solo perspecto colore, affecta sedes interdum cogno-

Color de-  
clarat ie-  
coris sple-  
nisque vi-  
tia.



scatur, illi aperto ore, atq; rabidi canis exē  
 pto, exerta lingua impudenter ei resistūt.  
 Verūm præsens sermo haudquaquam ad  
*Iecoris im-* illos dirigitur. Itaque ad aliud accidentiū  
*becillitas.* genus quod sola iecinoris imbecillitate,  
 quæ per se ac sine inflammatione euenire  
 solet cōtinetur, nūc transeamus. quēadmo  
 dū & de ipsius inflammatione, quæ circa pro  
 prię facultatis suæ imbecillitatem accidit,  
 seorsum iam diximus. Cæterum postquam 10  
 sanguinis generationem hepatis munus  
 esse intelligim⁹, si causa aliqua fuerit, quæ  
 hunc generare possit, eā hepatis propriā fa  
 cultatē esse dicemus. Propriam autem dixi  
*Propria* mus, propter eas quę omnibus corporis no  
*hepatis fa-* stri partibus communes esse dignoscuntur  
*cultas.* quasin libro de Naturalibus facultatibus,  
*Cōmunes* iam percurrimus, attractricem dico, & re  
*faculta-* tentricē, & expultricem. Nāque quarta ge  
*tes.* neratim quidem alteratrix, speciatim verò 20  
 sanguifica vocatur. Porro omnium faculta  
 tum essentiam in peculiaribus partiū tem  
 perantiis cōsistere didicistis. proinde quā  
 iecur ad aliquam octo intemperantiarum  
 labitur, accidet viribus ipsius noxa, quæ il  
 li intēperantiæ peculiariter deberur. Sed  
 de iis generalem scripsimus sermonem, in  
 tertio libro de accideriū causis: proprius  
 autem cuiusque secundum speciem partis  
 com



communi ad portionem respondet. Igitur calidæ iecoris intemperantiæ, cum conten-  
tos in ipso humores, tum eos qui per me-  
fenterij venas deferuntur, & assant & adu-  
runt: frigida autem, contentos iam in ipso  
humores, crassos atque ad fluxum & mo-  
rum contumaces reddunt: id verò quod  
ad ipsum fertur, & pituitosum, & crudum,  
& semicoctum efficiunt. Sic de reliquis  
quoque duabus dicendum est. Arida quidem  
intemperantia, sicciore, crassioresque hu-  
mida verò, magis tenues aquosioresque  
reddit humores. Igitur quum alui sedimen-  
ta, aquæ, in qua nuper mactata caro ab-  
luta est, similia esse videritis, efficacissi-  
mum inde affecti iecinoris signum elice-  
re nequaquam dubitetis. Ac nominantur  
hepatica, ea præcipue quæ ob imbecillita-  
tem ipsius deficiunt: quippe ad iecoris  
essentiam pertinent huiusmodi affectus. At  
qui didicistis cuiusque primorum corpo-  
rum essentiam ex quatuor qualitatû con-  
stare temperamento. Sic etiam quum faci-  
sanguinis similia per alumen excrementa de-  
iciuntur, iecur affectum esse coniiciendum  
est. Vt enim tenue & saniosum excremen-  
tum infirmi iecinoris sanguinem creare non  
potentis, ita id quod faci similatur, super-  
assantis sanguinem hepatis indicium est. Ne-



que enim à memoria vestra decedit, quum  
sæpe videritis quosdam, in primis quidem  
sanien & cruenta quædã, dein tractu tem-  
poris crassum, ac melancholicum sangui-  
nem, postremò atram quoque bilem, &  
quidem synceram deicere. Accidit autem  
interdum, vt hic affectus ob frigidam in-  
temperiem citra febrim incipiat, quando  
tenus sanies sanguinis excernitur, deinde  
tractu tēporis, corrupto in viscere sangui-  
ne, febris superuenire solet, quæ tamen ab  
imperitis vsque adeò negligitur, vt laborā-  
tem interdū nequaquam febricitare pu-  
tent, quippe hunc affectum ob inediam ac-  
cidisse existimant. Siquidem quòd nulla sit  
ipsis cibi cupiditas potius, quàm ob medi-  
corum institutum, laborantes à cibo absti-  
nere inuenerunt. Itaque quum interim ni-  
hil excernatur, videaturque laborās omni-  
no liber à febre, balneis eum exponunt, ac  
debitam victus rationem præscribere ne-  
gligūt. Quocirca rursus corruptos cibos al-  
uus deiecit, quos deinde hepaticorum ex-  
crementorū nōnihil sequitur. At nonnulli  
qui ob frigidā intemperiem laborare ince-  
perunt, non solum non perdūt cibi cupidi-  
tatem, verum etiam interdū multo magis,  
quàm antea se esurire aiunt. Calidas verò  
intemperies nūquam comitatur ciborum  
appe



appetentia, sed cibi fastidiū, sitis vehemēs,  
febris insignis, vitiosorū humorum vomitus. Hæc sunt propria hepaticorū acciden- *Gal. lib. 3.*  
tia: sic enim nominari iā dixi eos, quibus *de symp.*  
visceris ipsi<sup>9</sup> vires fuerint imbecilles. Qua *causis.*  
in re vulgus medicorū errās, hūc affectum  
putat esse dysenteria. Inflammationē autē  
alia (vt dictū est) sequūtur accidētia. Quū  
itaq; ambo interdum affectus conueniāt,  
10 vtriūsq; accidentia simul apparere solent,  
quæ in prōp. cu medicū habere oportet. Sic  
enim nō solū laudabūt nos, sed admirabū-  
tur etiam ij, qui opera nostra indiguerint,  
præsertim si accidētia quoq;, quæ aliis mor-  
bis cōmunia sunt, insuper prospexerimus.  
veluti quòd dolor ad nothas costas perue-  
nit, quòd iugulus detrahi videtur, quòd spi-  
ratio parua redditur & frequens. Equidem  
quum primū Romā venissem, magnificē  
10 admiratus est me Glaucō philosophus ob  
huiuscemodi quādam dignotionē. Etenim *Glaucō*  
per viā mihi occurrens, opportunē (inquit) *philoso-*  
aduenisti, iungensq; dextrā dextræ, proxi- *phus.*  
mi sumus (inquit) laborāti, quē nuper vidi:  
itaque oro, vt vnā mecū ad ipsum venias.  
est autē Sículus medicus, quē nō ita pridē  
mecū ambulātem vidisti. Ego verò, quid  
inquā molestat ipsum? Tum ille & copiosē  
admodū & apertē id declarare aggressus.



est. Neque enim adeò erat vafer, vt aliquid me celare posset. Quoniam heri (inquit) & Gorgias & Apelas mihi nuntiauerunt, notiones præsagiaq; edidisse te, quæ ad diuinationem potiùs, quàm ad medicinam pertinere videbantur: cupio equidem periculum facere, non adeò vt tuam experiar doctrinam, quàm vt sciam, num tanta sit in arte medica tum cognoscendi, tum præsagiendi facultas. Interim quum hæc diceret, 10  
venimus ad laborantis ostium, vt neque verbo eius prouocationi respondere, neq; etiam ea quæ sæpenumerò me dicere audiuiſtis, effari possem: quòd scilicet multa interdum nobis feliciter facileq; apparent, interdum verò omnia sunt ambigua: atque idcirco & alteram & tertiam quoque considerationem expectamus. Itaq; in primo statim aditu obuiam nobis venit quidam peluum à cubiculo efferens, continentem 20  
tenuem cruoris sanie carniū nuper matatarum ablutioni haud adsimile euiden-  
tissimum affecti ietioris indicium, qua vix  
dum inspecta, vnà cum Glaucoue ad medicum ingressus sum. Apprehendi itaque ma-  
num in carpo, id est brachiali, quò intelli-  
gerẽ utrũ inflàmatio, an sola imbecillitas  
esset in viscere. Quia verò (vt diximus) me-  
dicus erat: nuper (inquit) à deiectione decubui,

*Affecti ietioris indicium euidetissimum ab excrementis per aluum deiectis.*



10 'bui, itaq; perpēde arterias ob id quòd sur-  
 rexeram crebrius pulsare. Hæc quidē ille  
 dixit, ego autem deprehendi inflāmati-  
 nis indicium. Prospiciensq; ad fenestrā,  
 hyssopū ex aqua mulsā decoctum in olla  
 cōsideraui. proinde cogitaui, medicum se  
 pleuriticum esse putare, dolore videlicet  
 nothas costas infestante, qualis iecinoris  
 quoq; inflāmationibus aliquando accide-  
 re cōsuevit. Hunc itaq; quum sentiret, es-  
 setq; spiratio & parua & crebra, atq; exi-  
 gua tussi infestaret, pleuriticū se esse exi-  
 stimabat. quamobrem hyssopum quoque  
 ex aqua mulsā præparauerat. Intelligens  
 itaq; ego, quòd fortuna viā mihi præbe-  
 ret, qua apud Glauconem clarum nomen  
 adipisci possem, manum eius ad nothas in  
 20 dextro laborantis latere costas detuli, in-  
 dicatoq; loco, dixi eum ibi dolere. Quod *Prædicat*  
 cū ipse fateretur, Glauco ex solo arteria- *Gal. corā*  
 rum pulsu existimans me sedem affectam *Glaucone*  
 inuenisse, planè admirari me cœpit. Verū medicum  
 ut vehementius stupe- *quēdā nō*  
 di: Quemadmodum hoc in loco dolere te *pleuritide*  
 cōfessus es, ita velim fatearis, etiā tussien- *(ut puta-*  
 di cupiditate vexari te. etenim ex longis *bat) sed ie*  
 iteruallis tussis exigua, arida, & qua nihil *coris affe-*  
 expuis, molestare te solet: atq; ita me dicē *Et in labo-*  
 te incepit fortē fortuna huiusmodi quadā rare.



tussis specie (qualem iam diximus) tussire: qua de re tanta admiratione Glaucō cōmorus est, ut cōtinere sese non valens, magna voce exclamādo, in laudes meas prorumperet. Tum ego: Nō putetis (inquam) sola hāc ex arte posse praeſagiri. Sunt enim alia quoque, quae nunc dicere aggredior, quibus & laborās ipse testimonium feret. Itaque rursus incipiens dixi: Quum magnam trahis spirationem, dolor ea parte 10 quam notaui, vehementius te cruciat, sentisq; in dextra praecordiorū parte gravitatem. His audiris, ne infirmus quidē sese potuit cōtinere, quō minus prae vehemēti admiratione, vnā cū Glaucone exclamaret. Itaq; sentiēs equidē arridentem mihi fortunam, de iugulo quoq; , quōd videlicet ad inferiora trahi videret, aliqd efferre volebam. At quia magnas inflāmationes, quemadmodum & scirrhum, id comitari solet, dicere non sum ausus, veritus ne laudē quam antea de me excitauerā, fauciarem. Quumq; animum induxissem tutō me aliqd eloqui oportere, aspiciens laborantē, haud ita multō post (inquā) iugulū ad infernas ptes detrahi senties, nisi fortasse id iam antea tibi euenerit. At cū hoc quoq; fateret, conuersis equidē oculis ad aegrotantē mirificē attonitum, vna (inquam)



(inquam) addēda est prædictis diuination.  
Etenim dicam, quam de morbo suo labo-  
rans ipse habuerit suspicionē. Tum Glau-  
co, ne de hac quidē diuinatione desperare  
se aiebat. Laborans autem incredibili hac  
pollicitatione in stuporē adductus, & acri-  
ter me intuēs, quid essem dicturus attenta  
mente expectabat. Igitur dicēte me, quod  
infestantem morbum pleuritidem esse pu-  
10 tasset, ille ingenti cum admiratione huius  
quoq; rei se testem exhibuit: id quod etiā  
affirmabat ex astantibus vnus, qui paulò  
antè latus eius ex oleo fouerat. Atque ex  
eo tēpore Glauco tum de me, tum de vni-  
uersa arte quā optimam concepit opinio-  
nem, quū antea nihil magni ab arte expe-  
ctaret, vtpote qui nunquā cum consumma-  
tis in arte viris versari consueuisset. Hæc  
ideò dicere volui, vt intelligatis quæ acci-  
20 dentia cuilibet morbo propria sint, & quæ  
aliis quoq; morbis communia, ac præter-  
ea quæ ab utrolibet genere sint insepara-  
bilia. Itē quæ magna ex parte & quæ rarò  
videri solent, atque ea quæ ancipitem ha-  
bent euentū, vt si aliquando fortuna hu-  
iusmodi vobis occasionē qualē mihi fuis-  
se oblatā iam dixi, præbeat, ea commodè *Fortuna*  
vti sciatis. Sæpe enim fortuna non contē- *non contē*  
nendā adipiscendę laudis ansam suggerit, *nenda.*



Natura-  
les facul-  
tates.

ea tamē vulgus medicorum ob imperitiā  
viti nescit. Quanquam doctissimus quisq;  
quum accidentiū aliquod huiusmodi cō-  
spexerit, haud difficulter reliqua quoq; in-  
ueniet: quorū alia quidem necessariō, alia  
verò magna ex parte, & locū affectum, &  
morbum ipsum sequuntur. Verū memi-  
nisse debetis generalia praeceptorum, quae  
& vniuersalia appellantur, & quae multo-  
rum specialium cōmunia genera sunt, ut <sup>10</sup>  
ea in particularib<sup>9</sup> prouidē discernere di-  
scatis. Est igitur cōmunis sermo, quem in-  
uenire proposui, de naturalibus facultati-  
bus, quas in qualibet pte generatim qua-  
tuor esse didicistis: Primā voco attractri-  
cē, quē peculiares parti succos alēdi ipsam  
gratia, & appetere, & attrahere potest. Al-  
tera deinde est, quē alteratrix dicitur, qua  
succus attractus similis euadit parti quae  
alitur. Huic aliae duae ministrāt: Retērix, <sup>20</sup>  
quae suo munere fungitur, quando pars  
attractum succum coquit, donec in suam  
ipsius naturā eū mutauerit: Et expultrix,  
quādo à coctione, quod inutile est, excer-  
nit, idque excrementum vocatur. Has ita-  
que facultates in qualibet affecta pte vtrū  
validae sint, an infirmā, cōsideretis hortor:  
ut in hepate, quoniā de hoc dicere institui-  
mus, vis attrahendi si quomodolibet affi-  
cia



ciatur, cibum in vetriculo iam in succum  
transmutatū relinquet, vt per aluum exa-  
cte confectus, liquidus, & haudquaquam  
exiccatus excernatur. Atq; hoc quòd ipsa  
affecta sit, signū vobis erit. Quicqd enim  
ab aliquo tanquā à causa procedit, id etiā  
illius signum esse constat. Hunc affectum *Meseraici.*  
nonnulli ad mesaræum pertinere autumāt, *ci.*

10. vocantque sic laborantes meseraicos, eò  
quòd vident cibum per venas mesaræo &  
mesenterio intextas, distribui, vt solebat,  
non posse: eodē seducti errore, quo ij qui  
manus eorū, quos syncopa, vel stomachi-  
ca, vel cardiaca pstrauit, affectas esse arbi-  
trantur: vtpotē quæ haudquaquam, vt an-  
teā, munere suo fungantur. Quippe iecur, *Vene me*  
mesaræi venis, veluti manibus, quæ ex vē- *seraica*  
triculo ei cibum afferant, vtitur. Similiter *quid con-*  
etiā falluntur nonnulli, vbi crura resoluta *ferant ie-*  
20 sunt, ob affectū aliquem, eam spinæ par- *cori.*

tem, quæ iuxta lūbos est, infestantē. quip-  
pe neglecta spina, cruribus remedia adhi-  
bēt. Igit si mesenterium vel inflāmatiōe, vel  
alio eiusmodi affectu laboret, hūc propriē  
ad ipsum referemus: si verò iecur ob imbe-  
cillitatē per venas suas cibum allicere ne-  
queat, nō mesenterio (id est lactib⁹) sed ie-  
cinori, remedia sunt adaptāda. Quēadmo-  
dum ne resolutis quidem vel manibus, vel  
cruri



*Mesente-  
rii inflā-  
matio.*

cruribus, ob affectū qui in spina consistit. Verūm ubi vel inflāmatio, vel erysipelas mesenterium afficit, haud ita difficile est discernere, si alui excremēta diligēter consideres. Neque enim solūm qualia excerni diximus in iecinoris imbecillitate, quū ad sese cibū trahere non potest, talia planē deiiciunt: sed apparet etiam, veluti ab inflammatione, sanies quādam admixta. Nam ab omni parte inflammata, cui spissum, crassumq; tegmen non incumbit, in primis quidem tenuis sanies defluit, quæ, concocta deinde inflammatione, & crassior, & puri similior redditur. Quum ergo nulla existēte in iecore inflāmatōne, huiusmodi quippiā, cum excrementis succi speciem consequutis deiicitur, in mesargo affectum esse censendū est. Igitur ut non potente ob imbecillitatem hepate succū a ventriculo attrahere, attrahendi facultas afficitur: ita quum retinere nequit, cōprehendens, continensq; facultas, infirma putanda est. Proinde in primis quidē cruorē saniosum excerni videmus, postea verò crassum, & faculentū. Similiter aliæ quædam eueniunt excretiones, non quidē ob imbecillitatē, sed ob expultricis facultatis robur, ratione plenitudinis, & quidem sæpenuerò integra etiamdū constante valetu



letudine. Sic plerunq; pars aliqua, quum  
 affecta est, per hepar purgat, viribus ipsius  
 iam factis robustiorib<sup>9</sup>, quippe cōcoctis in  
 ipsa vitiosis humoribus, sequit<sup>r</sup> excretio, *Ordo na-*  
 sed ita sequitur, vt vtilis humores retineā- *tura.*  
 tur, expellantur verò inutiles. Atque sunt  
 nonnulli qui huiusmodi vacuationes nomi-  
 nent cruētas dysenterias: quæ euenire so- *Cruenta*  
 lent quibusdā, vel mutilato aliquo mem- *dysente-*  
 10 bro, aut vbi q<sup>s</sup> in exercitatione educatus, *ria.*  
 ad ociū se conuerterit. Ac solet quoq; mu-  
 licibus retentis mēstruis huiusmodi per  
 sedem vacuatio fieri. Atq; interdū per vo-  
 mitum quoq; eandem ob causam quibus-  
 dā mulierib<sup>9</sup>. Verūm his syncerus sanguis  
 excernit<sup>r</sup>, similis ei qui ab hostia interfe-  
 cta p<sup>r</sup>fundi consuevit, modò infernè p<sup>r</sup> al-  
 num, modò per superiores etiā partes. At  
 per crysipelata, & inflāmationes, acceden-  
 20 te cōcoctione, vitiosus, cœnosus, & putris,  
 deiicitur. Atque vt in hepaticis affectibus  
 (quāquā rarò) medicamentorū auxilio,  
 robustiore euadēte iecinore, interdū dei-  
 ciūtur excremēta, tum colore, tum odore  
 pessima, purgato ita viscere: sic eodē mo-  
 do vrina quoq; deteriores reddūtur, qui-  
 bus imperiti Medici nonnunquā decepti,  
 grauis morbi periculū subesse arbitrātur.  
 Etem quib<sup>9</sup> sine ratiocinatione, rudis dū-  
 taxat



taxat experientia suffragatur, de his quæ  
rarò eueniūt experimēta habere non pos-  
sunt, veluti eorum quæ sæpenuerò acci-  
dunt facilè meminerunt. Quòd autē pro-  
tracto per longum spaciū morbo, appa-  
rentibusq; notis concoctionis, huiusmo-  
di fiant euacuationes, non semel dūtaxat,  
imò creberrimè, ex enarrationib⁹, quas in  
Hippocratis opera edidimus, didicistis.  
Igitur quæadmodū retentrix facultas quū  
imbecillior est, ac rem quæ ipsam grauat,  
retinere nō valet, vis expultrix id q̄ mo-  
lestat euacuat: ita infirma expultrice, res  
quædā retineri solēt, facultate retētrice nō  
admodum grauata. Nam in quolibet in-  
strumento, aliàs alia facultas, vel fortior  
fit, vel imbecillior, facta videlicet ad actio-  
nē relationē: si modò vniuscuiusq; faculta-  
tis rationē intellexerimus. Nam reuerato-  
ta semper particula, secundū temperamē-  
ti quod ei frequētius inest, agit propieta-  
tem. Verū aliquando rem grauante su-  
stinet, ac longo temporis tractu eā vincit,  
conficit, alterat, & cōcoquit: deinde rursus  
alio tempore, rei infestantis vel qualitātē,  
vel multitudinem ferre nō valēs, ad ipsius  
excretionē insurgit. Sicut ecōtrariò, quum  
interim admodum molestatur: ipsam rem  
molestantem deicere cupiēs, viribus gra-  
uiss.



uissimè prostratis, ob imbecillitatē id effi-  
 cere non potest. Igitur hæc omnia in quo-  
 uis naturali instrumento perpendere, atq;  
 mentē in ipsis dignoscendis exercere de-  
 betis. Sic enim inuenietis partium quarun-  
 dā affectus, antea haudquaquā indaga-  
 tos, veluti ne folliculi quidē fel continen-  
 tis. Si em̄ (vt ostēdimus) biliosum humo-  
 rem ad se trahit, quemadmodū renes vt  
 10 sanguinis serū, aut splen, id quod vini fa-  
 cibus, aut amurcæ similatur: accidit inter-  
 dū, vt ob huius folliculi imbecillitatē, im-  
 purus fiat sanguis, atque idcirco alia eue-  
 niat regij morbi species, præter eas tres  
 quas iā suprā pposuimus. Ac nōnunquā  
 ita repletur etiā (quēadmodū vesica quæ  
 vrinæ est conceptaculū) vt euacuari non  
 possit, aut quia obstruct⁹ est, aut quia se-  
 cretoria ipsius facultas est imbecillior.  
 20 Veluti etiā, quū obstructis, aut infirmis, va-  
 sis, quæ ab ipso exorta, ora sua in hepar ex-  
 tendūt, biliosum humore interdū attrahe-  
 re nō potest. Proinde excrementorū pro-  
 prietatem in morbo regio cōsiderare, per-  
 quā necessariū est. id enim non medio-  
 cre nobis ad huiusmodi notitias auxiliū  
 suppedabit. Hæc equidē considerans in-  
 ueni quorundā regio morbo affectorum  
 excremēta, flaua bile vehemētē colorata,  
 limi

Excremē-  
 torū confi-  
 deratio in  
 morbo re-  
 gio.



similiter etiā & vrinas: item per cutē quoque, vt nonnullis plurimū flauæ bilis à balneo profundi, ita aliis plurimū ipsius retineri, ac perquā exiguū effundi comperimus. Hanc rē si accuratiori experimento intelligere volueritis, nulla prius adhibita vnctione, homini sudorem strigili auferri iubete: videbitis profectò nō eodē modo in omnibus, strigilis concauitatē impleri, vtpotē quod in aliis magis aquosum, atq; 10 in aliis magis biliosum est. Itaq; loci affecti notitia vobis multò erit dilucidior, si cū prædictis, hāc quoq; notitiā adiiciatis.

*Morbus  
regius post  
febrē acu.  
tam suc-  
cedens.*

Quidā enim acuta biliosaque febre laborans, die septimo multa flaua bile ad cutē transmissa, à morbo liberatus est, māsītq; sequētibus deinde dieb' auriginosus. Itaque & excrementa, & vrinas considerauimus: vtriusq; verò secundū naturā se habēribus, atq; ob eā causam nullū visceris affectum declarantibus, venit in mentē, fieri posse, quòd translata in cutem bilis crassior esset, qua ratione p̄motus, discere volui qualisnam esset sudor: illo autē apparente aquoso, conieci bilem esse, dissipari contumacem, præcepī itaque laboranti, vt aqua suapte natura calida, & cui discutiēdi vis esset, vteret, ac prætereā victū adhiberet humidiorē, qui humorum crassitudinem 200



dinem moderatè posset extenuare. Hic au-  
 tem bonam valetudinem cōsequutus est,  
 vnico auxilio, & notitia cōfirmata, & cu-  
 ratione absoluta. Quinetiā alium multā  
 in strigili bilem relinquere vidimus, vnde  
 eā plurimā in vniuerso corpore procreari  
 perpēdentes, ipsum adhibita idonea cura  
 tione sanauimus. Quibus verò citra fe-  
 brim morb<sup>9</sup> regius accidit, vrgēte in de-  
 10 xtra præcordiorū parte grauitatis cuius-  
 dā sensu, iis oībus aperiēs (vt scitis) obstru-  
 ctiones, & cibis & potibus & medicamen-  
 tis extenuātibus, deinde medicamentum  
 qđ bilem ducere posset exhibēs, eorū plu-  
 rimos vna die sanitati restituiimus. Qui  
 verò purgatione liberari nō potuerūt, iis  
 rursus valētiorē ad aperiendū data potio-  
 ne, medicamentū quod vehemētius pur-  
 garet, exhibui. Sic deinde sub fine purga-  
 20 tionis, vel cærulea, vel flaua bilis, cū acri-  
 mordacitate secernebat. In iis cōieci fel-  
 lis folliculū, simili quopiam affectu labo-  
 rare, qualis in vesica exuberāte vrina in-  
 terdum fieri solet. etenim adeò multam  
 nonnunquā recipit, vt nimis intēta ne-  
 queat eam quæ in ipsa continetur, expel-  
 lere. Verū in vrinæ receptaculo (neque  
 enim absurdum fuerit, vesicam ita nomi-  
 nare) bifariam id fieri solet. Interdum ob

*Morbus  
 regius ci-  
 tra febrē  
 quomodo  
 curatur.*

*Folliculi  
 fellis imbe-  
 cillitas*

*Vesica af-  
 fectus ob  
 imbecilli-  
 tatem.*



excretoriae facultatis imbecillitatem: Interdum vel ob grauem somnum, vel negotia quæpiam, retentâ vltra quàm par est vrina: quæ deinde vesicam nimis intēdēs, hac ipsa ratione vires eius prosterne re potest. At fellis folliculus, vtpotē cui nullū succurrit ab animali facultate præsidium, vnicum habet imbecillitatis principium, veluti cætera quoque naturalia instrumenta, à partis interie or-  
tum.

LIBRI QVINTI

FINIS.



CL. GALENI DE  
AFFECTORVM LO-  
CORVM NOTITIA.

LIBER VI.

\*

Hoc postremo libro absoluit artem qua è no-  
tis lienem affectum, ventriculum, intestina, re-  
nes, vesicam, uterum & colem intelligas.

De affectibus lienis. CAPVT I.



X iis quæ de iecinore diximus,  
facile inuenientur notæ, quibus  
lienis affectus discernatur. Hoc  
addito, q̃ ipsius inflammationes  
ob duritiæ, facile tangendo deprehendan-  
tur. Quum itaq; splen multa habeat acci-  
dētia cū hepate cōmunia: illa, nulla re dif-  
ferre videntur, nisi quòd quædam magis,  
quædam verò minus, alterutri cuenire so-  
lent. Nā quod ad coloris rationem perti-  
net, vniuersum corpus, vbi splen imbecil-  
litate affectus est, magis nigricare videt̃.  
Nā hoc ei natura officiū dedit, vt melan-  
cholicū sanguinē ex hepate ad sese attra-  
hat, quo ipsum ali iam demonstratū est. Igi-  
tur attrahendi facultate facta imbecillio-  
re, sanguis ex iecore in vniuersum corpus

Nota qui-  
bus discer-  
nantur lie-  
nis affe-  
ctus.

Officium  
lienis.

X 2



impurus transmittitur, quocirca color nigrior euadit. Quinetiam hepatis exēplo, sæpenuerò excremēta quædā ex se reii-  
cit. Itaque vomitione, cui nausea quoque

† ἀθυμία accedit, melancholicū sanguinē excernit:  
 τε καὶ ἐν- qui interdū per inferiora quoque decede  
 σθυμία re videtur. At huiusmodi vacuatione sup-  
 μελαγχ- pressa, nōnulli † mœstitia melācholica ve-  
 λινὰς. xantur, atq; cibos auidiſsimè concupiscūt:  
 † ἀνατροπὴ idq; præcipuè si valde fuerint acida, quæ 10  
 πρὸς τὸν ad ventriculū transferuntur excrementa.  
 ὑπερίσκιον. Quanquā nonnunquā † euerſa deiecta q;  
 Quid, ἀ- quadam vrgente ipsum, affectionū diffe-  
 νατροπὴ rentia. Quòd verò indurato ipso, aqua in-  
 quid ὑπο- ter cutē succedere possit, cōsentiente ieci-  
 τισμὸς, nore, iam antea dictū est. Quinetiā labo-  
 qua q; eo- rante aliquando utroque viscere, regium  
 rñ causa morbum euenire conspeximus, nigriore,  
 8. de cōpo quā pro consuetudine, subsequēte colo- 20  
 fitione me re, ita ut putaretur flaua bilis fulgini esse  
 dicamēto- permixta, atque medici quidā iecur nullo  
 τὸ κατὰ affectu tūm laborare existimantes, dubi-  
 τόπῳ. tant quomodo à splene morbus regius na-  
 Morbus sci possit. Quēadmodum sunt, qui à solo  
 regius ex liene indurato, nullo existēte in iecinore  
 affecto lie vitio, aquā inter cutē fieri posse arbitran-  
 ne & ie- tur. Haud secus hallucinari cōsueuerūt, in  
 core. ea quoque aquæ inter cutē specie, quæ ad  
 acutos



acutos morbos sequitur. quippe ab iis iecur, calida, & sæpenumero sicca quoq; intemperie tā grauius afficitur, vt cibum in sanguinem transmutare nequeat. At q ne in iis quidē iecur affici existimant: ab Erasistrato accepta cōsuetudine, vt nullā partem affici arbitrētur, nisi vel tumor quispian, vel vlcus in ipso cōsistat. Verūm id illis concedendū est, qui existiment nullū  
 10 ab intemperie morbū fieri. At Medici qui sequuntur ea, quæ manifestē apparēt qui & refrigerata parte quapiā: accidētia quēdam fieri suspicantur, admiratione digni sunt, quōd aquā inter cutē consistere posse putant, ne vnico quidē loco affecto. Si enim ob id, quōd nullus est in hepate tumor, ipsum haudquaquā affectū esse existimant: neque aliarum partiū vlla afficitur, in his qui aqua frigida vitiosa epota, *Aqua vitiosa frigida potio.*  
 20 mox aqua inter cutē corripitūtur: quippe noxam infert internis partibus aqua sic ingesta, aliās aliis, sed præcipuē & in primis ei, quæ fortē fortuna eo tēpore reliqs fuerit imbecillior. Verūm nisi ad iecur frigus transmittatur, aqua inter cutē subsequi potest minimē. Sic splenis quoque vitio aqua inter cutē nonnunquam euenire *Splenis vitio, aqua intercutē.*  
 cōsuevit: aut vbi cū tumore refrigeratum est, sicut in scirrhis, aut vbi citra tumore



*Melancholica mœstitia ab affectu lie-  
ne.*

refrigeratum est, ut quum quis aquam frigidam, & vitiosam, affatim & importune potauerit. Quod verò melancholica mœstitia, ipso huiusmodi excrementa ad os ventriculi transmittente, proueniat, antea, ubi de ore ventriculi tractauimus, iam dictum est: quãobrem in hoc viscere diutius nobis immorandum non est: cum eius instrumentales affectus rationali dignotione non indigeant: qui verò ab intemperie proficiuntur, partim ex his quæ iam diximus, partim ex ea doctrina quã supra de ictere proposuimus, noti sint. Nam alij quidem nominatim sunt explicati: alij verò qui similiter ut illi consistunt, simile quoque habebunt dignotionem.

*De ventriculi & intestinorum affectibus.*

CAP. II.

*Partes ventriculi.*

**Q**Uum de ventriculi affectibus, superiore libro loqueremur, in duas maximas ipsum partes secari diximus: quarum altera quæ superior est, gulæ continua est, ex multis nervis sensificis cõtexta: altera verò huic cõtina, ad intestinorum usque exortum extenditur. Porro sicut vtraque in animalibus proprio munere fungitur, ac pro utilitatis differentia diuersa eis eueniunt accidẽtia: ad eundem modum quicumque affectus cõmuniter tum similaribus, tum in-

stru



strumentalibus partibus aduenire solent,  
 ij etiā iis, tū inter se, tūm etiā cum vniuer-  
 sis intestinis, cōmunes esse censentur. Ve-  
 rūm accidentiū similitudo, non solūm in  
 iis inter se, sed etiā in vicinis quoq; parti-  
 bus, quæ ipsa attingunt, inuenitur: qualis  
 est renū, & coli cōmunicatio: atq; horum  
 nōnulla sedem affectam habent cognitu  
 facilē, vt dysenteria, & tinesmus. Sanè in  
 20 præsētia nomē dysenterix propriè audi-  
 re oportet, vtpotē quod ex appellatione  
 ipsa, intestinorum vlcus significat. Neque  
 enim repente & affatim fit huiusmodi af-  
 fectus, id quod in eo quē hepatis vitio ac-  
 cidere dixim⁹, fieri solet, atq; pprias etiā  
 habet notas. Etenim protinus ab ipsi⁹ ini-  
 tio, bilis mordax secernit⁹, quā deinde inte-  
 raneorū abrasiones sequunt⁹, postea paulū  
 cruoris simul excerni videtur, quādo vide-  
 20 licet affect⁹ ipse iā dysenteria esse censet⁹.  
 Quū itaq; huiusmodi abrasiones solē ex-  
 cernūtur, cōsiderandū est, nū pingue quip-  
 piam simul cū ipsis deiciatur, ita enim in  
 crassis intestinis vlcus cōsistere credendū  
 est. Vbi verò cruorē quoq; excerni vide-  
 ris, intueri oportet utrū is reliquis excre-  
 mentis ita sit admixtus, vt vniuersus mi-  
 sceatur vniuersis, an pars ei⁹ aliqua reliq; s  
 supernatet, etenim si admixtus est, in su-

Dysente-  
 ria ppriè  
 vocata.

Excreme-  
 torū in dy-  
 senteria  
 cōsideran-  
 tio.



perioribus: si verò supernatat, in humilio-  
ribus intestinis vlcus esse portédit. Ac idé  
quoq; in abrasis excremétiis videre est, ve-  
rùm non ita manifestè vt in cruore. Simi-  
lis etiã si ramentū excernatur, ratio est. nã  
& ipsa, quòd intestinū fuerit oblæsū de-  
clarant: tum ab essentia propria, tū ex mo-  
do, quo vel cōmisceri reliquis excremétiis  
vel vni eorū parti supernatare videntur.  
Caterū nō mediocriter conducit ad cu-  
rationem, nosse in qua intestinorū parte  
consistat vlcus. Nã si in superioribus inte-  
stinis est, ab epotis medicamētiis præsi-  
diū petendū est: si verò in humilioribus, cly-  
sterem subiicere magis cōuenit. At huius-

*Dysente-* modi dysenteria, ab his quæ ab hepate  
*ria hepa-* profluunt, ita discernūtur: Nam ab initio  
*tica signa* tenuis sanies sanguinis ab hepate deiici-  
*De excre* tur, deinde aucto malo, crassus humor, fæ-  
*tionibus* cibus vini haud absimilis. Prætereà q̃ in  
*quas w i-* hepaticis excretionib' nihil abrasum ex-  
*giwlvq̃s* pellitur, atq; interdū duorū aut triū dierū  
*vocauit* interuallo, supprimitur euacuatio. deinde  
*Hippo-* rursus redit malū, atque excernuntur ex-  
*crates pri* crementa prioribus multò peiora. id verò  
*mo Pror-* per intestinorū vlcera haudquaquam ap-  
*re. Gal.* paret, quippe in his neq; affatim neq; ex  
longi temporū interuallis, laborātes de-  
iicere consueuerunt. Atque vlcera quæ in  
recto



recto intestino oriūtur (tinesmum vocāt) *Tinesmus*.  
vehementi quidem tensione, & prompta  
deiciendi cupiditate infestāt, paucis ad-  
modū sequentibus excremētis, quæ quidē  
ab initio pituitosa & pinguis, progressu  
verò tēporis etiā ramenti specie deliciun-  
tur: sed per totum morbi spatium, iis quæ  
à supernis descēdunt, haudquaquā misce-  
ri vidētur. Scribunt nonnulli quòd à forti  
10 excernēdi conatu, præcedēte dolore vehe-  
menti, aliqui lapides callosos deiecerūt, *Lapis ex*  
iis qui in vesica nascūtur haud absimiles: *ano per ti*  
id quod ego neque vidi, neque alium qui *nesmū cie*  
viderit vnquam audiui. Sed coli vehemē-  
tem dolorem sæpenumerò cōspexi, medi-  
cis illū non ad colum, sed ad renes perti-  
nere putantibus. veluti renum quoq; cru-  
ciatus, ad colū referre videntur. Sunt qui  
omninò negent in sinistris partibus, coli-  
20 cam dispositionē euenire posse. Igitur ut  
ab initio, horū affectuum distinctio diffi-  
cilis est, ita hoc tempore, non ita magnā  
præsidiorum differentiam ipsi requirunt.  
Itaque accidentia, quorum magna est in *Colicū af-*  
his affectib⁹ copia, diligēter intueri oportet. Nam & nausea & vomitus vrgent, sed *fectū quo-*  
30 tēt. Nam & nausea & vomitus vrgent, sed *modo di-*  
multò grauiiores & magis assidui, dolēte *scernas à*  
colo. Euomuntq; ita laborātes, pituitosa *nephriti-*  
quædam atq; corrupta, hac in re nephriti- *de.*



cos longè superantes, ac retinent etiã magis excremẽta, vt ne flatũ quidem neque etiam ructũ, excernere possint. Sæpenumero etiã veluti circuire videtur dolor, atq; plurima loca occupare, qui modò in hac, modò in illa parte vehemẽtior fit: nephritici verò dolores, eodem in loco stabiles, iugiter infestant. Quũ itaq; dolor in loco fuerit renib<sup>9</sup> altiore, manifestũ colicę indicium portẽdit. Si verò in vno loco, vbi sci licet renes ponũtur, stabilis cõstiterit, nihil ad notitiã potest positus ipse cõferre. proinde cũ his notis, quas nuper percurrimus, vrinæ quoque considerandę sunt. Nã nephritici, ab initio dilutas, purasq; reddunt vrinas, deinde sequẽtibus diebus, inæquale aliquid in ipsis subsidere videtur. Demũ omninò arenosæ mingũtur. At in colica, si quid ab aluo deiicitur, id flatuosum quodãmodo est, & sæpenumero aquę supernatare cõsuevit, similẽ habẽs bubulò stercorei consistentiã. Quinetiã colicorum cruciatus multò magis quàm nephriticorũ, laxantibus mitigatur clysteribus. Atque euenit interdum, vt frigidus aliquo humore simul eiecto, illico quiescat, eritq; mitigans præfidiũ, nõ mitigans tantũ, sed etiam curatiuũ & diagnosticũ. Porro vt hi frigidum humorẽ aluo excernente,

ita

*Nephriticorum si-  
gna, quan-  
tum a co-  
licis differant.*



ita nephritici cū vrina lapide exeunte, & à dolore liberantur, & simul locū affectum ostendunt. Itaq; nihil relinquitur, nisi vt prouideatur, ne postea tā facile affici possint. Nā vt perseverāte dolore, vtraq; pars eisdē indiget præsidiis, ita tempore subsequente oportet diuersa auxilia adhibere. Quapropter nullū, quod ad curationis rationem pertinet, cōmitteris errorem, si in

10 prima protinus horum morborum accessione, eos difficulter discernatis, eò quòd tū neq; extrinsecus, neq; intrinsecus, differētib<sup>9</sup> egēt auxiliis, quòd satis sit, ea q̄ dolorem lenire possint, adhibere. Cū autē *Intestino-*  
omnia intestina à vētriculo ordine quodā *rum ordo.*  
descendant atq; omniū supremū ieiunum sit: deinde quod tenue vocatur postea cecū, quod vsq; ad infernas partes extēditur: deinde colū, quod ad superiores reuertit<sup>r</sup>

20 partes, donec sæpenuerò & lienē, & iecur attingat: satis mirari nō possum, quomodo nō solū Medici ferè oēs, sed etiam populares, vehemētissimos quosq; dolores, in quacunq; parte euenerint, ad colum referant. Id quod mihi quoq; verisimile visum est. Sed quum causam quærerē, cur tam vehemēs, tamq; perseverans esset dolor, nō simpliciter huic assertioni credere potui. Neque enim similiter, vt in renib<sup>9</sup>,  
atque



*Tenuiorū  
intestino-  
rū dolor.*

*Sublimio-  
rum inte-  
stinatorum  
dolores.*

*ut Diocles  
Charistius  
qui ῥόγδα  
ῥον inte-  
stini tenui*

*oris morbum,*

*ideoq;*

*verò plenioris,*

*aliq;*

*contra eius acciden-*

*tia ex tertio*

*πιδ. licet colligere in historia mulieris, que apud*

*Tifaneum laborabat. Cor. Cels.*

atq; vtereris, impacto lapide, ingentes do-  
lores in tráfitu excitátur, sic & in tenuibus  
intestinis, rationi consentaneum esse cēse-  
bis, frigidus spiritus retētos, atq; similesiis  
humores dolorē in ipsis efficere. Nam te-  
nuium intestinorū tunica, rara tenuiq; ef-  
sentia cōstant, vt nō ita diu huiusmodi cau-  
sas cōtinere possint. Ergo probabile est, fri-  
gidum, eūdemq; crassum, aut viscosum hu-  
morē, aut flatuosum spiritum, in corpore  
crasso densoq; genitū, sed egredi nequeun-  
tē, dolorē excitare: vehementem quidem,  
geminam ob causam, intemperantiam, &  
corporum quibus cōtinetur tentionē: lon-  
gum verò, quia difficulter vacuatur. Nam  
corpora ambientia, tūm ob crassitudinem  
tūm spissitudinē, ipsum arcere possunt. At-  
que interdum alij quoq; dolores, & quidē  
vehementissimi in sublimiorib<sup>9</sup> intestinorū  
partibus eueniūt, grauiter vomitionibus  
cruciantes, adeò vt nōnulli sub fine, stercus  
quoq; euomere cōspiciantur, à quo affectu  
vix vnquàm aliquis potuit sanus euadere.  
hunc ἰλεόν (id est voluulum) vocāt: nonnul-  
li etiam chordapsum, quum scilicet tumor  
oris morbum, ἰλεόν verò plenioris, aliq; contra eius acciden-  
tia ex tertio πιδ. licet colligere in historia mulieris, que apud  
Tifaneum laborabat. Cor. Cels.

aliquis



aliquis eminet, in tenuium intestinorū parte, vt videatur intestinum ad chordę similitudinem conuolutum. Itaque non ab re visum est Medicis antiquiorib<sup>9</sup>, vel ab inflammatione vel obstructione aridi stercoris. huiusmodi tenuiū intestinorū affectus oriri. Sūt alia quoque accidētia, quę quidem haud absurdē, & intestinis, & ventriculo, simul affectis euenire credūtur, vt quas *λεπτα*

- 10 *τερίας* (id est læuitates intestinorum) & *νοιλιανάς* (id est ventrales dispositiones) nominant: quū videlicet materię nequaquā sunt mordaces. Nam vt mordaces, ob mordēdi vim, omnia intestina ad excretionem excitant: ita non mordaces intestinorū imbecillitatem sequi consueuerūt: quia retinere contenta, ne exiguo quidem tempore possunt. Siquidē illicò excernunt ea, perinde ac si graue aliquod onus deponerēt.

*Cæliaca  
dispositio.*

- 20 Haud secus quā in stranguria contingit. Nam & in hac modò ob acrimoniā, & vellicationē, vesica iugiter, quicquid ad eam peruenit, secernit: modò ob id quod molē ipsius vel exiguā, sustinere nequit. Cæterū à quibus causis intestinorū læuitas proueniat, alibi particulatim ostēdimus, præter ea quę in libris de Curādī via & ratione, de Naturalibus facultatib<sup>9</sup>, & de Accidētīū causis, iā dixeramus. Etenim hunc librum

*Strangu-  
ria.*

non



non incepimus, vt causas quę morbos efficiunt, sed vt affectorum locorum, qui & tactus & visus iudicium effugiūt, notas perstringeremus. At quia ad exactā horū notitiam, etiam de ipsis dispositionibus interdū aliquid dicere coactus sum, idcirco de causis quoque, quę ipsas efficiunt, mentionem facere nō sum grauatus. Itaq; sermōni de intestinorum affectibus finem imponamus. Sūt enim in ipsis affectus quidā cō-  
 10 gniti faciles, qui scilicet cū prædictis cōmunes habent notas. Nam abscessuū, inflātionum, scirrhorum, inflationū, erysipelatum indicia, omnibus cognita, quum in ventriculi locis apparēt, & affectus ipsius atq; simul affectæ sedis notitiā ostēdunt. Sed de iis iam antea satis dictum est.

*Nephriti*

*De renum affectibus.*

CAP. III.

*eus dolor.  
 Nausea  
 multitudo & magnitudo,  
 colicum  
 affectum  
 à nephriti  
 de distin-  
 guit.*

**I**gitur cūm derepentē nephritis incidit, lapide notatu digno, vel in renum aliquo, vel in vreteris impacto, dolorem excitat, colico haud absimilem. Verūm distinguitur ab eo, ex nausea tūm multitudine, tūm magnitudine. Suntque per vomitum reiecta & biliosa, & pituitosa, quibus præassumpti quoq; cibi aliquid admixtum videtur: sæpenuerō etiam ex loco, quum superiores coli partes afficiūtur. Arque ex  
 20  
 eo



eo interdum, quòd non vni loco dolor in-  
 nititur, sed reuoluitur, & ad plurimas extē-  
 ditur partes. prætereà quòd ne flatus qui-  
 dem transmittitur. Atque omnia hæc coli-  
 cis duntaxat euenire solent, sed alia qui-  
 dem magis, alia verò minus. Quum verò  
 ex his quæ in vrinis resident, aut lapide cū  
 vrina excreto, planè discerni possūt nullus  
 relinquitur quæstioni locus. Sunt non pau-  
 10 ci laborantium, qui dolorem modicum in  
 profundo lumbrum infestantem sentiunt,  
 quamuis ab initio nondū sabulosum quip-  
 piam manifestè excernatur. Quibus (vt sci-  
 tis) dato medicamēto, quod lapidem in re-  
 nibus conterere posset, simul & affectum  
 ipsum, & sedē affectam cognouimus, atq;  
 ipsum habuim⁹ curationis principiū. Quū  
 enim à medicamento potione, in vrinis sa-  
 bulosa quædā subsidere conspicerē, nephri-  
 20 ticum affectū esse cognoui: atq; deinceps  
 eadem medicamenta exhibēdo, reliquam  
 perfecī curationem. Quumq; renē quem-  
 30 piam ita affectum esse cognoueris, si dolo-  
 res cum horrore interpolato, variòque in-  
 festare videātur, sequaturq; febres quædā  
 inordinatæ, tum prouum in ventrem de-  
 cumbere, atq; interdū in alterum latus, vt  
 sublimis sit affectæ partis positus, laboran-  
 tē sese vertere iube, ac deinde interroga,  
 num

*Renum  
 abscessus  
 indicia.*



num circa renem dolentem veluti suspensi cuiusdā ponderis sensum percipiat. etenim quum hæc ei acciderint, abscessum iā collectum conicere oportet: quo cōcocto: pus miētum, vt laborātem à dolore liberat, ita vlcis in rene periculū affert: proinde exacto studio laborandum est, vt inducatur cicatrice, quod nisi illicò contigerit difficiliorē reddet curationē. porrò perseuerātis

*Vlceris p  
seuerantis  
in renibus  
nota.*

vlceris notæ, ex vrina haud obscurè deprehenduntur. adde quòd laborans creberrimè in affecto rene dolorē sentit, atque interdum cum vrina exiguum pus, veluti ab vlcere excernitur. Similiter ramētum nōn quàm cū vrina expelli videtur. Ac interim sanguis quoque, qui erosi iam vlcis indicium est. Quancūq̃ rupto aliquādo vase, aut ob plenitudinē, aut causam, aut vehementem ictum, nōnulli magnam sanguinis copiam meiēdo profuderūt. Id quod aperto interdum venæ alicuius ore, fieri videre est. Sed efficacissima vlceratorū renum cōiectura est, si cum vrina exiguæ quēdam

*Caruncu-  
le in vri-  
na.*

carunculæ excernātur, vtpotē quas renum essentiaē partes, easq; ob vehementem vlcis erosionem auulsas esse constat. Ea ve-

*Pilis simi-  
lia quadā  
in vrinis.*

rò quę pilis similia sunt, Hippocrates quoque cum vrinis excerni vidit, quemadmodum in Aphorismis scripsit: ac ipsi etiam

vidi



vidimus aliquādo, quæ semipedis longitu-  
 dinem æquarent, interdum etiā iis longio-  
 ra. Quæ nōnunquam adeò videbantur exi-  
 gua, vt mirarer quomodo in renum spacio  
 talia possent cōsistere: proinde probabilius  
 mihi videbatur in venis huiusmodi res  
 procreari. Quēadmodū in quodam Ara-  
 biæ loco (vt aiunt) in tibiis hominum dra- *Dracūcu-*  
 cunculi vocari nascuntur: nervosa naturā, *lus, à bar-*  
 colore, crassitudineq; lūbricis similes. Igi- *babaris ve-*  
 tur quum multos audiuerim qui sese vidis- *na meden-*  
 se eos dicerent, ipse verò nunquā vide- *nomina-*  
 rim: idcirco neq; de ortu, neque de essentia *tur.*  
 ipsorum quicquam exactè coniicere pos- *In India*  
 sum. At vbi pilos meiando excretos vidi, *et regio-*  
 tū ex colore, tū ex mole, credidi dicenti- *nibus su-*  
 bus eos ex crassa, lentaq; materia, quam ca- *pra Aegy-*  
 lor calfecit exiccavitq;, in venis cōsistere. *ptū. Pau.*  
 quanquā longitudinis ipsorum causam *Aē. in In-*  
 non intelligo. Verū quum primū eos *dia et Ae-*  
 vidissem, curationem à medicamentis quæ *thopia.*  
 vrinam ciere possent, tentavi: quam post-  
 eā experientia comprobavit. Omnes verò  
 quotquot huiusmodi affectu laborare cō-  
 sueuerunt, neque ante ipsum, neque rursus  
 post ipsum nephritico aliquo accidēte fue-  
 runt molestati, etenim curati fuerunt me-  
 dicamentis quæ ciere vrinam possunt. Ve-  
 rū etiam si alia quæpiam humorū vitia,



*Puris ex-  
cretio per  
vrinas.*

à venis per vrinā expurgētur, quemadmo-  
dum si puris quoque multa fiat per vrinas  
excretio, nihil ab iis vel renes, vel vesicā,  
vel vretēras, molestari cognouimus. Cæ-  
terum in hac re non parum cum intestinis  
conuenire videtur, quæ in hepaticis dispo-  
sitionibus nihil læduntur, licet à bile syn-  
cera lædantur, veluti vesica quoque, vbi  
longo tempore acres per ipsam vrinæ trās-  
eunt, vlcēribus affici solet. Est etiam alius 10

*Renū im-  
becillitas.*

renum affectus, quo tenuis sanies sangui-  
nis mingitur, similis excrementis quæ in he-  
paticorum affectum initio excernuntur, ni-  
si quod magis videtur cruenta: cuius rei cau-  
sa est dispositio haud absimilis ei qualē in  
iecore diximus imbecillitatē esse: Insuper  
quum ora, aut meatus (victunque nomina-  
re volueris) per quos ex cōcaua vena in re-  
nes vrina percolatur, supra modū dilatan-  
tur. Atque ad renes quoque pertinere is vi 20

*Hydrops  
matellæ.*

*Vrinæ pro-  
fluuium.*

*Diabetes.*

*Dipsacos.*

detur affectus, quem alij hydropem matel-  
læ, alij vrinæ profluuium, alij diabetē, alij  
dipsacon appellant: qui certē quā rarissi-  
mē venire solet. Equidē cū antehac bis dū  
taxat videre potui, supra modum videlicet  
sitientibus infirmis, atque subinde bibenti-  
bus: quapropter exhuberāter quoq; reddūt  
id quod biberūt, eo à sua qualitate nō mu-  
tato. Atque hic renum, vesicæq; affectus si-  
mi



milis est ventriculi intestinorumque læuitati. Sed de intestinorum læuitate, alibi separatim iam dictū est: vbi ostēdimus non ventriculum duntaxat, sed vniuersa quoque intestina ad excretionē, tum ciborū, tum potuum assumptorum, celeriter excitari, adeo quod ne pauxillo quidem tēpore, citra molestiā, ferre possint, ipsorū aut pondus aut qualitatem. At quod affatim, celeriterque ad vesicā vrina defertur, id neque ad vētriculi, neque intestini ieiuni, neque tenuis, imbecillitatē tanquā causam referendum est. Si enim ob id quod potū sustinere nō possunt, ad excretionē properāt, quid obstat quò minus per sedem excernatur? id quod in læuitatibus intestinorum fieri planè videtur. Neque enim cibus duntaxat tam celeriter per tam longam intestinorū conuolutionem transiēs deiicitur, verū etiam ea quæ epota fuere. Porro transmissionem à totius ventris partibus, ad hepar didicimus, neque per hepatis, aut venarū in lactibus, aut vētre quomodo neque per earū quæ ab hepate exortæ ad renes tendunt, imbecillitatem, fieri. Quippe in libris de Naturalibus facultatib⁹, iā ostēsum est iecur ex ventriculo per mesenterij venas, veluti arbores à terra per radices, cibū ad sese alligere sic etiā renes id quod aquosum in san-

*Diadosis  
à vētre ad  
hepar.*



*Vesica* nō guine est. Verūm vesicam nō trahere à re-  
*trahit à* nibus, quēadmodū neq; intestina à ven-  
*renibus.* triculo, sed renes quidem per vřteras ex-  
*Intestina* cernēdo in vesicā mittere, ventriculum au-  
*nō trahūt* tem in ieiunū, per eam partem quam Ero-  
*succum à* philus dodecadaētylon vocat, à duodecim  
*ventricu-* digitorū longitudine nomen ei imponēs.  
*lo.* Itaque renum potiūs imbecillitas accusan-  
*Dodeca-* da est, vřpote qui cōtinere diutiūs vřinam  
*daētylos.* nō valent, non verò aliarum partium, per ic-  
 quas potus trānsire solet. Sed rursus repre-  
 hendēdo dicet quispiam, quum infirmī fue-  
*Quomodo* rint renes, quomodo fieri potest, vt tā ce-  
*renes tam* leriter vřinā ad se attrahant? an dicere pos-  
*celeriter* sumus, quemadmodū in ventriculo qui-  
*vřinā ad* busdam lientericis vehementissima excita-  
*se attra-* tur ciborum cupiditas: ita in renibus quo-  
*hant.* que cupiditatem simul oriri [vehemētem]  
 atque hanc ob causam eos vřinā per con-  
 cauam venā ad sese trahere, sed illicò ab  
 attractionis impetu grauari? Etenim quē-  
*Appeten-* admodum in his qui canina vocata appe-  
*tia cani.* tentia vexantur, videmus vt affatim imple-  
*na.* ri paulò pōst aut euomant, aut fluore dei-  
 ciant: id quod nō solūm iis qui prāter na-  
 turā se habēt, accidere solet, verūm etiam  
 animalibus quibusdā integrā valetudine  
*seleucides* degētibus, vt in auiculis quas nostrates in  
*auicule.* Asia seleucidas vocant, videre est: quippe  
 quā



quæ iugiter locustas edût, easque celeriter  
 excernunt. Ac in aliis quoque animâtibus  
 huiusmodi accidens naturale videtur. Vt  
 igitur canina cupiditas in ore ventriculi  
 consistens, non potente ipso deuoratorum  
 pondus sustinere, multa impetuosè ingere  
 re, atque ea celeriter excernere cogit: Ita *Serosa hu-*  
 in renibus quoque accidit serosæ humidi- *miditatis*  
 tatis cupiditas, vnà cum virium imbecilli- *cupiditas*  
 10 tate, vnde & humiditatem affatim attrahe *nimia in*  
 re, ac eâ deinde in vesicâ impellere cogun *renibus.*  
 tur. Sed quæres fortasse, quamobrem vrine  
 fluor subitò euenire potest, læuitas intesti-  
 norû non potest: veluti neq; canina cupidi-  
 tas, sed pluriû dierû numero opus est. Nã  
 affectus initium ab incremento, incremen-  
 tum à vigore distinguitur. Quoniam ven-  
 triculi cupiditas, qua cibum potumque ap-  
 perit, animale officiû est, quò citra sensum  
 20 nostrum nequaquàm fungitur. Renum ve- *Renû de-*  
 rò desiderium naturale est, neque ab ipso *sideriû na-*  
 sensus nostri afficiuntur. Proinde quum ad *turale.*  
 statum peruenit, ne sensum quidè mouet,  
 quemadmodum appetētia canina. Qua de *Quare v-*  
 re rationi consentaneum videtur, vt quum *rima fluor*  
 inceperit, paulatim increseat. In primis *subitò eue-*  
 enim trahit sanguinis serû ex venis vel ni- *niat in re*  
 hil nobis sentiētibus, quē quû totum attra *nibus.*  
 xerit, videaturque sanguis in venis, huius-

Y ;



modi humiditate spoliatus, exiccata tum  
vasa humorē trahūt ex hepate, deinde hoc  
ex intestinis & ventriculo. Quum itaque  
exiccatae fuerint venae, quae in ore vētricu-  
li sunt, potum desiderat homo, utpote di-  
spositionem ipsam tum primum sentiens,  
deinde exhibitam potionem venae ex he-  
pate ad ventriculum venientes, utpote ari-  
dae, totam rapiunt, atque ex his aliae dein-  
ceps, donec ad renes perveniat transsum-  
ptio. quippe in libris de Naturalibus facul-  
tatibus, dictū est, nō solū potionē, verū etiā  
cibum trāssumptione per attractionem fa-  
cta, per vniuersum corpus deferri. Igitur  
hic affectus quod ad transitus celeritatem  
pertinet, persimilis est intestinorum laui-  
tati: atque etiā quod renum dispositio ven-  
triculi dispositioni eadem sit. Verū hoc

*Renū di-  
spositio  
quid dif-  
ferat ab in-  
testinorū  
& ventri-  
culi dispo-  
sitione.*

*Diabete  
ad ventri-  
culum nō  
pertinet.*

vno inter se differunt, quod quae ante re-  
nes fit lationis actio, in naturalibus nume-  
retur, attractoria facultate successiōe agē-  
te, atque hac ratione inter sese nō nihil dif-  
ferūt, quāuis in vna re similitudo inuenia-  
tur. quippe ex cōcaua vena ad renes attra-  
ctio, primę deglutitioni eorum quę ex ore  
in vētriculū deferūtur, haud absimilis est.  
At verò actiones quae hanc antecedūt, ad  
vrinae fluorem propriè pertinent. Non re-  
ctè autem putasse quosdam, diabetem ve-  
luti



luti caninam cupiditatem, ad ventriculū  
 pertinere, hinc manifestū est. Nā qui prae-  
 nimia siti ventriculū impleuerunt, serua-  
 re potionem longo tempore possunt. Sed  
 vehemēti siti laborātes quatuor acciden-  
 tium periculum à potione subire solent. *Siti vehe-*  
 Vnum, & quidem primum, vomitio est: *menti la-*  
 alterum; velox per aluum excretio, aut *borantes*  
 fluore, aut intestinorum læuitate: tertium, *quatuor*  
 quòd potus diutius quàm par est in vētri- *accidētū*  
 culo manet: quartum id ipsum, de quo *pericula*  
 nūc sermo est, siue id diabeten, siue dipsa- *subeunt.*  
 con, siue vrinae fluorem nominare volue-  
 ris. Neq; enim vt idoneum ei nomen im-  
 ponamus, sed vt curationis viā tum ex lo-  
 co affecto, tū ex ipsa dispositione inuenia-  
 mus, scrutari animus est. Atq; alius inter- *Ciborum*  
 dum affectus occurrit diabete perquā si- *dissipatio.*  
 milis, & quidem à multis cibis, qui neque  
 20 crudi sunt, neque per aluum deiciuntur,  
 neque plenitudinem efficiunt, neq; etiam  
 probè alere possunt, sed dissipantur, discuti-  
 unturq;. Cuius vt crebrior est, quā dipsa-  
 ci euētus, ita faciliore admittit curationē.  
 quippe si prius quàm ad summū peruene-  
 rit, ipsum cognoueris, haud ita difficulter  
 curabitur. Nā vbi quis duplū consuetorū  
 alimentorū assumpserit, neque corpus ali  
 videatur, idq; citra alui fluorem, hunc af-



fectum non solum priuati, verum etiam me-  
dici paruipendunt. Quum verò triplū in-  
gerit, idoneis auxiliis liberari potest, prius  
quàm scilicet ad quadruplum aut quintu-  
plū perueniat. Igitur rationi cōsentaneum  
est, hunc affectū à celeri dissipatione inci-  
pere, omnibus partibus attractricē, atque  
ei cōiugatam facultatem, quē propriē ap-  
petentia vocatur, seruantibus. At verò in-  
gētis sitis quæ citra diabetē accidit, causa 10  
est vētriculus, aut calida, aut sicca, aut vtra-  
que intemperie affectus, maximè verò os  
ipsius. Proximè vētriculo hepar, sed maxi-  
mè pars eius sima: simul eis exæstuātibus,  
nimirū mesenterio, ieiuno, ipso vētre, sto-  
macho, & pulmone. Atq; huius accidentis  
radix inde plerunque proficiscitur, quòd à  
dispositione erysipelatis naturā referente  
incēduntur. Quæ magna ex parte marcor  
sequitur, aliàs alius, veluti quum hanc tra 10  
ctaremus materiam, declaratum est. Hæc  
itaq; propter accidentium communicatio-  
nem simul cū renū affectibus dicta sunt.  
Porro diabetes proprius renū affectus est,  
q̄ caninæ in ore ventriculi cupiditati pro-  
portione respōdet, accedēte prætereā re-  
tētricis facultatis imbecillitate. Nā si citra  
vehementē cupiditatem ipsum fieri dice-  
remus, in primis nihil penè vrinē ad renes  
perue

*Appeten-  
tia.*

*Ingens si-  
tis citra  
diabetem.*

*Gale. lib.  
de mar-  
core.*

*Diabetes  
pprius re-  
num affe-  
ctus.*



peruenire notaretur: si verò citra retentri-  
cis facultatis imbecillitatē, non tanta ce-  
leritate sequeretur vrinæ profluuium.

*De vesicæ affectibus.* CAP. IIII.

**V**esicæ superueniunt accidentia par-  
tim cæteris cōmunia, veluti omnes  
ipsius præter naturā tumores, dolores, at-  
que quæ hos facere possunt affectiōes, par-  
tim ipsi soli propria, vt ischuria (id est vri-  
næ retentio) strāguria (id est vrinæ stilli-  
cidiū) ac alio quoque modo immoderata  
vrinæ excretio, verū huiusmodi vacuatio-  
nes (vt de renibus suprā dictum est) vesica  
tanquā meatu vtūtur, ipsa haud quaquā  
affecta. At verò stillicidiū, si ob vrinæ acri-  
monia fit, accidens vesicæ est, affectus ve-  
rò minimè. Si verò aut ab vlcere, aut imbe-  
cillitate procedit, à vesicæ affectu factum  
esse dicitur. Quemadmodum vbi acrimo-  
nia in causa est, aliquādo ob renum vitiū,  
aliquando ob alias partes, quæ cū vrinis,  
humorum suorum vitia, aut pus, vbi ab-  
scessus aliquem infestauerit, transmittere  
possunt. Euenit etiam interdum vrinæ stil-  
licidium, humoribus qui in venis sunt, &  
per renes, & per vesicam expurgatis. Cæ-  
terum quū ab intemperie vesica sit imbe-  
cillior, læditur propria ipsius actio, quæ est

*Ischuria.*  
*Strangu-*  
*ria.*

*Stillicidiū*  
*vrinæ vni-*  
*de eueni-*  
*at.*

*Propria*  
*vesicæ ac-*  
*tio vrinæ*  
*excretio.*

Y S



vrinæ excretio: ad quã animal excitari so-  
 let, quum vel à multitudine cõtetæ in ipsa  
 materiæ vesica grauat, vel à mordacitate  
 conuellitur: sed ab horũ vtrolibet magis  
 imbecilli quã robusti dolere cõsueuerũt.  
 Quineriã instrumẽtales affectus imbecil-  
 litatẽ interdũ inducere possunt. Item in-  
 temperatiæ omnes cùm aliæ, tũ maximẽ  
 illæ, quæ nonnullis sæpe eueniunt, quum  
 frigore corripitiũtur: tunc enim planẽ gra- 10  
 uari videtur, vel paucò admodum conten-  
 to in ipsa humore. Atq; vesicę etiam velu-  
 ti meiendi instrumẽto ischurię accidẽs su-  
 peruenire solet. Interdũ quidẽ ( vt dictum  
 est) quum id quod in ipsa continetur, non  
 ita cõprehẽdere valet, vt ipsum exprimat.  
 Interdum etiam obstructo inferiori mea-  
 tu, aut à crassis humoribus, aut impacto  
 lapide. Atque accidit nonnunquam, vel ab  
 inflãmatione, vel alio huiusmodi tumo 20  
 re, vt angustior reddatur meatus, vel etiã  
 omnino obstruatur. At verò neq; neruo-  
 rum à spinali medulla exortorum, neque  
 etiam spinæ ipsius affectus, vesicæ tantam  
 imbecillitatẽ afferre possunt, vt vrina pro-  
 ptercà supprimatur, quemadmodũ nũul-  
 li putauerunt, credentes vesicæ officium à  
 cõsilio & electione pcedere, quòd scilicet  
 vrinã retinemus quoad voluerimus, atq;  
 eam

*Retentio  
 vrinæ vn-  
 de fiat.*

*Vesica nõ  
 habet mo-  
 rum volũ-  
 tarium.*



eam pro voluntatis imperio excernimus.

Verū satius fuisset nosse nō vesicę, sed me-  
iendi officiū, veluti etiam deiiciendi, non  
intestinorū munus ab electione cōsilioq;  
pendere. Quippe vesicę officium vnicum  
est, cōtractio. At musculus qui vrinę mea-  
tum in circuitu ambit, in origine ceruicis  
vesicę extēsus, instrumētū est, cuius opus  
ab electione excitatur, vtpote qui ambiēs

*Vesicę of-  
ficiū, con-  
tractio.*

10 vesicę ceruicē, eam ita exactē stringit, vt  
nihil humoris ex vesica in meatū ingredi  
possit. Atque similem quoque & actionem  
& vtilitatē habet musculus, qui recti inte-  
stini partē extremam ambit. Proinde ipsis  
resolutis, neque vrinam vesica, neque ster-  
cora alu<sup>9</sup> retinere potest: sed pręter volūta-  
tem paucis omnino interuallis vtraq; ex-  
cernuntur. Itaq; veluti in reliquis musculis  
quod à resolutione fit nobis inuitis, id ele-  
20 ctio nostra haud iūta efficere solet: ita eā-  
dem ratione ab horū actione quiescimus,  
quum vel stercus, vel vrinā excernere pro-  
positum est. Atq; vt nōnulli cum vrinarū,  
tum cibi excrementorum deiectionē, totā  
ab eiectione procedere existimātes erraue-  
runt: ita rursus alij his ē diuerso, totū hoc  
opus naturale putātes, à veritate depiaue-  
runt. Etenim cibi à vētriculo in ieiunū ex-  
pressio tota, naturę opus est. Rursus omni-

*Musculi  
ani actio.*

no



no ab electione pendet & vtrorumq; mē-  
 brorū, & cuiuslibet digiti rum extēsiō, rum  
*Delatio à* inflexio. delatio enim quæ à ventriculo ad  
*vētriculo* ieiuniū fit, & quæ ab hoc in tenue intesti-  
*ad intesti* num, à sola naturali facultate procedit. At  
*na, à nu-* alui deiectio, & vrinae redditio vtroq; in-  
*turali fa-* strumēto, propriis suis facultatibus agen-  
*cultate fit* te perficiuntur. Rectum intestinū, atq; ve-  
 fica naturali vtunt facultate, musculi verò  
 ea quæ & animalis, & voluntaria nomina-  
 tur. Quippe musculi q̄ fluores cohibere so-  
 lēt, tūc quiescūt ab opere, abdominis mu-  
 sculis munere suo fungētibus, maximè ve-  
 rò mediis. Sunt nonnulli qui quū non ita  
 facilè deiicere possunt, manibus huiusmo-  
 di musculos comprimunt, neq; nō vbi vri-  
 na ita suppressa est, vt omnino retineatur,  
 idē facere consueuerunt. Quū itaque ner-  
 ui, p̄ quos animalis facultas ad iam dictos  
 musculos peruenit, afficiūtur, aut vbi spi-  
 na ipsa læsa est, resoluitur musculorū actio,  
 atque excernitur & vrina & stercus, vel in-  
 uito laborāte. Quum verò vesicæ corpus  
 ita fuerit affectum, vt quod in ea contine-  
 tur exprimere non possit, supprimitur vri-  
 na, nominaturq; hoc accidens ipsius, ischu-  
 ria. Atq; accidit interdū propter obtusum  
 ipsius sensum, vt nō reddat vrina, citra ta-  
 men expultricis facultatis læsionē, si pro-  
 prij

*Inuita*  
*stercoris et*  
*vrinae e-*  
*missio, à*  
*resolutis*  
*neruis.*



prij vesicæ nerui afficiatur, neruis muscoli  
 ceruicem eius stringentis, munere suo fun-  
 gentibus, ipsorū scilicet facultate seruata.  
 Nam si resoluatur, propriū indicium, quod  
 musculus hic resolutus sit, est urinæ præter  
 volūtate excretio. At huiusmodi euenien-  
 te affectu, quū meatus ipsius fuerit obstru-  
 ctus, vtraque dispositio cognitu difficilis  
 erit. Proinde vt exq̄ sitè dignoscant, nō so-  
 10 lūm ij, sed reliqui quoq; oēs vesicæ affe-  
 ctus, perquā necessariū est præscire eui-  
 dentes causas extrinsecus adueniētes, quas  
 propriè p̄catarticas (id est iniātrices) *Procatar*  
 Medici vocāt. sed multò etiā accuratiori *etica cau*  
 inuestigatione, eos q̄ præcesserunt in ani- *sa.*  
 mātis corpore affectus, ingrere oportet. *Spina ex*  
 Igitur cuidā, quum cecidisset, spina sinua *casu cui-*  
 ta est, quapropter urinam reddere non po- *dā sinua-*  
 tuit. Nam & id aliquando fieri solet, quē- *tā, vesica*  
 10 admodū ab Hippocrate dictū est. Verūm *inflamma*  
 nō illicò suppressa fuit urina, sed perēdie, *tionis cau*  
 ob afflictarum vertebrarum ad interna lu- *sa fuit.*  
 xationem, inflammata vesica. Itaq; dolo- *Luxata*  
 bat in ea pte vel nemine tāgente, sed mul- *exterius*  
 tō magis, si quis manu cum tangeret. Atq; *vertebra*  
 hūc curauimus inflāmatiōi remedia adhi *strangu-*  
 bētes. Rursus alter luxatis ad externas par *riam cui-*  
 tes vertebris, urinā inuitus profudit, nullo *dam indu*  
 infestāte vesicā dolore. in hoc coniecimus *xerunt.*  
 eius



eius musculi neruum qui vesicam claudit, fuisse affectum, proinde spinam curare voluimus. Atq; in alio similiter affecto, suppressa fuit vrina, torpente ob affectos nervos vesicæ sensu: quum itaque inter dormiendum non sentiret homo vesicam impleri, ipsa extensa nihil excernere potuit. eteñ accidit interdū, vt hoc modo vrina supprimatur. Quemadmodum etiā sanis quibusdā, aut vrgentibus negotiis, vel in cōcionibus, vel senatu, vel foro, vel conuiuio, tum enim retēta longo tēpore vrina, extenditur vesica, atq; vrina supprimitur, contractrice facultate læsa ppter immoderatā tensionē. Quidam etiā quum cecidisset, manente spina illeſa, in primis quidem magnam sanguinis copiā cum vrina emisit, postea verō omnino suppressa est vrina, cuius rei causam esse cōiecimus, qd cōcreti sanguinis grumus intus se opposuit, quocirca demissa p colē fistula, paulū vrinæ reddidit, extracta deinde fistula, apparuit in ipsius ore grumi indicium. Prætereā quum alios quosdā diuturni dolores vnā cū abscessuum notis infestassent, finitis abscessibus, tenue pus cū vrina pfluere visum est, deinde subsequēs vrinæ retētio coniecturæ occasionem dedit, quod à crasso pure meatus obstrueretur. Atq; in puer

*Cuidā ex casu suppressa vrina.*

*Meatus vrinarius à crasso pure obstruetus.*

*Lapis in vesica vrinam suppressit.*



pueris etiā quos lapis in vesica cruciabat,  
vidimus sæpenumerò vrinā retineri. Eos  
itaq; resupino figurato corpore concussi-  
mus, vt ita à meatu lapis dimoueret. Quū  
verò id quod iam iam dicā, sæpe videritis,  
oro vt ipsum tenaci semper memoria fer-  
ueris. Quòd ad grumos vocatos, non solū  
eos qui in vesica, sed multò magis illos  
quoq; q̄ in intestinis, vētriculo, atq; thora  
10 ce nōnunquā cōtinentur, animi defectio,  
& pallor sequi solet, pulsus verò paruus,  
obscurus, frequēs apparet, & laborās ipse  
cū anxietate resoluitur, quemadmodū in  
magnis musculorum vulneribus sæpenu-  
merò accidit, vt mirari aliq̄s possit, quæ-  
nam sit huius euētus causa. quippe quum  
omniū quæ in corpore sunt, sanguis maxi-  
mè nobis sit familiaris, quomodò ex vasis  
suis effusus, tanti mali autorem se præstet,  
20 vt & putredo partiū, & marcor ipsum se-  
qui possit. Eteñ vidimus, vbi vesicæ mea-  
tum grumus obstruxerat, eadē sequi acci-  
dentia: grumū verò adesse cōiecimus hoc  
argumento, quòd plurimū antea cruorem  
laborātes cū vrina reddidissent. Itaq; me-  
dicamentum quod lapidē terere posset ex  
oxymelite, atque ipsum quoque oxymeli  
p̄ se in potu dedimus. At nihilominus alij  
quidem perierunt, vno quodam seruato,  
fo

*Grumi  
in vesica  
& alijs in  
ternis par-  
tib⁹ nota*



*Vomica  
in vesica,  
septo, aut  
aliis par-  
tibus erū  
pentis si-  
gna.*

solutis grumis, quos paulò pòst cum vrina excreuit. Quoniam verò non satis est ad affectæ sedis inuentionē ea duntaxat accidentia, quæ in præsentia infestant, intueri: sed & ex his quæ præcesserūt, subinde definimus, facile intelligetis, si eorū quæ antea vidistis, memineritis. Igitur quū multi creberrimè pus cū vrina emitterent, præteritorum accidentium memoria, & sedē affectā nobis ostēdit, & dispositionem in ipso cōsistentem declarauit. Quidā enim quū prius in regione renum sæpenumerò doleret, accedente inordinato horrore & exigua cōcussioe, febre corrept⁹ est. Alius circa vesicæ positum simul cum horrore ac febre dolores præsensit. Nonnulli circa septum trāsuerſum, & thoracem. Atq; alij in dextra præcordiorum parte. Coniecturam itaque fecimus, in iis omnibus, quòd pus per renes expurgaretur, vomica scilicet in loco dolēte erupta. Cū indiciis autem suprà propositis nonnihil confert puris quantitatem, & quomodò totum cum vrinis misceatur, utrū confusum, an contrà, cōsiderare. veluti iam antea de intestinis dictū est. Nam vt in his, si à superioribus intestinis quidpiā defertur, id ciborū excrementis perinde admixtū videtur, ac si cum ipsis subactū fuisset. Si verò ab humilio



milioribus, cū vna ipsorū parte excernitur. Simili modo vrina, aut tota à pure cū *Suppuratio in vesica* ipsa emissio cōturbatur, aut p partes quādam dispersum pus inæqualiter defertur. *ca, ex pure*

• Plerūque etiā solūm pus sine vrina excernitur: idq; haud obscurè in vesica suppuratio *per vritione* cōsistere indicat. Quod verò exactè *nas.*

commixtū est, à supernis alicūde partibus venit. Sed quod mediam inter hæc condi-

10 tionem seruauerit, id à renibus descēdisse certū est: similiter si erupta vomica, cū affecti loci indiciis, vlceris quoq; signū aliquod appareat. Nā & hoc aliquando quidem exactè commixtum videtur, aliquādo verò mediocriter, interdū vel nullā habet mixtionem, vel quodammodò superfertur, vel solūm excernitur. Atq; vocatū *Ramentū* quidē ramentū, vlceris: essentia verò pro- *excretū.* prietas, affectæ partis propriū indicium est. *Lama.*

20 quippe partes à vesica auulsæ, lamis: à renibus verò, carūculis sunt similes. Ita etiā *la.*

vbi ex sublimioribus pars aliqua affecta *Viscera* est, excremeta, cū vrinis eiecta intueri, & interiora ea suspectarū partiū essentia cōparare o- *quomodo* portet. Igitur cū vrina expurgatur gibbæ *per aluū* hepatis partes, atq; oēs quotquot sunt his *et vrinæ* superiores: per alium verò pars iecinoris: *expurgen* resima, intestina, vētricus, lienis. Præter tur-

has, aliæ quædam fiunt purgationes, sed



rarò, vt cùm thorax & pulmo per aluũ pur-  
 gatur: quæ infra septũ transuersum posite  
 sunt partes, p̄ vrinas. Quorũ causam cùm  
 nonnulli ignorēt, neque id vnquam acci-  
 disse viderint, quod à multis visum est, ne-  
 gant fieri posse, quòd abscessu interim in  
 pulmone orto pus expurgari p̄ renes pos-  
 sit. Nos verò pulmonis vomicã per urinã  
 3. Epid. thoracis autẽ per intestina & aluũ, expur-  
 gari vidimus. Quãquã in primis ex pul- 10  
 monis scri mone per renes transitus, nullam reuerã  
 bit purga dubitationẽ excitare debet. Etenim vt à  
 tos nãw cõcaua vena, ita ex magna quoq; arteria  
 per aluum rami descendũt ad renes. Hæc quæstio ta-  
 scilicet & men Erasistrati sectatores nō parũ vrget,  
 vrinas. quippe qui putauĩ solum spiritũ in arte-  
 7. Lib. 7 riis cõtineri. Nobis verò nihil difficulta-  
 Aph. 30 tis affert, vtpote intelligētibus, q̄ læuis ar-  
 teria pulmonis, quãtũ puris ex erupta vo-  
 mica suscipit, id in sinistrũ cordis sinũ de- 20  
 ferre potest, quod inde in magnã ipsius ar-  
 teriã incidēs, per renes transit in vesicam.  
 Hoc tamẽ nō ita crebrò euenire videtur,  
 vtpote pure prius in asperas arterias ma-  
 gna ex parte transumpto. Itaque quã ob  
 causam pus in pulmone genitũ, cũ vrinis  
 (licet rarò) excernatur, iam dictum est. Id  
 verò quod per ventrem expellitur, aliam  
 & quidem raram (quæ in corporum disse-  
 ctione



ctione apparet) habet causam, quippe cō-  
 caua vena, mediante vase quodam stele-  
 chiæ (id venæ quæ arboris caudici pro-  
 portione respondet) videtur interdū ada-  
 ptari. Proinde nihil mirum, neque impossi- *Pus ex*  
 bile est, & ex partibus septo transuerso su *partibus*  
 perioribus, pus in ventrem defluere, & ex *septo supe*  
 his quæ eidem supponuntur, ipsum per re *riorib' in*  
 nes in vesicam peruenire. Nam corporum *ventrem*  
 10 raros habitus, par est vt rara etiam acci- *defluens.*  
 dentia sequantur.

*De vteri affectibus.*

CAP. V.

**A**Tque ne hoc quidem loco sollicitos *Vuluæ.*  
 esse oportet, vtrum vuluam, an vte- *Vterus.*  
 rum appellemus eam partem quæ mulie-  
 ribus ad pariendum à natura data est. Ne-  
 que rursus vtrum numero plurali vuluas,  
 aut vteros, an singulari vuluam aut vterū  
 quis nominauerit. Etenim satius fuerit in  
 20 rebus vtilibus tempus collocare, ex qui-  
 bus vel ad notitiā, vel præsagia, vel cura-  
 tionē, fructum aliquem decerpere possi-  
 mus. Veluti in eo affectu quē nōnulli vte-  
 ri suffocationē, alij spirationis ob vterū *Vteri suf-*  
 ablationē vocant, volētibus medicis vtra *focatio.*  
 que appellatione vnum quendam affectū  
 explicare. Ego verō multas vidi mulieres *Hysteri-*  
 hystericas, id est ab vtero suffocatas, nam *ca mulie-*  
 priores forminx artem medicā professæ, *res.*

Z 2



à quibus nomen ipsum audiri potuit, ita  
 seipsas nominare solebant. Alias quidem  
 sine sensu immobiles iacere, cum obscuro  
 paruoq; pulsu, vel omnino sine vlllo pul-  
 su: Alias sentientes quidē, & moueri potē-  
 tes, atq; integra ratione, sed tamen animi  
 defectione, & difficili spiratione laboran-  
 tes. Alias etiā crura & brachia cōtrahētes.  
 Ex quibus cōiecturā feci, multas esse vte-  
 ri affectuum differētias, vel pro causę effi-  
 ciētis magnitudine, vel pro specierū qua-  
 rundā varietate inter se differētes. Igitur  
 prima species, cuius Heraclides Ponticus  
 in suo cōmentario mentionē fecit, multā  
 exhibet de ortu suo ambiguitatē. Ait enim  
 sub hac specie neq; pulsum, neq; spiratio-  
 nem mulieris deprehēdi posse. Atq; ob id  
 dūtaxat non videri mortuā, quōd exiguū  
 in mediis corporis partibus calorē habe-  
 ret. Est autē libri titulus Apnus (id est per-  
 dita spiratio) Heraclidis. Ac astantes quo-  
 que medicos quæsiuisse ait, an nondū sit  
 mortua? Rursus nōnulli Heraclide poste-  
 riores credentes seruari aliquid spiratio-  
 nis, quāuis ipsa nō appareat, carptæ lanæ  
 flocculos coram naribus suspendi iubent,  
 vt exactē deprehendatur, nū spiritus ali-  
 quis inter spirandū tū intrō, tū foras rur-  
 sum deferatur. Sunt qui poculum aquæ  
 ple

*Species v-  
 teri suffo-  
 cationum  
 plures.*

*Apneus  
 Heracli-  
 dis.*



plenu ori ventriculi imponere præcipiunt,  
 quippe immotu omnino seruari humore  
 aiunt, si tota perierit spiratio. Itaq; si om-  
 nes ita affectæ mulieres interiissent, sim-  
 plex esset quæstio. quum verò nonnullæ ser-  
 uatæ videantur, geminā oriri quæstionem  
 necesse est, inuestigantibus nobis, tū dispo-  
 sitionē ob quam spirationis munus deper-  
 ditur, tū vel magis, quomodo viuere pos-  
 sint, quæ nihil omnino spirant. Quippe in  
 confessio est, & spirationē à vita, & vitā à  
 spiratione separari nō posse: adeo vt viuē-  
 tem nō spirare, & spirantē non viuere, sit  
 impossibile. Atq; hæc quæstio, quanquam  
 superiore difficilior videtur, non est tamē  
 perinde difficilis. quippe facilē sustinebi-  
 tur, si latebris inclusa animalia cōsideres,  
 nulla apparente in ipsis spirationis nota.  
 Hoc enim cognito, perspectisq; animalibus,  
 utpote frigidis atq; eo demonstrato, qd  
 maximus respiratiōis vsus est, vt intus  
 calor & refrigeratione & vētilatione fer-  
 uetur, haud ita difficile fuerit perpēdere,  
 exiguum illum calorem in ipsis derelictū, ar-  
 teriarū cordisq; officio cōseruari, quæ a-  
 ctio à quibusdam medicis trāspiratio: ve-  
 lut ea quæ à thoracis pulmonisq; officio  
 prodit, respiratio vocatur. Itaque in vteri  
 suffocatiōe quoniā vniuersum corpus re-

*Spiratio à  
vita sepa-  
rari nō po-  
test.*

*Respira-  
tionis v-  
sus.*

*Transpi-  
ratio.*

*Respira-  
tio.*



frigeratur (id enim manifestè videtur) fieri potest, ut nulla prodeat ab ore spiratio, quànvis ea quæ in arteriis sit, nequaquam intercipiatur. Verùm adeò potest esse exigua, ut sensum omninò effugiat. Ergo ut nihil ad hunc affectum pertinens maneat indiscussum, succedit iterùm alia quæstio. Quà ob causam corpus refrigeretur? Ea verò haud difficulter dissolui poterit, si causas quæ præcesserunt diligenter intuea-

*Vidua mulieres uteri suffocationibus laborantes, per corpus refrigerantur.*

mur. Sunt autè huiusmodi: Cõuenit inter omnes medicos hunc affectum magna ex parte viduis euenire, iisq; maximè, quæ antea probè purgarentur, ac parerèt, atq; virorù concubitu gauderèt. Quib' rebus omnibus priuatæ, quid probabilius excogitari quis posset, quàm q̃ ob retèta menstrua, vel semen cohibitum, huiusmodi mulieres uteri dispositionibus cruciètur? siue eas apnoæas (id est, nō spirationes) siue suffocationes quis vocauerit, siue etiã cõtractiones quædã cõtigerint. Idque fortasse magis à semine retèto accidere potest, ut potè magnā vim obtinète. ut est enim in mulieribus humidius, ita etiã frigidius: proinde ipsum excerni oportet, præsertim si naturaliter multo semine exuberat mulier. Id verò viris quoque euenire solet. quippe nō parua est horù differètia. Sunt enim

*A semine retèto quæ accidètia, etiã viris euenire soleant.*



enim nonnulli quos protinus à iuuetute cō-  
 cubitus imbecilliores efficit. Alij nisi assiduè coëant, capitis grauitate molestatur,  
 cibos fastidiūt, ac febrib⁹ obnoxij fiūt, at-  
 que vt deterior est ipsis appetētia, ita & cō-  
 coctio minor, hos Plato arborib⁹ immo-  
 dicè fructiferis comparat. Equidem noui  
 quosdam quibus huiusmodi erat natura,  
 qui prae pudore à libidinis vsu abstinētes  
 10 torpidi pigriq; facti sunt: nonnulli etiā me-  
 lancholicorū exemplo, prae modū mœ-  
 sti ac timidi: cibi etiam tum cupiditate, *Cibi cupi-*  
 tum concoctione vitiata. Quidā vxoris *ditas, &*  
 mortem lugens, & à concubitu, quo an- *cōcoctio vi-*  
 teā creberrimè fuerat vsus, abstinēs, cibi *tiata ex*  
 cupiditatem amisit, atq; ne exiguum qui- *retento se-*  
 dem cibum concoquere potuit: vbi ve- *mine.*  
 rò seipsum cogendo plus cibi ingerebat,  
 protinus ad vomitū excitabatur, mœstus  
 20 etiam apparebat, non solūm has ob cau-  
 sas, sed etiam (vt melancholici solent) ci-  
 tra manifestam occasionem. Verūm hic  
 quā celerrimè liberatus est, ad pristinam  
 consuetudinē reuersus. Hæc ergo confide-  
 ranti mihi apud meipsum, visum est lōgè *Maior no-*  
 maiorem ex retento semine quàm men- *xa ex retē-*  
 struis, corporis noxam euenire posse, prae- *to semine,*  
 sertim in his q̄ suapte natura vitiosis abū *quàm mē-*  
 dant humoribus, & pleni sunt, atque in *struis.*



ocio educati, quiq; cū anteā nihil ad libidinē reliqui fecissent, affatim continere cœperūt. Equidē perpēdi in iis, naturalem excernēdi ipsum cupiditatē huius rei causam esse. quum enim & tale & tantū fuerit, neminē nō ad sui excretionē vi quadam stimulat. Ita Diogenē Cynicum narrant, virū alioqui omniū mortaliū, quod ad cōtinentiam pertinet, constantissimū, libidini tamē indulgisse: nō à copulata illi voluptate, veluti bono aliquo illectū, sed ut noxam, quæ à retēto semine prouenire solet, euitaret. Eū meretrix adire pollicita, quum diutius cessaret, ipse manu puldendis admota, semen proiecit, ac venientem deinde mulierculā remisit, inquit, manus hymenæū celebrādo te præuenit. At planē cōstat modestos viros nō ob voluptatē, sed ut ab impedimēto præseruentur, libidini indulgere: perinde ac si nulla esset ei voluptas cōiugata. Sic etiā reliqua animalia ad coitū excitari arbitror, nō q̄ existiment voluptatē boni cuiuspiā speciem præ se ferre, sed ut semen, quod ob retentionem ipsa molestat, excernant: haud secus quā deiciēdi stercoreis, excernendæq; urinæ desiderio, suapte natura moueri consueuerunt. Cogitanti itaque mihi aliquādo sup̄ hac re, tale quoddam

Diogenes

Cyncus li

bidini in-

dulsi ut

noxā retē

ti seminis

euitaret.

Epigram.

libr. 7. τὸν

δ' ὁ μέναι-

ον ἦεν δειν

ωαλάμην,

λαδὶ ὅς

χαίρει.

Cur ani-

malia ad

coitū exci

tentur.

100

200



dam accidens apparuit in muliere ex longo iam tempore vidua: quæ præter cætera mala, nervorum quoque distentione vexabatur ac dicente obstetrice, vterum esse retractum, remediis ad huiusmodi affectus consuetis uti decreuit: quibus adhibitis, partim ob ipsorum calorem, partim etiã quod inter curandum, manibus tractarentur partes muliebres, obortâ titillatione, cum labore & voluptate veluti per coitum usu venire solet, excreuit crassum plurimumque semen, atque ita à molestia sua liberata est mulier. Proinde manifesta coniectura assequutus sum, vitiato semini maiorem quam mēstruis esse vim ad noxam vniuerso corpori inferendam. Itaque licet hæc quidē aliquādo profluant è viduis, suppressum nihilominus semen molestiam noxamque ipsis inferre potest. Quibus verò nequam quam persuaderi potest, exiguum succum in vna parte contentum tantorum accidentium quæ vniuerso corpori eueniunt, esse causam, omnino immemores esse videntur eorum, quæ quotidie contingunt. Et enim à phalagij ictu totum corpus affici videtur, exiguo veneno per minimum foramen iniecto. Sed longè maiori admiratione dignus est scorpionis ictus, qui breui admodum tempore grauissima infert acci-

*Nervorum distentione laboras quædam vidua, ob rectum semen.*

*De qua Gale. lib. 2. de semine sub principium.*

*Haud secus nocet suppressum sperma ac venenatis animalis ictus.*



dentia: quippe quū sese implicat, aut per-  
quā exiguū est id quod iniicitur, aut ni-  
hil omninō, nullo apparente foramine in  
ipsius aculeo. Atqui fieri nō potest, quum  
primū quis perinde quasi ab acu pun-  
ctus est, vt vniuersum corpus veluti grādi  
ne percuti videat, animi simul defectione  
accedēte. Nā rationi magis consentaneū  
est, vt vel à spiritu quodam, vel tenui hu-  
miditate iniecta, hæc eueniant accidētia. 10  
Sunt qui putāt res quasdā solo tactu per  
qualitatis vim, ea quę eis vicina sunt alte-  
rare posse, idque planē videri in marina  
torpedine: vtpote cui tam vehemens sit  
potentia, vt per piscatoris tridentē trans-  
missa ad manū alteratione, derepentē to-  
tam reddat torpidā. His cōiecturis facile  
deprehenditur, paruæ molis res quasdam  
solo tactu maximas inducere alteratio-  
nes. Id qđ in Heraclio quoq; lapide, quē 10  
magnetē nomināt, videre est: ferrū enim  
quod tetigerit, ei adhæret, vel nullo adhi-  
bito vinculo. Deinde si aliud id quod pri-  
mò tactū fuerit tetigerit, similiter vt pri-  
mum illi inhærebit. Postea tertium secun-  
do, ita vt planē constet, rebus quibusdam  
vehementissimas esse vires. Reliquū est vt  
inuestigemus, an in animātibus corruptio  
aliqua nasci possit adeò vehemēs, vt vene-  
ni

*Torpedo  
marina  
venenosa.*

*Vn ma-  
gnetis.*



nitum qualitatem tum vires æquet : an id iam à Medicis enodatum discussumq; esse videtur, qui hanc solēt proponere quæstionem: Vtrum propriæ sint notæ veneni, necne? Nam qui maximè videntur super hac ambiguitate disputasse, ij eisdem fieri affectus concedunt, & à letalis veneni portione, & à corruptione quæ è corpore ortū habet : verum facile discerni posse eos

- 10 qui venenum sumpserunt, ab iis qui alium de affecti sunt. Quum enim homo suapte natura probis humoribus abundans, ac sanorum more educatus, derepentè moritur (vt letali assumpto veneno fieri solet) dein de corpus aut liuens, aut nigricans, aut varium est, aut defluens, aut putredinem molestem olet: hunc venenum sumpsisse aiunt. Igitur si eiusmodi affectibus nos infestari fateamur, q̄ ex nobismetipsis accepto suæ
- 20 originis impetu similes sint his, qui pernicioso epoto veneno eueniunt: nihil mirum si vitiatum semen, aut mēstruum huiusmodi, quū retinetur, aut putrescit, corporibus vt afficiātur idoneis, grauiam inferat accidētia. Quippe facile intelligitur à canibus, quantam habeat vim afficiendæ rei aptitudo : quum enim reliquorum animalium nullum rabie capiatur, solus canis eo affectu corripitur: atque tāta fit in ipso humo-  
rum

*Veneni e-  
poti notæ*



*Canis ra-* rum corruptio, ut solū eius sputū, si huma-  
*biofi spu-* num corpus contigerit, rabie excitare pos-  
*tum rabie* sit. Ut igitur ab exiguo initio, sputi videli-  
*excitat.* cet qualitate, aucta quædam in corpore di-

spositio, quando ad magnitudinem nota-  
 tu dignam peruenerit, discerni potest: idq;  
 post sex menses, quū nōnunquā ante id  
 tēpus nulla nota deprehēdatur. Sic eodem  
 modo vitioso humore in animalis corpo-  
 re genito, paulatim tractu temporis princi-  
 paliū partiū aliqua cōsentit, à qua deinde  
 vniuersum corp⁹ celeriter alteratur. Quod  
 autem à priscis iā inde seculis optimo iu-

*Hysteri-* re creditū fuerit, hysterica dicta accidētia,  
*ca accidē-* ad vterū, tanquā ad radicem pertinere,  
*tia ad vte* vel maximo argumento esse potest, quod  
*rū perti-* & solis viduis, & iis quibus menstrua sup-  
*nent.* primūtur, huiusmodi affectus euenire cō-  
 sueuerunt. Quod verò ad eos excitandos,

retentum semen, maiorem: menstruum ve-  
 rò minorem vim obtineat, facile intelli-  
 gitur ab his mulieribus, quibus cū non  
 sint viduæ, purgationes supprimuntur, quā  
 uis enim pluribus infestetur accidentibus  
 (quæ post hæc dicentur) spiratione tamen  
 non priuatur, neque animi defectione, ne-  
 que aliis quoque accidentibus, quæ pau-  
 lō antea dicta sunt, laborare videntur.  
 Præterea ex eo quod sunt viduæ quædam,  
 quæ



quæ licet æquè vt antea, aut paulò minùs  
 purgètur, nihilominùs similibus corripitù-  
 tur accidentibus. Quippe medicæ quæ eas  
 exquisitè tetigerunt, fatentur circa vterũ  
 notas quasdam apparere. Nam ceruix eius  
 inclinata videtur, interdum quidem veluti  
 sursum retractus sit totus vterus, interdum  
 verò veluti ad latus trahatur. Proinde qui  
 dam vterum veluti animal esse statuētes,  
 10 quod creandæ prolis gratiâ mouetur: si pri-  
 uetur his quæ concupiscit, vniuerso corpo-  
 ri nocere dicunt. Qua de re Ptatonē ita sci- *Platonis*  
 „ pisse comperimus. Ea pars quæ in mulieri *sententia*  
 „ bus & vterus & vulua nominatur, quum sit *de vtero,*  
 „ animal prolem generare cupiens, si intem *in fine Ti-*  
 „ pestiuè, diuq; infructuosum fuerit: succen- *mai.*  
 „ sens ægrè fert, erransq; per totũ corpus, &  
 „ spiritus meatum obstruēs, respirareq; non  
 „ finens, in extremã anxietatem deiicit, atq;  
 20 multos alios morbos excitat. Hæc dicente  
 Platone, quidam addiderunt quòd postea  
 quàm ita per corpus vterus errauerit, ad se-  
 ptũ trãuersum perueniens, respirationem  
 impedire solet. Alij errare ipsum veluti a-  
 nimal negātes, vbi suppressa sunt mēstrua,  
 exicccari aiunt: deinde humectari cupien-  
 tem, ad viscera vsque ascendere: quum ve-  
 rò ascendēdo nōnunquàm septũ transuer-  
 sum contingat, idcirco animal spiratione  
 pri



priuari. Etenim qui ignorât ea, quę in dissec-  
tionibus apparent, quiq; neq; naturales,  
neque à voluntate pendent actiones, vn-  
quàm considerauerunt, quāuis ea, quę iam  
diximus, nulla audiât demonstratione ro-  
borari: fieri tamē posse arbitrantur, vt ali-  
quid ex ipsis à veritate nequaquàm abhor-  
reat. At verò qui in vtrisq; fuerint exercita-  
ti, hęc rationem, vtpote infirmam, vel me-

*Vterus in* tacēte, dispiciūt. Nā si aliquid vteri ascen- 10  
*tēsus quo-* dere videatur, id perexiguū est, neq; suffi-  
*modo cre-* cit ad hoc, vt totū ipsius spaciū, ne ad vē-  
*brā effi-* triculū quidem ascendisse ostēdat: tātū  
*ciat respi-* abest vt hunc prætereundo, ad septum trās-  
*rationem.* uersum pertingere possit. Quòd si deē etiā  
vt attingat, quid mouēti habebit id, vt spi-  
rationem tollere, aut animi defectionem,  
aut membrorum contractionem aut inte-

*Ventricu-* grum soporem inducere possit? Etenim cū  
*lus intu-* aliquis se impleuerit, ventriculus intume- 20  
*mesces ci-* scens, planē videtur septum transversum  
*bo, crebrio* comprimere, atque hanc ob rem spiratio  
*rem facit* redditur crebrior: sed nullo insuper alio ac-  
*spirationē.* cidente animal infestatur. Atque prægan-  
tibus quoque vterus adeò intēditur, vt cre-  
brior fiat spiratio, sed ne has quidem aliun-  
de lædi videmus. Id autem quod dicunt,  
exiccatos vteros, humoris desiderio ad vi-  
scera ascendere, nemini nō absurdū vide-  
ri



ri potest. Si enim inutilē aliquando vterus  
 requirat humorē, vesicam atq; crassi inte-  
 stini partem inferiorem, totam sibi proxi-  
 mam habet: si verò non simpliciter humo-  
 rem, sed sanguineū humorē desiderat, ad  
 hepar potius quàm ad septum trāsuerfum,  
 ipsum moueri oportebat. At verò quid op<sup>9</sup>  
 est vt aliis extrinsecus irruat partibus, quū  
 à spissa membrana ipsum ambiente conti-  
 10 neatur? quippe omnes tunicæ quæ ad sese  
 humorem ex intestinis attrahunt, per ora  
 quāplurima id efficere solēt. Atqui ad vte- *Venarum*  
 rum multa admodum venarum ora perue- *ora ad v-*  
 niunt, per quas ex cōcaua vena, vtpote cui *terum.*  
 ex hepate sanguis influit, sanguinē attrahe-  
 re potest. Etenim quā aliā fistulam, hac in-  
 signiorē quis inuenerit? qua ex hepate in  
 vterū sanguis deferatur, aut per quā aliam  
 omninò vterus ex iecinore quippiā attra-  
 20 here possit. Quòd si hunc concauæ venæ  
 riuum non maximum, saltē non alium esse  
 fateamur oportet. quippe sola hæc vena,  
 partibus sub transuerso septo cōstitutis, ex  
 hepate deferit sanguinē. absurda igitur o-  
 mninò est illorum ratio, cum hoc quòd  
 vterum esse animal, hac ratione astruere vi-  
 dētur. Sed si hoc ipsis concedatur, ergo æ-  
 grè feret vterus priuari se, eo quod concu-  
 piscit, ac fortasse à cibo quoq; abstinebit,  
 quem



*Phœnices  
amatores  
à cibo ab-  
stinent.*

quemadmodum Phœnices amatores affici-  
perhibetur. verum ob hoc neq; ad septum  
transuersum, neq; ad aliū quemuis locum  
perueniet. Nam vt cætera omittamus, per-  
quā arida est septi trāsuerſi tēperies, atqui  
uterus iuxta illorū placita, qui ipſum exic-  
cari dicunt, humidarum partium cōmuni-  
catione indiget. Sed interrogaueris fortas-  
ſe, quā ob cauſam modò ſurſum, modò in  
lat⁹ retrahi uterus videatur? id enim obſte-  
trices aiunt, aut cur ipſo in ſua ſede ſæpe-  
numerò manēte, nihilomin⁹ mulieres quæ-  
dam ab hyſtericis accidentibus corripian-  
tur? Equidem huius rei cauſam explicare  
tentabo, ea quæ ab Hippocrate dicta ſunt  
imitādo. Igitur uteri tenſiōes in cauſa eſſe  
dixerim, cur tāgentibus obſetricibus, mo-  
dò ſurſum, modò in lat⁹ retrahi videatur.  
Nam ſimul cū utero, ceruicē quoq; ipſius  
retrahi neceſſe eſt: ſuper eſt ergo vt declare-  
mus, quam ob cauſam, uterus vel ſurſum,  
vel ad latus retrahatur: hoc enim huic ſer-  
moni deerat. Ea eſſe cenſetur vaſorum ad  
ipſum perueniētium & plenitudo, & ſuſpē-  
ſio. Etenim oſtēdimus in enarratione eius  
aphoriſmi, quo inq̃t: Cōuulſionē, & à pleni-  
tudinē fieri, & euacuatione, quòd pleni-  
tudo repletorū corpora & in latū & profun-  
dum extendit, ſed longitudinē abbreviat.

Ergo

*Cur tan-  
gentibus  
obſetrici-  
bus, u-  
terus ſur-  
ſum & in  
latus re-  
trahi vide-  
atur.*

*Lib. 6.  
Aph. 39*



Ergo quo efficiuntur breuiora, eo magis ad originē retrahuntur. Nam Erasistratus musculos quoque si spiritu impleatur, in latitudine augeri, in longitudine verò minui, æque ob id etiam retrahi dicit. unde ergo oritur plenitudo, tum venarū, tum vinculorum? nempe ex menstruorū retentione. *Ex menstruorum*  
 Nam peruenit quidem ad vterū sanguis, *retentione*  
 sed ad interna ipsius ingredi nō potest, aut *retentione*  
 quia crassior est, quā ut per ora vasorum *oritur ple*  
 possit penetrare, aut quia clausa sunt ora. *nitudo ve*  
 Itaque multiplicatus in venis eas extēdit, *narū &*  
 atq; vicina ipsis vincula madefacit: ad ho- *vinculorū*  
 rum autem extensionem cōtinuò vterum *uteri.*  
 retrahi necesse est. Igitur si æqualiter vnde  
 que trahantur, recta erit, & sine inclinatio-  
 ne ipsorū trāsmutatio: si verò inæqualiter,  
 ad partē vehementius trahentem intēdun-  
 tur. Non ergo veluti animal errabundum,  
 aliās ad aliū locū discurret in mulieribus  
 vterus, sed ab extēsiōe retrahitur. Quod  
 si dixerit quispiam, vteri corpus, tum non  
 esse affectū, sed peruersione laborare, quū  
 aliās aliorsum trahitur, hic haud absurda  
 dicere videbitur. Nā circa reliquas quoq;  
 corporis partes accidit, ut huiusmodi ap-  
 pareāt affectus, & ut sæpenumerò decipiā-  
 tur Medici, qui peruersam partem, quiavel  
 incuruari, vel extendi non possit, arbitran-

A A



*Hippocrates in libro de articulis.* tur esse affectam. Atque hoc docuit Hippo-  
 crates in eo libro quē de Articulis scripsit,  
 ubi etiā de vteri vocato errore mētionem  
 fecit, ita scribēs: Si in posteriorem partem  
 caput femoris exciderit, quāquā hoc ra-  
 rō fit, extēdi non potest crus, neque se-  
 cū-  
 dū luxatum articulum, neque adeò se-  
 cū-  
 dum poplitē quoque, iiq; minimē, ubi lon-  
 go spacio durauerit malū, vel inguinis, vel  
 poplitis articulum extendere possunt. Hoc  
 sermone quāuis poplitis articul⁹ haudqua-  
 quā afficiatur, quia tamen cum inguine  
 communicat, ipsum extendi non posse ait.  
 Atq; deinceps subiūgens, inquit: Sanè ani-  
 maduertere hoc oportet, vt enim vtile est,  
 ita magna est ipsius habenda ratio, quāuis  
 nō paucos lateat, quòd ne sani quidem ex-  
 tēdere possunt poplitis articulum non ex-  
 tenso inguinis articulo, nisi sursum leuato  
 pede, ita enim possunt. Neque etiam simili-  
 ter, sed longē maiori cū difficultate flecte-  
 re possunt poplitis articulum, nisi simul fle-  
 ctāt articulū inguinis. His dictis deinceps  
 ait: Multa alia quoque iis haud dissimilia  
 in corpore inueniuntur, & secūdum neruo-  
 rum distentiones, & musculorum figuras,  
 quinetiam plurima notatu fortasse dignio-  
 ra, quā quis putauerit, contingere solēt,  
 & secūdum intestinorum naturam, & vni-  
 uersum



,, uersum ventriculum, atque vteri, tū erro-  
 ,, res, tum extēfiones. His verbis Hippocra-  
 res de poplitis articulo dicere pposuerat,  
 non potēte secundū naturā moueri, idque  
 non ob proprium ipsius affectum, sed quia  
 coxæ cōsentit: quinetiā extensionum, quæ  
 vtero accidunt, mentionem fecit: quum vi-  
 delicet ipse, non per se transmutatur, sed à  
 quibusdam aliis trahitur. Igitur vteri per-  
 uersiones, eo quem diximus modo, ad sup-  
 pressa sequuntur mēstrua, eas tamē ob hoc  
 accidētium quæ in animalis corpore appa-  
 rent, causas esse, nequaquam putandū est.  
 quippe quæ cōmunem habent causam, ple-  
 nitudinem à suppressa mēstruorum purga-  
 tione euenientem. Quæ verò citra peruer-  
 sionem, aut mēstruorum retentionem, vi-  
 duas molestant noxæ, hæ ob retentum se-  
 men euenire putantur. Cæterum pro mul-  
 20 titudinis, qualitatisve ratione, tū mēstruo-  
 rū tū seminis, aliās aliæ accidentiū species  
 oriri solēt. Etenim noxia causa vniuersum  
 corpus refrigerare potēte, adeò vehemēter  
 infrigidatur corp⁹, vt & spiratio, & arteria-  
 rum pulsus, sensu deprehēdi nequeāt. Quæ  
 si vel crassa fuerit, vel acris, cōuulsiones: si  
 verò atræ bilis naturam habuerit, moesti-  
 tiam inducet, quēadmodum animi quoq;  
 defectiones, & ad fortes extensiones, & re-

*Vteri per-  
uersiones.*



*Stoma-* frigerationes, & stomachi æstuationē seq̃  
*chus os vē* consueuerunt. Constat autem quòd in hu-  
*triculi.* iusmodi sermonibus os ventriculi stoma-

chū solemus appellare. quippe omniū me-  
 dicorum mos est, in syncopa quæ ab oris  
 vetriculi vitio depēdet, huiusmodi vti ap-

*Acciden-* pellatione. Porro accidētia quæ ob astricta  
*ta ob a-* menstrua infestare solent (nam de iis quo-  
*stricta mē* que nōnihil me dicturum pollicitus sum)

*strua.* nūc enarrare aggredior, sumpto initio ab

*Lib. 5. A-* his quæ ab Hippocrate in aphorismis scri-  
*pho. 39.* pta sunt: præcipuè verò quum dicit: Si mu-

lier neque prægnans, neque puerpera, lac  
*Suppres-* habet, mēstrua eius defecerūt. At nullo in

*forū men-* māmīs apparēte lacte, menstrua suppressa  
*struorum* hisce notis deprehēduntur. Grauitas totū  
*nota.* corpus molestat, itē fastidiū quoq;, vt nul-

la sit cibi cupiditas, horror inæqualis: q̃  
 si citra horrorē inæqualitas aliqua fuerit, 2  
 atque fastidiū, cupiatque mulier quædam  
 aliena: iube vt obstetrix vteri ceruicē tan-

*Causa* gat. Nam si citra duritiem clausa inuenia-  
*vteri cer-* tur, eā prægnantē esse coniicies: ex his non  
*nix citra* nullæ cibum præterea euomunt, ac terram  
*duritiem,* aut extinctos carbones, aut alia quædā hu  
*prægnatē* iusmodi edunt. Si verò clausum fuerit os

*indicat.* ceruicis vteri, ac duritiē quoque habeat:  
 affectum aliquem in vtero esse portendit:  
 oportet itaq; speculari obstetricē, ad quā  
 par



partē vel declinet, vel retrahatur: nā in ea † *Hue*  
 parte affectā vteri sedem esse coniicien- *spectat*  
 dum est. † Atque in quibusdam fœminis, *Aph. i. li.*  
 eius partis dolor cum grauitate, nō nihil si *6. epid.*  
 gnificare potest, quinetiam in coxā dolor *par. i.*  
 trāsit, ac crus ipsum, quod è regione est, per *Dolor vte*  
 incessum claudicat. Quod si longiori tem- *ri in coxā*  
 pore supprimantur mēstrua, nullāmq; me- *transiens*  
 dicus mulieri vacuationē promoueat, tu- *Palus ob*  
 10 mor aliquis præter naturā, in ilibus inter- *retēt amē*  
 dum exoritur, ostendēs nimirum ex inter- *strua.*  
 nis partibus quāpiam esse inflammatā. † *φυμα-*  
 Nonnullis † panus in extrema iliū parte ex *τάδης*  
 citatur: veluti viris quoq; eodem in loco *δ'υκ*  
 nonnunquam oriri solet, qui vbi suppura- † *Longo*  
 tus aliquando fuerit, secari debet. Atq; hāc *temporis*  
 partē † siue membrum suppuratum disse- *spacio vis*  
 ctūmq; vidimus: interdum ignorantibus *finitur,*  
 medicis inexpertis quid inciderēt, interdū *quidā ad*  
 20 verò intelligētibus quoque. Atque omnia *dunt.*  
 membra ita suppurata facilē curantur. Vt † *γεῖν ὠ-*  
 ri verò sectiones maiori cū difficultate *λον quod*  
 conglutinantur. Huiusmodi accidētia se- *ad intesti*  
 qui suppressa mēstrua cōsueuerūt, ac præ *nū colom*  
 terea lumborum, & colli, & sincipitis do- *referēdū.*  
 lor, qui etiā oculorū fundamenta infestat:  
 item febres ardentes, & vrinæ nigricātes,  
 cum rubra quadā sanie, perinde ac si aquæ  
 ex qua nup̄ mactatæ carnes ablutę fuerūt,

AA ;



fuliginē quis miscuisset: quibusdam vrina  
aut difficulter redditur, aut omninò suppri-  
mitur. Quum ergo horum aliquod in mu-  
liere conspexeris, vterum veluti radicem  
ipsoꝝ conuicere oportet. Quòd si per aliũ  
quempiam corporis locũ sanguis effuxe-  
rit, aut inflāmatiō, aut erysipelas excitatur  
an menstrua purgentur interrogare debes,  
*Immodicè* siquidem nihil horũ accidere solet integrè  
*vacuato-* purgatis. Igitur quibus menstruorum cohi-  
*rum men-* betur purgatio, iis huiusmodi plærũq; eue-  
*struorum* niunt accidentia. Quum verò immodicè  
*accidētia.* vacuātur, sequitur color fœdus, pedes mol-  
li tumore attollũtur, corporis robur pro-  
sternitur, vitiatur ciborum tum cōcoctio,  
tum cupiditas. Atque in totũ omnia, quot-  
quot immoderatam sanguinis vacuationẽ  
siue ex hæmorrhoidē, siue alio quopiā san-  
guinis fluore euenientem, sequi consueue-  
rũt accidētia: huiusmodi fēminas infestāt. 20  
Sed accidit interdũ fœminis muliebri vo-  
catũ profluuium, vel vtero haudquaquàm  
affecto, quũ videlicet vniuersum corp⁹ per  
ipsum expurgatur. quemadmodũ interdũ  
*Muliebri* per renes quoq; euacuatur. Id verò potissi-  
*profluuiũ.* mũ fit, sit mulier laxis sit carnib⁹, & pituito-  
sa. Huiusmodi mulieres intacto quidẽ vte-  
ro, sed vniuerso corpori adhibitis remediis  
sanauim⁹. Atq; id quod excernitur nōnun-  
quàm



quàm rubra sanies, est interdū aquosa, aut subpallida. Quòd si purus fuerit sanguis qualis ex dissecta vena profluit, diligenter animaduvertere oportet, num erosio sit in vtero, ea verò magna ex parte in ceruice potius, quàm alibi cōtingere solet: discerniturque per excretam saniem, si fuerit profunda: Si verò circa os ceruicis cōstitit, non solum per hanc, sed per tactū quoque cognosci potest. Atq; pręgnantes quoque quum ora venarum in ceruice aperiuntur, sanguinē excernunt. Si verò mulieri vtero graui, māmā subito extenuantur, abortus sequitur. Atque geminos ferens, si altera māmā extenuetur, alterū amittit: & omnino si dextra mamma extenuata est, mārē: si sinistra, fœminā amittit. Quippe fœtus, qui mares sunt, parte vteri dextra cōtinetur, qui fœminæ, magis sinistra. Atq; raro aliter euenire cōpertum est: adeò vt in animalib<sup>9</sup> quoq;, quę suapte natura geminos ferre solēt, itidē accidere videamus: vt in capris, ouibus, atq; aliis quadrupedibus nō paucis videre est. Si mulier p̄mptē quidē conceperit, deinde secundo, aut tertio, aut quarto impręgnationis mense, fœtum elegerit, circa vteri acceptabula humorē pituitosum abūdare, atq; idcirco venarū, arteriarūq; ei<sup>9</sup> loci, ad ora vasorū in vterū

*Erosio in vtero.*

*Pregnan-  
tiū men-  
strua.*

*Lib. 5. a-  
ph. 36. &  
37. et 38*

*Lege dis-  
putationē  
Arist. cō-  
tra Empe-  
doclē cap.  
primo. 4  
de gene-  
rat. ani-  
malium.*



descendentium, nexum debiliorem reddi  
coniiciendum est, ut foetus ob gravitatem  
ferre nequeat, sed facile abrumparur.

*De colis affectibus. CAP. VI.*

**Q**uemadmodum ab excrementis quae  
per anum deiciuntur, pauca admo-  
dum super vicinarum partium affectibus  
indicia accipi possunt, ut potest quae magna  
ex parte, & intestinorum, & ventriculi, &  
splenis, & iecinoris, atque nonnunquam  
humorum in universo corpore exuperan-  
tium notae sunt. Sic eodem modo pauca  
per colem educta excrementa, proprium  
ipsius affectum portendunt, sed complura  
vesicae, renum, hepatis, splenis, pulmonis, tho-  
racis, atque humorum in universo corpore,  
dispositiones significat. Verum huiusmo-  
di signa per alia, quae unicuique parti affectus  
subservire diximus, indicia distinguuntur. 10

*Colis vi.* Igitur affecti colis haec erunt indicia: Nam  
*colis affe-* vlcus manifesteprehenditur a dolore  
*cti indi-* ipsum infestante, atque si aliquid ex iis per  
*cia.* urinas excernatur quae vlcera comitari so-  
lent. Id vero ab eo quod ex vesica secerni-  
tur, ita discerni potest. Nam ipsum in primo  
protinus exitu apparens, utinam praevenire  
consuevit: quod vero a vesica egreditur, uri-  
nae admixtum videtur: quinetiam assidue in  
ter



tē meiendum mordicus dolent pudendo-  
 rum vlcera, præcipuè quū vel crustula, vel  
 sordibus solutis, pura fuerint. Sed lōge cui  
 dentiūs ipsius inflammationes, ac reliquę  
 huiusmodi dispositiones vel sine indiciis  
 dignoscuntur. Verū de gonorrhæa, &  
 priapismo diffusè aliquid pcurrere fatius  
 fuerit. Ergo gonorrhæa, est seminis excre- *Gonor-*  
 tio inuita, quam inuoluntariā quoq; nomi *rhaa.*  
 10 nare licet. Sed significātius dixeris, seminis  
 assiduam excretionem, cole haudquaquā  
 extenso. Priapismus verò, est quū coles, & *Priapif-*  
 in lōgitudine & circulo totus augetur, nul *mus.*  
 lo stimulāte ad libidinē aut desiderio, aut  
 acquisito calore, vt quibusdā accidere con-  
 suevit, qui supini decumbūt, sic enim qui-  
 dam ipsum descripserūt. At breuiori quoq;  
 compendio dicere potes, permanētē colis,  
 aut auctiōem, aut tumorē deducta verò  
 20 denominatio est, à priapo scilicet. Nā hūc,  
 vt cui suapte natura huiusmodi coles esset  
 ita finxerunt, atq; pictura descripserūt ho-  
 mines. Gonorrhææ autē nomē planè com *Vnde di-*  
 positum est, ex γονῆς (quod semē genitale) *cta gonor*  
 & ῥῆν, quod fluere significat. Etenim semē *rhaa.*  
 modò γονῆ modò γόνος nominari solet.  
 Porro quemadmodum omnia corporis no-  
 stri excremeta duob⁹ modis vacuātur, in-  
 terdum enim à cōtinētibus ipsa corporib⁹



*Secretio  
humorū.  
Retentio  
humorū.*

excernuntur, interdū spontē profluunt, eō  
quod ob imbecillitatē ab ipsis corporibus  
cōtineri nō possunt, ita de semine quoque  
dicendū est. Nam in omnibus huiusmodi,  
vt excernere tēpestiuē, ita continere, natu-  
ræ officium est. Verū secretio quidem fit  
apto fluxionis meatu, ac reliquo cōcepta-  
culi spacio, & contracto, & ad apertū iam  
meatū, quicquid in continente spacio con-  
tinetur, impellente. Retentio verō fit, quū  
clausus permanet meatus & cōtentū à cō-  
tinēte haudquaquā impellitur, sed cōtrā  
per contractionē comprehenditur, & reti-  
netur. Hoc modo cōtēti in cauis instrumē-  
tis humores, in his qui integra valetudine  
degūt, naturaliter & excernūtur, & retinē-  
tur. In illis autē qui prāter naturam se ha-  
bent, retentio quidē ob excretiuae virtutis  
imbecillitatē: excretio verō ob retentricis  
facultatis infirmitatē euenit, vel ob dispo- 20  
sitionē aliquam, quæ haud secus, quā na-  
turalis ipsa excretoria vis, partes mouere  
possit. Id qđ in seminariis vasis videre li-  
cet, vbi aliq̃s vel comitiali morbo, vel cō-  
uulsione violēter irruēte fuerit correptus.  
Cæterū videmus alias quoq; partes, vt  
manus, aut pedes, aut digitos cōuelli, mo-  
dò simul cū vniuersi corporis cōuulsione,  
modò ipsis solis affectis. Proinde haud-  
quaquā



quaquam absurdū fuerit, in seminariis vasis, & quidem solis, aliquando huiusmodi dispositionē excitari huiusmodi ea est, in qua inuita vrinę excretio gonorrhęę proportionē respondet, quū contentricem videlicet facultatem resolui contigerit. Igitur gonorrhęa instrumentorum seminis affectio est, nō pudendorū, quę seminis genitalis via sunt, qua excernatur. Priapismus vero, planē colis est accidens. At fieri potest, vt nullo præcipuo proprioque ipsum affectu infestante, ad arterias referatur, vtpote quę solę interdum huiusmodi habent præter naturā dispositionem, quali videlicet affici consueuerunt, quū naturaliter totus coles intēdit. Atqui à spiritu in tumore ipsum attolli manifestē patet, iis qui celeritatē eius, & quum intumescit, & quum iterū residet, perpēdunt, quippe nullus humor tam subitā in alterutram partē mutationē efficere posset. His sic se habētib, quū in corporū dissectione, magnę videantur arteriæ in pudendum (exiguam scilicet particulā) irruere, sitq; coles essentia talis qualē in nulla alia pte videre est, vtpotē cuius corpus neruosum est, atq; vndecunq; fistulosum, excepta ea parte quā glādē vocāt quid aliud excogitauerit q̄s, quā quod à vaporoso spiritu, ab arteriis, aff

*Instrumentorum seminis affectio gonorrhęa.*

*Colis accidens priapismus.*

*Colis compositio.*



*Glans pu-  
dendi.*

*Hædi na-  
turalis in-  
dustria.*

affluente, per extensiones in tumore attol-  
latur? Ideoque glandē æqualem semper ha-  
bere magnitudinē, quod fistulosus in ipsā  
neruus nō ingreditur. Ergo quid causę est,  
quū libidinis impetu quis stimulatur, aut  
vbi ob supinum decubitū, calfacti sunt lū-  
bi, vt coles extēdatur? Nempe hac inuen-  
ta facilē priapismi quoq; dispositionē in-  
uenire nos posse speram⁹. Quod verò prin-  
ceps causa sit plenitudo, vel arteriarū, vel 10  
nerui fistulosi, aut etiā vtriusque quum ex  
priori conditione mutatur, palā constat.  
At verò vtrius magis, aut si etiam ambo-  
rum, deinceps consideremus, hinc sermo-  
nis nostri sumpto exordio: Natura corpo-  
ris partes fingens, perficiēsq; fecit vt ip-  
sę citra doctrinam, proprias actiones ag-  
grederentur: cuius rei exactissimū aliquā-  
do fecimus periculum, hædum alendo, sed  
ita alendo, vt matrem quæ ipsum in vte- 20  
ro gestauerat, nunquam vidisset. Quum  
enim capras dissecares, dissectorum quę-  
stionibus, quibus fœtus in vtero formatio-  
nem speculantur, promotus, inueni elegan-  
tem quendam hædum, quem à matre abso-  
lutum, ita pro meo more abstuli, vt ipsam  
haudquaquā videret. Atque in domū quā-  
dam, vbi multæ pelues erāt, deposui: qua-  
rum aliæ vini, aliæ olei, alię mellis, alię la-  
tis



Etis, aut alterius cuiuspiā humoris erāt plenā, aderāntq; fructus non pauci, tum Cereales, tum ab arboribus decerpti. Hūc itaque hœdum cōspeximus: in primis quidē pedibus incedentē, perinde ac si audiuiſſet ſibi inceſſ⁹ gratia, crura fuiſſe cōceſſa, deinde excuſſit quam à matre cōtraxerat humiditatem: poſteà pede lat⁹ ſcalpere, ac deinde ſingula vaſa olfacere vdimus. Percepto itaque ſingulorum odore, lac tandē abſorbuit. Quibus viſis omnes exclamauimus, Hippocratem verē dixiſſe, animalium naturas eſſe indoctas. Sic ergo hœdū hūc educando, non ſolū lac, ſed multa inſuper alia quæ fortē offerebātur, comēſſe vidim⁹. At quia nō lōgē aberat vernale æquinoctium quum eriperetur hœdus à matre, exactis duobus deinde menſibus, tenelloſei tū fruticum, tum aliarum plantarū ramulos obtuli: quorū omniū quum experiretur odorem, alioſ quidem contempſit, alioſ verò guſtauit, atq; ſic ad adultarum caprarum cibos conuerſus eſt. Sed hoc fortāſſe non ad eò magnum videtur. At lōge maiori admiratione dignū eſt, quòd poſteà quàm & folia, & teneros ramuſculos deuorauerat paulò poſt ruminare cēpit. Quod ruruſus omnes quotquot aderāt vidētes, exclamauerunt cū magna facultatū admiratione, quæ anima



*De rumi-  
natione et  
ventricu-  
lorum dif-  
ferētiis in  
ruminan-  
tibus lege  
c. 14. 3. de  
partibus  
animaliū.*

*Linguae  
motio.*

animalibus natura insunt. Quāvis eīm ma-  
gnū videbatur, quòd impellente fame, per  
os, atq; dentes cibum assumeret: multò ta-  
men vehemētius, admirati sumus, quod ci-  
bū in ventriculo iam contētum, in primis  
quidē ad os subleuando reduceret, deinde  
multo tempore mandendo tereret, postre-  
mo rursus ipsum deuoraret: idque non in  
eundē, sed in alium ventriculum. Vulga-  
res autem huiusmodi naturæ munera de- 10  
spiciūt, nihil nisi peregrina spectacula ad-  
mirātes. Nā quis nō miraretur, quòd me-  
dici in secandis corporib⁹ peritissimi, que-  
rere solēt, à qua causa articulus hic exten-  
ditur? subiiciamus verò exempli gratia co-  
xæ articulū, aut à qua causa incuruat, aut  
quid est quod ipsum in vtranq; partem in-  
trāsuersum abducit, aut quid ipsum vtro-  
que circūuoluit, quū interim hœdus, sin-  
gulos articulos, ad quācunque motionem 20  
libitū fuerit, possit excitare: quemadmo-  
dū homines ipsi, quamuis à quo musculo  
motus efficiat nō intelligant. Porro de lin-  
guæ motione (nam hanc pro exēplo indu-  
cimus) q̄s nō mirabitur, si dissecutores in-  
ter ipsos, non solūm de musculorū nume-  
ro, sed de ipsorum etiam actione pugnan-  
tes viderit, ac infantes quoq; quomodo na-  
tura vocē, aut aliud huiusmodi mun⁹ imi-  
tari



tari docuerit. Quomodo etiā linguā moueant, aut quibus musculis vocem eādem efficiant. Similiter etiā de omni reliquorū animalīū, tum voce, tum respiratione. Atque (vt summatim dicamus) miraberis fortasse, quo docente, omniū quæ à consilio, & volūtate pendēt actionū, instructa fuerint instrumēta: de quib⁹ quidē actionib⁹, licet acris inter dissecutores sit pugna, quomodo fiāt, & quib⁹ instrumētis: nihilominus oīa animalia, simulatq; genita sunt, & spirāt, & vocem reddunt. Igitur nō mirū esse debet genitales partes, eas actiōes quarū gratia à natura institutæ sunt, p̄tinus ab initio cognoscere. Eteñ quāob̄rē vterus, quū semen genitale cōceperit, donec p̄fectus fuerit fœt⁹, exactē clausus permanet, perfecto verò fœtu plurimū aperitur, ac deinde sic apertus fœtū excludit. Populares autem hæc propter crebrum euentum, & cōtēnunt, & despiciunt, vtpotē qui nihil, q̄ reuera sit admirabile, sed ea duntaxat quæ rarò vident admirari cōsueverunt. Quid autē in rerū natura potest esse admirabilius, quàm quòd nouē perpetuis mensibus clauditur os vteri, adeò exactē, vt ne specilli quidē acumē admittat: perfecto autē fœtu, vsque adeò distēditur, vt totū animal per ipsum egredi possit? Non igit

Os vteri  
nouē mē-  
sibus ita  
clauditur,  
vt ne spe-  
cilli acu-  
men ad-  
mittat.



igitur dubites pudēdorum facultatem per  
*Fistulosū* se doctam esse, vt fistulosum hoc neruo-  
*neruosūq;* sumq; corp<sup>o</sup>, vbi ad coitū insurgit animal,  
*corp<sup>us</sup>cau* à naturali facultate, quæ ipsū attollere po-  
*lis viri-* test, protinus distendatur. Cuius rei simile  
*lis.* & in corde, & arteria, planè videre est, nisi  
quòd horum motus perpetu<sup>o</sup> est, eò quòd  
necessaria sit nobis eorum actio: fistulosus  
verò neruus non semper, sed quum vsus re-  
quirat. Quū ergo sic fuerit extēsus, sequi 10  
tur ex arteriis spiritus, quemadmodū pul-  
mo thoracem ob eam quā habet ad mo-  
tum ipsius sequelam. Verū posses fortasse  
replentis fistulosum neruum spiritus vim,  
quum ad coitum irrumpit animal, ad arte-  
rias quoq; referre, quanquam multò sati<sup>o</sup>  
est, vt huiusmodi actionē ad neruum, non  
ad arterias referam<sup>o</sup>: quū præsertim actio-  
nes, ex propria partiū essentia, non ex ea-  
rū positu peruenire, rationi cōsonum est. 20  
Nam cor si in alia quapiā parte poneret<sup>o</sup>,  
nihilominus actionē suam obtineret. Nec  
aliter de iecinore quoq;, liene, ac reliquis  
omnibus sentiendum est. Etenim vniuersi  
corporis arterias, eadē habere actionē pro-  
babile est. quippe eodē tēpore omnes to-  
tius animalis arteriæ, inter sese similiter  
*Arterie* pducūtur. Itaq; haudquaquā par esse vi-  
*pudentis* detur, vt arteriæ pudēdis innate, aliam ali-  
*innate.* quam



quam habeant facultatem, præter eã quã  
 antea in toto corpore habebãt, sed ratio-  
 nabile est vt latiora quàm reliquæ arte-  
 riæ ora habeant, vt quæ ad celeritatem se-  
 quelæ, ad id quod euacuatur sint præpara-  
 tæ. Semper enim natura videtur vnicuiq;  
 actioni, id quod vtile est, vndiquaque ex-  
 pleuisse. Cæterum nullam aliam insuper  
 præcipuam habent actionis facultatem,  
 10 quum ad pudendum peruenerint, licet cal-  
 factis lumbis, par sit vt & arteriæ calidio-  
 res reddantur, & magis etiã pateant ipsa-  
 rum ora: quamobrem non exiguam tunc  
 spiritus essentiam, in fistulosum neruum  
 effundunt: qui paulatim impletus, colem  
 extendit, ita vt tota ipsius essentia in fistu-  
 loso neruo consistere videatur. His itaque  
 cognitis ad priaspismi dispositionem ve-  
 niamus. Quippe ex iis quæ suprà proposi-  
 20 ta sunt, constat, vel ob arteriarum ora im-  
 modicè patentia, vel vaporosum spiritum  
 in fistuloso neruo ortum, hunc fieri affe-  
 ctum. Sed vtrum potius pro causa sit ha-  
 bendum, inquirere oportet. Namque ab  
 vtriusq; ipsum fieri posse, mihi videtur, cre-  
 brius tamen arteriarum ora patentia se-  
 qui, quippe facilius est hæc distēdi, quàm  
 flatuosum spiritum in neruo fistuloso ge-  
 nerari. Ac memini me huiusmodi quidem

*Vnde pri-  
 apismi af-  
 fectus.*

B B



*Colis pal-  
pitatio.*

nerui dispositionem semel vidisse, arteriarum verò sæpenumerò. Cuius rei coniecturam feci, tum ex iis quæ præcesserunt accidentibus, tum ex modo curationis. In illo enim cui assidue colis palpitatio præcesserat, causa erat spiritus flatuosus, ad quem quum omnem curationem conuertissem, hominem sanaui. Quibus verò supramodum arteriarum ora putebant, in iis nullum huiusmodi accidens præcedere solebat. Porro accidit cuidam, vt longo tempore præter consuetudinem à concubitu abstineret. Alteri verò vt mali succi alimentis, acribusque vreretur, alij etiam vt duobus mensibus præcinctus peregrè proficisceretur, cum antea nunquam cingi consueuisset. Coniecimus itaque arteriarum ora nimis patefacta, illis quidem ob humorum vitia & acrimoniam: his verò ob flatuosum spiritum, & sine ordine, & violenter commotum. Etenim medicamenta excitandæ rentiginis vim obtinentia, tum epota, tum etiam perinaeo, id est femini, lumbisq; adhibita calida omnino atque flatuosa sunt: quemadmodum contraria omnia, ventositatem non excitant, & infrigidant potius, quàm calfaciāt. Sed aduerte ne obiter hunc sermonē prætercurras. quippe de medicamentis, non de



de cibis loquutus sum, quoniam sunt quædam alimenta, quæ ob id quod plurimum feminis pariunt, impetum ad libidinem excitare possunt, hæc ergo sermonem illum, quem nuper dicebamus, probabilior reddere possunt, quod à concubitu abstinentes, interdum priapismo vexari solent: siquidem accidit his qui plurimo semine abundant, & præter consuetudinem à coitu abstinent, præsertim quum non student, ut multa exercitatione, sanguinis abundantia dissipetur, maximè vero iis qui à libidinis cogitatione nondum liberi euaserunt, veluti sunt quidam sapientie natura casti, qui cum longo iam tempore huiusmodi continentia sese exercuerunt; libidinis imaginem concipiunt, ob spectacula, quæ illas mouere, & ad memoriam reducere possunt. Nam longè diuersa est huiusmodi hominum dispositio, ut in pudendis generetur, ab eorum dispositione, qui nullo pacto libidinis cogitationi sunt obnoxij. Atque fuit mihi amicus quidam, cui præter eam quam antea habuerat consuetudinem, omnino à concubitu abstinenti, adeo rigidus tumidusque factus est penis, ut mihi accidens ipsum declarare cogeretur. Miror, inquit, quod huic (athletam indicans) ob contin-

*Libidinis  
cogitatio  
priapif-  
mum ex-  
citat.*

*Rigidus  
penis cui-  
dam ob  
Veneris  
desuetu-  
dinem.*



nentiam rugosus, collapsusque penis eua-  
 serit: mihi verò ex quo continentiam ser-  
 uare studui, euenerit contrarium. Tum  
 equidem illi consului, ut collectum iam  
 genitale semen excerneret, postea verò  
 & à narrationibus, & spectaculis, & medi-  
 tationibus libidinem suscitare potenti-  
 bus, summopere caueret. At cantores &  
 athletæ, qui iam inde ab initio, nullam  
 vitæ partem Venereis illecebris contami-  
 nauerunt, nullam admittentes huiusmodi  
 vel cogitationem, vel imaginationem, iis  
 pudenda & exilia, & rugosa, veluti seni-  
 bus, fieri consueuerunt. Nam præter ea,  
 quæ accidere solent iis, qui protinus à pri-  
 ma iuuentute immodicè libidini sese per-  
 miserunt, id etiam euenit, ut horum loco-  
 rum vasa, amplius patentia, maiorem ad  
 se sanguinis copiam alliciant: & coeundi  
 cupiditas magis increseat, ea videlicet ra-  
 tione, quam in cæteris quoque facultati-  
 bus videre est, & quæ à Platone etiam no-  
 tata est, cum inquit: Ignauia quidem exol-  
 uit: proprii autem officij exercitatio, ro-  
 bur augere solet. Sic mammae quoque in  
 iis quæ nondum imprægnatae fuerunt,  
 contractæ permanent, in aliis verò à par-  
 tu infantulos lactantibus, vastissimæ red-  
 duntur, atque ita magnæ permanent lac  
 emit

Cantori-  
 bus & a-  
 thletis ru-  
 gosa pu-  
 denda.

Ignauia.

Mammae  
 turgida.



emittentes, donec puer fuerit ablactatus:  
tunc enim haud ita multò pòst à lactis ge-  
neratione quiescunt. Igitur omnia hæc, si  
bene considerentur, ac præterea causæ ob  
quas in singulis affectis partibus, affectus  
ipse consistit, definiantur, non inutilem  
ad curationis rationem ansam præbe-  
re poterunt. Atqui non est nunc  
tempus ea tractare, quare ade-  
pro huius operis fine, ora-  
tioni quoque nostræ  
hîc finem impo-  
nimus.

GALENI DE AFFE-  
CTORVM LOCORVM  
NOTITIA,  
FINIS.

\*



